신선 농산물 수출검역 요건

2015. 3.

농림축산검역본부
Animal and Plant Quarantine Agency
식물검역부 수출지원과

신선 농산물 수출검역 요건

2015. 3.

농림축산검역본부
Animal and Plant Quarantine Agency
식물검역부 수출지원과

CONTENTS

I. 국가별 수출가능 품목

1

1. 아시아	3
① 대만	3
② 말레이시아	6
③ 몽골	7
④ 방글라데시	8
수 베트남	8
⑥ 스리랑카	9
⑦ 싱가포르	10
⑧ 인도네시아	11
⑨ 일본	11
⑩ 중국	12
⑪ 태국	14
⑫ 홍콩	15
⑬ 필리핀	15
⑭ 인도	16
⑮ 우즈베키스탄	34
⑯ 카자흐스탄	34
⑰ 키르기즈스탄	34
2. 북미	35
⑱ 미국	35
⑲ 미국(괌, 사이판)	38
⑳ 멕시코	39
㉑ 캐나다	40
3. 남미	47
㉒ 과테말라	47
㉓ 브라질	48
㉔ 베네수엘라	52
㉕ 아르헨티나	52
㉖ 우루과이	53
㉗ 에콰도르	53
㉘ 칠레	54
㉙ 콜롬비아	79
㉚ 페루	83
㉛ 멕시코	85
4. 중동	87
㉜ 바레인	87
㉝ 사우디아라비아	87

CONTENTS

34	아랍에미리트	88
35	아프가니스탄	88
36	오만	89
37	이라크	89
38	이란	90
39	이스라엘	90
40	예멘	91
41	카타르	92
42	쿠웨이트	92
5.	오세아니아태평양	93
43	뉴질랜드	93
44	호주	95
45	미크로네시아	98
46	팔라우	98
6.	EU·러시아	99
47	EU	99
48	러시아	107
49	터 키	109
7.	아프리카	110
50	남아프리카공화국	110
51	이집트	110

II. 참고 자료 112

1.	대만의 신선 농산물 수입요건	114
2.	주요 종자류에 대한 수출 상대국의 검역요건	156
3.	2014년 신선 농산물 수출단지 지정현황	164
4.	수출 식물검역 체계도	165
5.	상대국 요건에 의한 과실류 수출검역 절차	166
6.	농림축산검역본부 조직도(식물검역관련)	175

I

국가별 수출가능 품목

1. 아시아

① 대 만

수출가능 품목

- 곡 류 : 쌀, 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 옥수수 등
- 과실류 : 감, 단감, 포도, 감귤, 유자, 밤, 사과, 배, 복숭아 등
 - ※ 감귤은 과실에 생경엽 및 줄기가 부착되어 있어서는 안됨(대만측의 금지병 해충인 Satsuma dwarf virus 관련)
 - ※ 사과, 배, 복숭아는 대만측과 합의된 요건에 따라서만 수출 가능
- 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지 등
- 종자류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 토마토, 가지, 파, 양파, 상추 등
 - ※ 박과류 종자는 생육중 재배지검사 및 위생증에 과실썩음병(Acidovorax avenae subsp. citrulli) 무감염증명을 해야함
- 버섯류 : 송이, 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이, 양송이, 만가닥
- 절화류 : 장미, 카네이션, 심비디움, 팔레놉시스, 난초, 국화, 튜립, 글라디올러스, 백합
- 화훼류 기타 : 철쭉속, 선인장(점목선인장), 장미, 카네이션, 심비디움, 난초, 국화, 튜립, 글라디올러스, 백합, 다육식물 일부
- 유리알락하늘소의 기주식물은 꽃·과실·종자, 직경 3cm 이하의 새싹·어린가지 및 가장 큰 줄기의 직경이 3cm 이하인 묘목의 경우에만 수출 가능함(단풍나무속, 느릅나무속, 뽕나무속, 배나무속, 사과나무속, 오리나무속, 자작나무속, 장미속, 칠엽수속 등)
 - ※ 대만 검역당국은 자국으로 수입가능한 품목 목록을 수시로 업데이트하여 홈페이지에 게시(<http://www.baphiq.gov.tw>)

★ 수출식물검역증명서에 컨테이너번호 반드시 기재(필요시 검사현장에서 수기로 기재)

수출불가 품목

- 과실류 : 대추, 매실, 살구, 아몬드, 자두, 참다래 등
- 묘목류 : 굴속·금굴속·탱자나무속, 직경 3cm를 초과하는 유리알락 하늘소의 기주식물 등

조건부로 허용된 신선 농산물의 대만 수출검역요건

- 사과·배·복숭아 생과실은 다음요건을 준수해야 수출가능함
 - 배는 수출농가 등록, 봉지씌우기 재배(과실의 직경이 2.5cm 이하일 때까지 완료), 복숭아심식나방 방제 및 방제사항 기록, 선과장 등록, 대만검역관의 수출과수원 및 선과장 현지조사, 수출검사 등
 - 사과·복숭아는 수출농가 등록, 6~10월까지 2주 간격으로 복숭아심식나방 예찰 및 방제, 예찰 및 방제사항 기록, 재배지 검사, 선과장 등록, 대만검역관의 수출과수원 및 선과장 현지조사, 수출검사 등
 - 수출식물검역증명서에 “The Fruits have been thoroughly inspected and found free of peach fruit moth(*Carposina sasaki*) and western flower thrips(*Frankliniella occidentalis*). Code No. of Packing House: OO-OO, Date of Inspection: month, day, year” 부기
 - ※ “Other quarantine pests designated by BAPHIQ” 에 해당하는 병해충은 꽃노랑총채벌레 1종에 해당하므로 꽃노랑총채벌레명을 기입하고 문구는 생략
 - 국내에 분포하는 다음의 병해충은 수출식물검역증명서에 “수출검사 결과 해당 병해충에 감염되지 않았음”을 부기하여야 함
 - 감자뽕나방, 화살깎지벌레, 꽃노랑총채벌레, 마늘줄기선충, 감자썩이선충, 감자역병, 뿌리응애, 가지검은마름병, 과실썩음병 등 9종
 - ※ 수출품목에 따라 1종 이상의 대만측 검역병해충이 없음을 부기하여야 하므로 품목별 부기사항을 반드시 확인하여야 함
 - 다음의 증식용 식물은 대만 식물검역기관이 지정한 장소에서 격리 재배를 실시함(종자 및 과실 제외)

- Sugarcane, Tea, Pineapple, Citrus(*Citrus* spp., *Fortunella* spp. 및 *Poncirus* spp.)는 최소 2년간 격리재배 실시
- *Carcica* spp., *Euphoria longana*, *Fragaria* spp., *Litch chinensis*, *Malus* spp., *Mangifera indica*, *Morus* spp., *Passiflora* spp., *Prunus* spp., *Psidium guajava*, *Pyrus* spp.(배 접수·삽수 제외), *Rosa* spp.(절화 제외), *Vitis* spp.는 최소 1년간 격리재배 실시

적용 예

○ 파프리카 생과실에 대한 부기사항

- The fruits have been thoroughly inspected and found free from *Phthorimaea operculella* (Zeller), *Frankliniella occidentalis* (Pergande) and *Rhizoglyphus echinopus* Fumouze and Robin. [이 파프리카 과실은 철저하게 검사되었으며, 감자뽕나방, 꽃노랑총채벌레 및 뿌리응애에 감염되지 않았음]

※ 파프리카 생과실은 3종의 병해충에 감염되지 않았음을 증명하여야 하며, 과실에 부착된 과경(果梗)은 줄기로 보지 않기 때문에 마늘줄기선충은 무감염 증명대상에 포함되지 않음

○ 딸기 생과실에 대한 부기사항

- The Fruits have been thoroughly inspected and found free from *Frankliniella occidentalis* (Pergande) and *Ditylenchus dipsaci* (Kuhn) Filipjev. [이 과실은 철저하게 검사되었으며, 꽃노랑총채벌레 및 마늘줄기선충에 감염되지 않았음]

※ 딸기 생과실이 줄기가 포함된 상태로 수출되는 경우 마늘줄기선충을 포함하여 2종의 병해충에 감염되지 않았음을 증명하여야 함

○ 멜론 생과실에 대한 부기사항

- The Fruits have been thoroughly inspected and found free from *Frankliniella occidentalis* (Pergande), *Ditylenchus dipsaci* (Kuhn) Filipjev. and *Acidovorax avenae* subsp. *citrulli*. [이 과실은 철저하게 검사

되었으며, 꽃노랑총채벌레, 마늘줄기선충 및 과실썩음병에 감염되지 않았음]

※ 멜론은 줄기가 포함된 상태로 수출되기 때문에 마늘줄기선충에 감염되지 않았음을 증명하여야 함

○ 신선 인삼(수삼)에 대한 부기사항

- The plants or plant parts have been thoroughly inspected and found free from *Ditylenchus dipsaci* (Kuhn) Filipjev, *Ditylenchus destructor* Thorne, and *Rhizoglyphus echinopus* Fumouze and Robin [이 식물 또는 식물의 일부는 철저히 검사되었으며, 마늘줄기선충, 감자썩이선충 및 뿌리응애에 감염되지 않았음]

※ 신선 인삼의 경우 뿌리 부분이 수출되기 때문에 마늘줄기선충 등 3종의 병해충에 감염되지 않았음을 증명하여야 함

2 말레이시아

주요 신선·건조 농산물 중 수출이 금지되어 있는 품목은 없음

» 주요 수출품목 «

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미, 흑미), 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 옥수수
- 과실류 : 감(단감), 감귤, 밤, 복숭아, 배, 사과, 유자, 참다래, 포도
- 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지, 고구마, 감자
- 종자류 : 가지, 고추, 당근, 무, 멜론, 브로콜리, 배추, 상추, 수박, 양배추, 양파, 오이, 참외, 토마토, 파, 호박
- 버섯류 : 느타리, 만가닥, 송이, 새송이, 양송이, 영지, 표고, 팽이

- 절화류 : 국화, 글라디올러스, 난초, 백합, 심비디움, 장미, 카네이션, 튜립, 팔레놉시스
- 화훼류 기타(재배매체 포함) : 국화, 글라디올러스, 난초, 백합, 선인장 (접목선인장), 심비디움, 장미, 철쭉속, 카네이션, 튜립

③ 몽 골

주요 신선·건조 농산물 중 수출이 금지되어 있는 품목은 없음

» 주요 수출품목 «

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미, 흑미), 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 옥수수
- 과실류 : 감(단감), 감귤, 밤, 복숭아, 배, 사과, 유자, 참다래, 포도
- 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지, 고구마, 감자
- 종자류 : 가지, 고추, 당근, 무, 멜론, 브로콜리, 배추, 상추, 수박, 양배추, 양파, 오이, 참외, 토마토, 파, 호박
- 버섯류 : 느타리, 만가닥, 송이, 새송이, 양송이, 영지, 표고, 팽이
- 절화류 : 국화, 글라디올러스, 난초, 백합, 심비디움, 장미, 카네이션, 튜립, 팔레놉시스
- 화훼류 기타(재배매체 포함) : 국화, 글라디올러스, 난초, 백합, 선인장 (접목선인장), 심비디움, 장미, 철쭉속, 카네이션, 튜립

4 방글라데시

주요 신선·건조 농산물 중 수출이 금지되어 있는 품목은 없음

» 주요 수출품목 «

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미, 흑미), 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 옥수수
- 과실류 : 감(단감), 감귤, 밤, 복숭아, 배, 사과, 유자, 참다래, 포도
- 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지, 고구마, 감자
- 종자류 : 가지, 고추, 당근, 무, 멜론, 브로콜리, 배추, 상추, 수박, 양배추, 양파, 오이, 참외, 토마토, 파, 호박
- 버섯류 : 느타리, 만가닥, 송이, 새송이, 양송이, 영지, 표고, 팽이
- 절화류 : 국화, 글라디올러스, 난초, 백합, 심비디움, 장미, 카네이션, 튜립, 팔레놉시스
- 화훼류 기타(재배매체 포함) : 국화, 글라디올러스, 난초, 백합, 선인장 (접목선인장), 심비디움, 장미, 철쭉속, 카네이션, 튜립

수 베트남

수출가능 품목

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미, 흑미), 밀, 옥수수
- 과실류 : 사과, 배, 감귤, 복숭아, 단감, 포도

- 채소류 : 딸기, 파프리카, 토마토, 당근, 배추, 무, 양파, 양배추, 수박, 멜론, 참외, 감자, 수삼
- 종자류 : 무, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 토마토, 양파, 파, 당근
- 버섯류 : 느타리, 송이, 새송이, 양송이 영지, 팽이
- 화훼류 기타 : 심비디움묘, 만년청묘

참고사항

- 2007. 4월부터 생과실·과채류·재식용 식물에 대한 PRA 규정을 도입, 품목별 PRA 자료를 베트남측에 제공해야 수출가능
- 과실류 중 사과, 배, 감귤, 포도, 복숭아, 단감과 채소류 중 멜론, 딸기, 토마토, 파프리카 등 채소류는 베트남측이 PRA를 진행 중이며 PRA 결과에 따라 수입검역조건 결정
- 현재 베트남 측이 한국산 농산물에 대한 병해충위험분석(PRA)을 진행 중이며, PRA가 완료될 때까지 특별한 검역요건 없이 모든 품목의 수출이 가능함

⑥ 스리랑카

수출가능 품목

- 사과 및 채소종자 9품목(고추, 상추, 수박, 양배추, 오이, 토마토, 무, 당근, 호박)

수출불가 품목

- 과실류 : 감귤
- 종자류 : 감자종서, 벼씨, 고무, 두류종자, 고구마종서
- 묘목류 : 산림묘목, 차나무묘목, 담배묘, 토마토묘, 카사바묘, 수초묘, 배나무과묘목, 딸기묘, 망고묘

※ 상기 품목 외에는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계자료도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

7 싱가포르

- 주요 신선·건조 농산물 중 수출이 금지되어 있는 품목은 없음

» 주요 수출품목 «

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미, 흑미), 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 옥수수
- 과실류 : 감(단감), 감귤, 밤, 복숭아, 배, 사과, 유자, 참다래, 포도
- 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지, 고구마, 감자
- 종자류 : 가지, 고추, 당근, 무, 멜론, 브로콜리, 배추, 상추, 수박, 양배추, 양파, 오이, 참외, 토마토, 파, 호박
- 버섯류 : 느타리, 만가닥, 송이, 새송이, 양송이, 영지, 표고, 팽이
- 절화류 : 국화, 글라디올러스, 난초, 백합, 심비디움, 장미, 카네이션, 튤립, 팔레놉시스
- 화훼류 기타(재배매체 포함) : 국화, 글라디올러스, 난초, 백합, 선인장 (접목선인장), 심비디움, 장미, 철쭉속, 카네이션, 튤립

8 인도네시아

수출가능 품목

□ 주요 신선·건조 농산물 중 수출이 금지되어 있는 품목은 없음

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미, 흑미), 콩, 감자
- 과실류 : 감, 단감, 포도, 감귤, 참다래, 밤, 사과, 배, 복숭아, 자두, 살구
- 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 당근, 브로콜리, 딸기, 멜론, 참외, 토마토, 가지, 고구마, 감자, 양파, 오이, 마늘쫑, 도라지
- ★ 과실류와 열매채소류는 수출식물검역증명서의 부기사항 란에 "과실파리 무발생 지역에서 생산되었음"을 부기
- 종자류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 토마토, 가지, 파, 양파, 상추
- 버섯류 : 송이, 새송이, 느타리, 팽이, 표고
- 화훼류 : 선인장묘, 채송화묘, 다육식물
- ★ 목재류도 수출식물검역증명서를 첨부하여야 함

9 일 본

수출이 금지되어 있는 품목은 없으나 수입검사에서 일본의 검역병해충이 발견되면 소독·폐기 또는 반송의 검역처분을 받으므로 수출 시에는 병해충이 없는 깨끗한 농산물을 수출하여야 함

» 주요 수출품목 «

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미, 흑미), 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 옥수수
- 과실류 : 감(단감), 감귤, 밤, 복숭아, 배, 사과, 유자, 참다래, 포도
- 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지, 고구마, 감자
- 종자류 : 가지, 고추, 당근, 무, 멜론, 브로콜리, 배추, 상추, 수박, 양배추, 양파, 오이, 참외, 토마토, 파, 호박
- 버섯류 : 느타리, 만가닥, 송이, 새송이, 양송이, 영지, 표고, 팽이
- 절화류 : 국화, 글라디올러스, 난초, 백합, 심비디움, 장미, 카네이션, 튜립, 팔레놉시스
- 화훼류 기타(재배매체 포함) : 국화, 글라디올러스, 난초, 백합, 선인장 (접목선인장), 심비디움, 장미, 철쭉속, 카네이션, 튜립

10 중 국

수출가능 품목

- 곡 류 : 옥수수, 녹두, 콩, 커피, 참깨
- 과실류 : 밤
- 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 양파, 생강, 브로콜리, 수삼
- 종자류 : 콩, 잠두콩, 가지, 갓, 고추, 근대, 꽃양배추, 당근, 들깨, 멜론, 무, 박, 배추, 백경채, 부추, 브로콜리, 삼엽채, 상추, 수박, 쪽갓, 시금치, 아욱, 양배추, 양파, 오이, 참외, 청경채, 치커리, 콜라비, 토마토, 파, 호박, 겨자, 담배

※ 종자류의 경우 사전에 중국 검역기관으로부터 수입허가서(Import permit) 발급 필요

- 버섯류 : 팽이, 새송이(큰느타리)
- 절화류 : 심비디움, 장미, 백합, 국화, 거베라, 글라디올러스, 금어초, 튜립, 칼라, 카네이션, 해바라기꽃, 스타치스, 아이리스, 장미, 안개초, 덴드로비움
- 화훼묘 : 덴드로비움·심비디움·호접란(묘·분화), 선인장(접목선인장), 칼란코에묘·삼수, 미모사묘, 맨드라미묘, 백합구근
 - ※ 심비디움묘의 경우 「한국산 심비디움의 중국 수출검역요령」(고시 제 2015-3호)에 따라 재배포장 등록, 중국측의 우려병해충 무감염 증명 부기 등
- 묘목류 : 동백나무, 단풍나무, 모과나무, 목백일홍, 소사나무, 석류나무, 산수유나무, 애기사과나무, 주목나무, 철쭉나무, 피라칸사나무, 향나무(진백) 등 12품목
 - ※ 재식용 묘목의 경우 사전에 중국 입업국과 검역기관으로부터 수입허가서 (Import permit) 발급 필요

수출불가 품목

- 상기품목 외 대부분의 과실류·과채류·소나무묘(접수 포함) 수출이 불가능하며, 사전에 수출 가능 여부를 상대국에 확인하여야 함
- 쌀, 단감, 포도, 감귤, 파프리카, 참외, 딸기, 토마토 등 8품목은 중국에 수출허용을 요청하여 상대국이 PRA 절차를 진행 중임
- ★ 중국은 '03. 2월부터 시행된 수입위험분석 관리제도에 따라 국산 생과실, 과채류, 재식용 식물 등을 수입금지품으로 지정(다만 제도시행 전 상업적 수출실적이 있는 품목에 한해 수출 허용)하고 있어, 국산 농산물의 중국수출을 위해서는 중국에 수입허용 요청 필요

11 태 국

수출가능 품목

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미), 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 강낭콩
- 과실류 : 사과, 배, 감, 단감, 포도, 감귤, 복숭아, 밤
- 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 피망, 브로콜리, 참외, 멜론, 딸기, 고구마
- 종자류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 토마토, 가지, 파, 양파, 상추
- 버섯류 : 송이, 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이, 양송이, 만가닥
- 절화류 : 장미, 카네이션, 심비디움, 팔레놉시스, 난초, 국화, 튜립, 백합, 글라디올러스
- 화훼류 기타 : 선인장

수출불가 품목

- 과실류 : 참다래, 자두, 살구
- 채소류 : 파프리카, 토마토, 오이, 호박, 수박, 가지, 감자
- 감(단감), 배, 사과, 포도, 감귤, 복숭아, 메론, 참외, 딸기, 파프리카, 고추, 토마토, 가지는 태국측이 PRA를 진행 중이며 PRA 결과에 따라 수입 지속허용 여부 및 수입검역조건 결정
- ★ '07. 7월부터 생과실, 과채류, 재식용 식물을 수입금지품으로 지정, 제도시행 전 상업적 수출실적이 있는 품목은 PRA 완료 시까지 수출가능

12 홍콩

○ 주요 신선·건조 농산물 중 수출이 금지되어 있는 품목은 없음

★ 재식용인 경우에는 수출검역조건에 대해 상대국에 사전 확인 필요

13 필리핀

수출가능 품목

○ 곡 류 : 쌀(백미, 현미, 흑미)

○ 과실류 : 사과, 배, 감, 단감, 감귤(현지검역 조건), 파프리카

○ 채소류 : 양파

○ 종자류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 브로콜리, 수박, 오이, 호박, 참외, 토마토, 고추, 시금치, 파

○ 버섯류 : 느타리, 만가닥, 새송이, 팽이, 표고 등 모든 품목

○ 절화류 : 장미, 카네이션, 심비디움, 팔레놉시스, 난초, 국화, 튜립, 백합, 글라디올러스

수출불가 품목

○ 과실류 : 감귤, 포도, 복숭아, 참다래, 자두, 살구, 밤

○ 채소류 : 메론(참외), 토마토, 딸기

★ 상기 품목 외에 수출이 가능한 품목은 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계자료도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

조건부 수출품목 및 요건

국가	품목	수출요건 및 PC부기사항	허용 년도
필리핀	사과, 배	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상업용 화물만 수출가능(휴대화물은 수입금지) ○ 농림축산검역본부가 수출전 필리핀 식물검역소에 모든 수출자 및 거래 상표명(corresponding brand names)을 통보 ○ 모든 포장 박스에는 3면에 “FOR PHILIPPINES” 표시 ○ 모든 컨테이너는 봉인(seal)되어야 하고 봉인번호는 PC의 식별표시란(Distinguishing Marks)에 표기 ※ 농림축산검역본부장은 필리핀 식물검역소장에게 화물 선적 전에 수입허가서, PC 등 관련서류를 팩스로 보내야 함. 	
	양파	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농림축산검역본부가 수출전 필리핀 식물검역소에 수출업자 명단(주소 포함)을 통보 ○ PC 부기사항 : 수입업자의 수입허가 번호 	
	파프리카	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재배시설 등록 ○ 보관 및 수송중 저온(10℃ 이하) 유지 	
	단감	<ul style="list-style-type: none"> ○ 모든 컨테이너는 봉인(seal)되어야 하고 봉인번호는 PC의 식별표시란(Distinguishing Marks)에 표기 ○ PC 부기사항 : 수입업자의 수입허가 번호 	

14 인도

조건부 수출품목 및 요건

- 자료출처 : Plant Quarantine (Regulation of Import into India)(Fourth Amendment) Order, 2004 Schedule VI (2004. 9. 10. 개정판)

품 목	수입형태	PC 부기사항	기타사항
Allium류 (양파, 마늘, 파, shallot 등)	재식용 종자 또는 구근	○ Freedom from: (a) Smut(Urocystis cepulae) (b) Slippery skin(Pseudomonas cepacia) (c) Marginal necrosis(Pseudomonas marginalis pv. marginalis) (d) Pod and stem blight(Phomopsis longicolla) (e) Stem and bulbs nematode(Ditylenchus dipsaci) (f) Onion maggot(Hylemyia antiqua)	○ 흙부착이 없을 것
	식용 구근	○ Freedom from: (a) Smut(Urocystis cepulae) (b) Stem bulb nematode(Ditylenchus dipsaci) (c) Onion maggot(Hylemyia antiqua)	○ 28℃ 이상에서 16g/m ³ 로 12시간 MB훈증 처리 ○ 처리내용을 PC에 기재
Anthurium (Anthurium spp.) 및 기타 aroids (Dieffenbachia, Caladium, Syngonium, Aglaonema, Spathiphyllum, Monstera, Phylodendron)	재식용 접수·삽수 및 묘목	○ Freedom from: (a) Bacterial blight(Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae)	○ 45~60일간 격리재배
	조직배양체	○ Certified that the tissue cultured plants produced from stock tested and maintained virus-free.	-
	절화 (Anthurium spp.)	○ Freedom from: Bacterial blight(Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae)	-
Barely 보리 (Hordeum spp.)	재식용 종자	○ Freedom from: (a) Glume rot(Pseudomonas syringae pv. atrofaciens) (b) Barley viruses viz. Stripe mosaic(Cytorhabdovirus) (c) Ergot(Claviceps purpurea) (d) Granary weevil(Sitophilus granarius)	○ 상업적 수입시 인도 농업부 농업협동국(DAC)의 사전승인 필요

Beans 콩 (Vigna (Phaseolus) spp.)	재식용 종자	○ Freedom from: (a) Scab(Elsinoe phaseoli) (b) Downy mildew of lima bean(Phytophthora phaseoli) (c) Pod and stem blight(Phomopsis longicolla) (d) Bacterial wilt(Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens) (e) Bean bruchid(Acanthoscelides obtectus)	-
	식용 또는 가공용 콩	-	○ 28℃ 이상에서 32g/m ³ 로 24시간 MB훈증 처리 ○ 처리내용을 PC에 기재
Beet Root (Beta vulgaris)	재식용 종자	○ Freedom from: (a) Downy mildew(Peronospora farinosa) (b) Silvering disease(Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae) (c) Bacterial blight(Pseudomonas syringae pv. aptata) (d) Beet cyst nematode(Heterodera schachtii) (e) Beetroot rust(Uromyces spp.) (f) Beet yellows necrotic virus(rhizomania)	○ 흠부착이 없을 것
Berseem (Trifolium alexandrium) 및 클로버	재식용 종자	○ Freedom from: (a) Northern anthracnose(Kabatiella caulivora) (b) Stem and bulb nematode(Ditylenchus dipsaci) (c) Sclerotinia wilt(Sclerotinia trifoliorum)	○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 ○ 흠부착이 없을 것
Broad bean (Vicia faba) 및 Vetches (V. villosa)	재식용 종자	○ Freedom from: (a) Leaf & pod spot(Ascochyta fabae) (b) Soybean cyst nematode(Heterodera glycines) (c) Stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci) (d) Broad bean viruses viz. mottle, necrosis, strain(Comovirus). true mosaic, wilt virus 1 & 2(Fabavirus)	-

<p>Cacti 선인장</p>	<p>번식용 식물</p>	<p>○ Freedom from: (a) Cactus cyst nematode(Cactodera cactii) (b) Cactus virus X. & 2 (Carlavirus)</p>	<p>○ 45 ~ 60일간 격리재배시설에서 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것</p>
<p>Carnation 카네이션 (Dianthus spp.)</p>	<p>재식용 접수·삽수 및 묘목</p>	<p>○ Freedom from: (a) Bacterial wilt and stem cracking(Burkholderia caryophilli) (b) Slow wilt(Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola) (c) Rust(Uromyces dianthi) (d) Smut(Sorosporium spaonariae) (e) Downy mildew(Peronospora dianthi, P. Dianthicola) (f) Carnation viruses viz. Cryptic virus 1 & 2, Italian ring spot, necrotic, stunt, yellow stripe</p>	<p>○ 45 ~ 60일간 격리재배시설에서 격리재배</p>
	<p>종자, 절화</p>	<p>○ Freedom from: (a) Rust(Uromyces dianthi) (b) Smut(Sorosporium spaonariae) (c) Downy mildew(Peronospora dianthi, P. Dianthicola)</p>	<p>-</p>
	<p>조직배양체</p>	<p>○ Certified that the tissue-cultured plants obtained from mother stock tested and maintained free from all viruses affecting carnation.</p>	<p>-</p>
<p>Carrot 당근 (Daucus carota)</p>	<p>재식용 종자</p>	<p>○ Freedom from: (a) Bacterial blight(Xanthomonas hortorum pv. carotae) (b) Carrot viruses(yellow leaf)</p>	<p>-</p>
<p>Chicory 치커리 및 Endive (Cichorium spp.)</p>	<p>재식용 종자</p>	<p>○ Freedom from: (a) Bacterial blight(Pseudomonas cichorii) (b) Bidens mottle virus (c) Chicory yellow mottle virus (d) Anthracnose(Marssonina panottoniana)</p>	<p>○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요</p>

Chrysanthemum (Dendranthemum spp.)	재식용 접수·삽수 (뿌리 부착/미부착)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: (a) Fasciation(Rhodococcus fascians) (b) Foliar nematodes(Aphelenchoides fragariae, A. ritzemabosi) (c) Stem and bulb nematode(Ditylenchus dipsaci) (d) South American leaf miner(Liriomyza huidobrensis) (e) Burdock leaf miner(Amauromyza maculosa) (f) White rust(Puccinia horiana) (g) Ray blight & stem canker(Didymella ligulicoa, syn. Ascochyta chrysanthemi) (h) Chrysanthemum viruses viz. chlorotic mottle, stunt, vein chlorosis, virus B 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 45~60일간 격리재배 ○ 흠부착이 없을 것
	조직배양체	<ul style="list-style-type: none"> ○ Certified that the tissue-cultured plants obtained from mother stock tested and maintained free from Chrysanthemum viruses viz. chlorotic mottle, stunt, vein chlorosis, virus B. 	-
Citrus spp. (레몬, 라임, 오렌지, 자몽, 감귤 등 및 기타 rutaceous)	생과실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 호주, 캐나다, 칠레, 중국, 프랑스, 이란, 이탈리아, 뉴질랜드, 남아공, 미국은 국가별로 부기사항 기재 필요 ○ 한국은 해당사항 없음 	-
Cocoa 코코아 (Theobroma cacao)	가공용 또는 산업용 코코아콩 (발효 및 건조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: (a) Chocolate moth(Ephestia elutella) (b) Mediterranean flour moth(Ephestia kuehniella) (c) Tropical nut borer(Hypothenemus obscurus) (d) Black pod of cocoa(Phytophthora megakarya) (e) Chestnut downy mildew(Phytophthora katsurae) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 28℃ 이상에서 16g/m³로 24시간 MB훈증 처리 ○ 처리내용을 PC에 기재
Chick pea (Cicer arietinum)	재식용 종자	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: Pod & stem blight(Phomopsis longicolla) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요
Cotton 목화 (Gossypium spp.)	산업용 미가공 목화	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: Cotton boll weevils(Anthonomus grandis, A. peninsularis, A. vestitus) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 28℃ 이상에서 24g/m³로 24시간 MB훈증 처리 ○ 처리내용을 PC에 기재

Cowpea (Vigna spp.)	재식용 종자	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: (a) Bruchids(Bruchidium spp., Stator spp.) (b) Cowpea seed-borne viruses(bromo virus, poty virus, comovirus, carmovirus) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요
Cucumber 오이 (Cucumis sativus) 및 관련 종	재식용 종자	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: (a) Fusarial wilts(Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum, Fusarium oxysporum f.sp. melonis) (b) Black spot(Phomopsis sclerotoides) (c) Septoria leaf spot(Septoria cucurbitacearum) (d) Cucumber seed-borne viruses viz. leaf spot virus (e) Verticillium albo-atrum (f) squash mosaic virus 	-
Date palm (Phoenix dactylifera)	재식용 흡지(suckers)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: (a) Bayood(Fusarium oxysporum f.sp. albedinis) (b) Palm lethal yellowing(Phytoplasmas) (c) Texa root rot(Phymatotrichum omnivorum) (d) American palm weevil(Rhyncophorus palmarum) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 ○ 1년간 격리재배
	재식용 조식배양체	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요
	식용 생/건조 과실	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: Palm kernel borer(Pachymerus lacerdae) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 28℃ 이상에서 16g/m³로 24시간 MB훈증 처리 ○ 처리내용을 PC에 기재

화훼 구근류	다알리아 Dahlia spp.	괴경(Tubers)	○ Freedom from: viruses affecting Dhalia	○ 한 시즌 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것
	Calla lilly (Zantede schia spp.)	구경(Corms)	○ Freedom from: (a) Bacterial leaf spot(Xanthomonas campestris pv. zantedeschiae) (b) Zantedeschia mosaic virus	○ 한 시즌 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것
		조식배양체	○ Certified that tissue-cultured plants tested and found free from Zantedeschia mosaic virus.	-
	글라디올 러스 Gladiolus spp.	구경(Corms/ Corm lets)	○ Freedom from: (a) Smut(Urocystis gladiolicola) (b) Rusts(Uromyces gladioli & U. transversalis) (c) Corm rot(F. oxysporum f.sp. gladioli) (d) Hard rot(Septoria gladioli) (e) Scab & neck rot(Burkholderia marginalis) (f) Base rot(Burkholderia gladioli pv. gladioli)	○ 한 시즌 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것
	Heliconia spp.	지하경 (Rhizomes)	○ Freedom from: (a) Moko wilt(Burkholderia solanacearum Race 2)	○ 한 시즌 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것
	히아신스 Hyacinth us spp.	구근(Bulbs)	○ Freedom from: (a) Bacterial blight or yellow slime(Xanthomonas hyacinthi) (b) Hyacinth mosaic virus(Poty virus) (c) Stem & bulb nematode(Ditylenchus dipsaci)	○ 한 시즌 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것
	아이리스 Iris spp. (bulb 및 rhizome 형성종)	구근/지하경 (Bulbs/ Rhizomes)	○ Freedom from: (a) Fusarial rot(Fusarium oxysporum f.sp. gladioli) (b) Stem and bulb nematode(Ditylenchus dipsaci) (c) Sclerotinia rot(Sclerotinia bulborum) (d) Iris virus(Potyvirus)	○ 한 시즌 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것

화훼 구근류	백합 Lilly (Lillium spp.)	구근(Bulbs)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: <ul style="list-style-type: none"> (a) Fusarium wilt(<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. lillii) (b) Anthroacnose(<i>Colletotrichum lillii</i>) (c) Bacterial leaf spot(<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i>) (d) Lilly viruses(lilly rosette, lilly symptomless, tulip breaking and lilly curl stripe) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한 시즌 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것
		조식배양체	<ul style="list-style-type: none"> ○ Certified that tissue-cultured plants are tested and found virus-free. 	-
	수선 Narcissus (Narcissus spp.)	구근(Bulbs)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: <ul style="list-style-type: none"> (a) Basal rot(<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>narcissi</i>) (b) Stem and bulb nematode(<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (c) Narcissus fire(<i>Botryotinia polyblastis</i>) (d) Leaf scorch(<i>Stagnospora</i> 척산냐) (e) Narcissus bulb flies(<i>Merodona equesteris</i>, <i>Eumerus strigatus</i>, <i>E. tuberculatus</i>) (f) Narcissus viruses 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한 시즌 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것 ○ 적절한 살균제 처리후 48.9℃에서 30분간 온탕처리(처리내용을 PC에 기재)
			<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: <ul style="list-style-type: none"> (a) Bulb and stem nematode(<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (b) Yellow pustule & hellfire(<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>oortii</i>) (c) Tulipa viruses viz. band breaking, chlorotic blotch, virus x and other seed borne viruses 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한 시즌 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것 ○ 적절한 살균제 처리후 48.9℃에서 30분간 온탕처리 (처리내용을 PC에 기재)
	튤립 Tulipa spp.	구근(Bulbs)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: <ul style="list-style-type: none"> (a) Bulb and stem nematode(<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (b) Yellow pustule & hellfire(<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>oortii</i>) (c) Tulipa viruses viz. band breaking, chlorotic blotch, virus x and other seed borne viruses 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한 시즌 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것 ○ 적절한 살균제 처리후 48.9℃에서 30분간 온탕처리 (처리내용을 PC에 기재)
	Ornamental Zinger (Zingiber mioga)	지하경 (Rhizomes)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from : <ul style="list-style-type: none"> Leaf blight(<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>zingibericola</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한 시즌 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것

<p>포도나무 Grapevine (Vitis spp.)</p>	<p>뿌리묘목, 줄기묘목 등 묘목류</p>	<p>○ Freedom from: (a) Grapevine Phylloxera or vine louse(Viteus vitifoliae, syn. Daktulosphara vitifoliae) (b) Rust(Phakopsora vitis) (c) Dead arm(Cryptosporella viticola syn. Phomopsis viticola) (d) Crown gall(Agrobacterium vitis) (e) Gummosis(Pantoea agglomerans) (f) Hairy root(Agrobacterium rhizogense) (g) Pierce's disease(Xylella fastidiosa) (h) Bacterial necrosis(Xylophilus ampelinus) (i) Grapevine viruses: Luteovirus, Nepovirus, Closterovirus, Trichovirus, Potyvirus</p>	<p>○ 일년간 격리재배 ○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요</p>
<p>포도</p>	<p>생과실</p>	<p>○ 호주, 캐나다, 칠레, 프랑스, 이란, 이탈리아, 뉴질랜드, 남아공, 미국은 국가별로 부기사항 기재 필요 ○ 한국은 해당사항 없음</p>	<p>-</p>
	<p>식용 건포도</p>	<p>-</p>	<p>○ 28℃ 이상에서 16g/m³로 24시간 MB혼중 처리 ○ 처리내용을 PC에 기재</p>
<p>호프 Hops (Humulus spp.)</p>	<p>뿌리 부착/미부착 접수·삼수 등 묘목류</p>	<p>○ Freedom from: (a) Downy mildew(Pseudoperonospora humuli) (b) Hops cyst nematode(Heterodera humuli) (c) Hop viruses</p>	<p>○ 6개월간 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것</p>
	<p>산업가공용 건조 호프 구과</p>	<p>○ Freedom from : Hops cyst nematode(Heterodera humuli)</p>	<p>○ 28℃ 이상에서 16g/m³로 24시간 MB혼중 처리 ○ 처리내용을 PC에 기재</p>

<p>Lucerne 또는 알팔파 (Medicago spp.)</p>	<p>재식용 종자</p>	<p>○ Freedom from: (a) Yellow leaf blotch(Pyrenopeziza medicaginis) (b) Sclerotinia wilt(Sclerotinia trifoliorum) (c) Bacterial wilt(Corynebacterium michiganense pv. insidiosum) (d) Alfalfa cryptic virus</p>	<p>○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요</p>
<p>옥수수 Maize (Zea mays)</p>	<p>재식용 종자</p>	<p>○ Freedom from: (a) Stewart's wilt(Pantoea stewartii sub sp. stewartii) (b) Nebraska wilt(Clavibacter michiganensis sub sp. nebraskensis) (c) Southern corn blight(Drechslera maydis Race T) (d) Ergot(Claviceps gigantea) (e) Tropical rust(Physopella zeae) (f) Anthracnose(Kabatella zeae) (g) Larger grain borer(Protophonus truncatus) (h) Maize weevil(Sitophilus zeamais) (i) Mycospharella zeae-maydis (j) Burkholderia andropogonis (k) Pantoea agglomerans (l) Pesudomonas fuscavignae (m) Pesudomonas syringae pv. coronofaciens (n) maiz chlorotic machlo virus</p>	<p>○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요</p>
	<p>식용 또는 가공용 곡류</p>	<p>○ Freedom from: (a) Ergot(Claviceps gigantea) (b) Larger grain borer(Protophonus truncatus) (c) Maize weevil(Sitophilus zeamais)</p>	<p>○ 28℃ 이상에서 32g/m³로 24시간 MB훈증 처리 ○ 처리내용을 PC에 기재</p>
<p>Oil palm 야자 (Elaeis guineensis) 및 관련종</p>	<p>종자, 꽃가루, 싹틔운 종자</p>	<p>○ Freedom from: (a) Vascular wilt(Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis) (b) Freckle(Cerospora elaeidis) (c) Red ring(Rhadinaphelenchus cocophilus) and its vector Rhyncophorus palmarum (d) Lethal bud rot or sudden wilt(Marchites sorpresiva(phytoplasmas)) (e) Fatal wilt or hart rot(Phytopomonas staheli) (f) Leaf mottle virus (g) Cadang cadang and related viroids (h) Palm kernel borer(Caryobruchus spp. and Pachymerus spp.)</p>	<p>○ 동 종자 및 싹틔운 종자의 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 ○ 10~12개월간 격리재배</p>

<p>난초 (Aranda, Catteleya, Cymbidium, Dendrobium, Lawliocatteleya, Mokara, Odontoglossum, Phalaenopsis, Vanda, Vanilla 등)</p>	<p>묘목</p>	<p>○ Freedom from: (a) Bacterial leaf spots(Burkholderia gladioli pv. gladioli & Erwinia chrysanthemi) (b) Blossom blights (Phyllostica capitalensis) (c) Orchid viruses such as cymbidium mosaic, necrosis, Odontoglossum ring spot and orchid fleck etc</p>	<p>○ 45~60일간 격리재배</p>
	<p>조직배양체</p>	<p>○ Certified that the tissue-cultured plants are obtained from other stock tested and maintained virus-free.</p>	<p>-</p>
<p>Ornamental palm 류 (Arikuryoba, Borasus, Caryota, Carypha, Chamaeodorea, Chrysalidocorpus, Dictyosperma, Washingtonia, Roystonia, Hyophorbe, Pritchardia, Sabal, Syogrus, Trachycorpus, Vietchia, Mascarena)</p>	<p>종자, 싹틔운 종자</p>	<p>○ Freedom from: (a) Bacterial blight(Acidovorax avenae sub sp. avenae) (Carypha spp.에 대해서만 적용) (b) Mosaic(Poty virus) (Washingtonia spp.에 대해서만 적용) (c) Red ring nematode(Rhadinaphelenchus cocophilus) ○ Certified that the seeds/seed sprouts collected from mother palms free from Cadang cadang(viroids).</p>	<p>○ 10~12개월간 격리재배</p>
<p>Pea 완두 (Pisum spp.)</p>	<p>재식용 종자</p>	<p>○ Freedom from: (a) Pod and stem blight(Phomopsis logicolla) (b) Stem and bulb nematode(Ditylenchus dipsaci) (c) Pea cyst nematode(Heterodera goettingiana) (d) Bruchids(Bruchidius spp. Specularis impressithorax) (e) Pea viruses viz. early-browning, enation mosaic, green mottle</p>	<p>○ 흙부착이 없을 것 ○ 적절한 살균제 처리 ○ 처리내용을 PC에 기재</p>

<p>Pelargonium (Pelargonium spp.)</p>	<p>재식용 종자, 접수·삽수, 묘목</p>	<p>○ Freedom from: (a) Bacterial spot(<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pellargonii</i>) (b) Pelargonium viruses viz. flower break virus, leaf curl virus, vein clearing virus and zonate spot virus</p>	<p>○ 45~60일간 격리재배</p>
<p>Pepper 고추, Chillies (<i>Capsicum</i> spp.)</p>	<p>재식용 종자</p>	<p>○ Freedom from: (a) <i>Peronospora hyoscyami</i> pv. <i>tabacina</i> (b) Pepper viruses viz. mild mosaic, mild mottle, tomato ring spot, tomato black ring virus</p>	<p>-</p>
<p>이과류: (사과, 배 <i>Pyrus</i> spp.) 모과 Quince (<i>Cydonia</i> spp.) 넥타린 (<i>Amygdalus</i> spp.)</p>	<p>재식용 묘목, 줄기묘목, 접수·삽수 등 묘목류</p>	<p>○ Freedom from: (a) Fire blight(<i>Erwinia amylovora</i>) (b) Crown gall(<i>Agrobacterium tumefaciens</i>) (c) Hairy root(<i>A. rhizogenes</i>) (d) Apple and pear rusts(<i>Gymnosporangium</i> spp.) non asiatic (e) apple scar skin, apple stem grooving viruses (f) Seed chalcid(<i>Megastigmus spermatrophus</i>) (g) Viruses/phytoplasmas affecting Pomidae</p>	<p>○ 1~2년간 격리재배 ○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요</p>
	<p>조직배양체</p>	<p>○ Certified that the planting material is obtained from mother stock indexed/tested and maintained free from viruses and phytoplasmas affecting Pomidae</p>	<p>○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요</p>
	<p>재식용종자</p>	<p>Free from: (a) Mummy berry(<i>Monilia vacciniicorymbasi</i>) (b) Blue berry virus viz., blue berry mosaic, shoestring, red(nectrotic) ring spot, leaf mottle, peach rosette and tomato ring spot virus</p>	

Rape/Mustard (Brassica spp.)	재식용 종자	○ Freedom from: (a) Light leaf spot(<i>Gloeosporium concentricum</i>) (b) Raphanus leaf spot(<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>raphanai</i>) (c) Bacterial leaf spot(<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i>)	○ 동 종자의 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요
	식용 열매·과실	-	○ 수출전 devitalization 처리 ○ 처리내용을 PC에 기재
장미 (<i>Rosa</i> spp.)	재식용 뿌리묘목, 줄기묘목, 접수·삽수 등 묘목류	○ Freedom from: (a) Crown gall(<i>Agrobacterium tumefaciens</i>) (b) Hairy root(<i>A. rhizogenes</i>) (c) Brand canker(<i>Coniothyrium wernsdorfiae</i>) (d) Brown canker(<i>Cryptosporella umbrina</i>) (e) Downy mildew(<i>Peronospora sparsa</i>) (f) Rust(<i>Phragmidium</i> spp.) (g) Rose streak virus (h) Rose wilt virus	○ 18개월간 격리재배 및 90일간 발아시험 ○ 뿌리묘목은 흙부착이 없을 것
장과류 Blueberry 및 Cranberry (<i>Vaccinium</i> spp.)	재식용 뿌리 부착/미부착 묘목, 접수·삽수 등 묘목류	○ Freedom from: (a) Leaf rust(<i>Pucciniastrum myrtilli</i>) (b) Red leaf(<i>Exobasidium vaccinii</i>) (c) Red gall(<i>Synchytrium vaccinii</i>) (d) Witches' broom(<i>Pucciniastrum geoppertianum</i>) (e) Straw berry weevils(<i>Anthonomus signatus</i> & <i>A. bisignifer</i>) (f) Blue berry viruses viz., blue berry mosaic, shoe-string, red(necrotic) ring spot, leaf mottle, peach rosette and tomato ring spot (g) Phytoplasmas(blueberry stunt, witches' broom and cranberry false blossom)	○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 ○ 9~12개월간 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것 ○ 휴면 묘목류는 수출국에서 선적전 적절한 방법으로 처리 또는 훈증하고 처리내용을 PC에 기재
	재식용 종자	○ Freedom from: (a) Mummy berry(<i>Monilia vacciniicorymbasi</i>) (b) Blue berry viruses viz., blue berry mosaic, shoe-string, red(necrotic) ring spot, leaf mottle, peach rosette and tomato ring spot	○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 ○ 9~12개월간 격리재배
	조직배양체	○ Certified that the tissue-cultured plants are obtained from mother stock tested/indexed and maintained virus-free.	○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요

장과류	Gooseberry 및 Currants (Ribes spp.)	재식용 뿌리 부착/미부착 묘목, 접수·삽수 등 묘목류	○ Freedom from: (a) American(gooseberry) mildew(<i>Sphaerotheca mors-u-vae</i>) (b) European(gooseberry) mildew(<i>Microsphaeria grassulariae</i>) (c) Leaf spot(<i>Anthraco</i> se)(<i>Pseudopeziza ribis</i>) (d) Cluster cup rust(<i>Puccinia pringsheimiana</i>) (e) Black pustule(<i>Plowrightia ribesia</i>) (f) Cane blight(<i>Botryosphaeria ribris</i>) (g) Viruses viz., black current reversion, gooseberry vein banding, arabis mosaic, and strawberry latent ring spot	○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 ○ 9~12개월간 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것 ○ 휴면 묘목류는 수출국에서 선적전 적절한 방법으로 처리 또는 훈증하고 처리내용을 PC에 기재
		재식용 종자	○ Freedom from seed-borne viruses such as arabis mosaic and strawberry latent ring spot.	○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 ○ 9~12개월간 격리재배
		조직배양체	○ Certified that the tissue-cultured plants are obtained from mother stock tested/indexed and maintained virus-free.	○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요
	Raspberry (<i>Rubus</i> spp.)	재식용 뿌리 부착/미부착 묘목, 접수·삽수 등 묘목류	○ Freedom from: (a) Crown gall(<i>Agrobacterium tumefaciens</i>) (b) Hairy root(<i>A. rhizogenes</i>) (c) Rusts(<i>Gymnoconia nitens</i> , <i>Kuehneola uredinalis</i> , <i>Phragmedium bulbosum</i> , <i>P. rubiidaeli</i> , <i>P. violacearum</i> & <i>Pucciniastrum americanum</i>) (d) Downy mildew(<i>Peronospora rubi</i>) (e) Straw berry weevils(<i>Anthonomus signatus</i> & <i>A. bisignifer</i>) (f) Viruses such as leaf mottle, leaf spot, bushy dwarf, leaf curl, raspberry(black) necrosis, vein chlorosis & yellow dwarf, arabis mosaic and straw berry shoestring	○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 ○ 9~12개월간 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것 ○ 휴면 묘목류는 수출국에서 선적전 적절한 방법으로 처리 또는 훈증하고 처리내용을 PC에 기재
		재식용 종자	○ Freedom from seed-borne viruses such as raspberry ring spot, arabis mosaic and strawberry latent ring spot.	○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 ○ 9~12개월간 격리재배
		조직배양체	○ Certified that the tissue-cultured plants are obtained from mother stock tested/indexed and maintained virus-free.	○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요

장과류	Strawberry (Fragaria spp.)	재식용 뿌리 부착/미부착 묘목, 접수·삽수 등 묘목류	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: <ul style="list-style-type: none"> (a) Phomopsis blight(Phomopsis obscurens) (b) Red stele(Phytophthora fragariae) (c) Crown rot(Phytophthora cactorum) (d) Angular leaf spot(Xanthomonas fragariae) (e) American dagger nematode(Xiphinema americanum) (f) Leaf blotch(Gnomonia fragariae) (g) Straw berry weevils(Anthonomus signatus & A. bisignifer) (h) Straw berry viruses viz., vein banding, crinkle leaf(rhabdovirus), mild yellow edge, latent ring spot(nepovirus), latent C (i) Aster yellows, straw berry green petal, phyllody & yellows(phytoplasmas) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 ○ 9~12개월간 격리재배 ○ 흙부착이 없을 것 ○ 휴면 묘목류는 수출국에서 선적전 적절한 방법으로 처리 또는 훈증하고 처리내용을 PC에 기재
		재식용 종자	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from seed-borne viruses such as arabis mosaic, raspberry ring spot & strawberry latent ring spot. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 ○ 9~12개월간 격리재배
		조직배양체	<ul style="list-style-type: none"> ○ Certified that tissue-cultured plants are obtained from mother stock indexed/tested and maintained virus-free. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요
사탕수수 (Sorghum spp.)	재식용 종자	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: <ul style="list-style-type: none"> (a) Bacterial blight(Burkholderia andropogoni) (b) Bacterial leaf streak(Xanthomonas vasicola pv. holcicola) (c) Milo disease(Periconia circinata) (d) Striga weed(Striga harmonthica) (e) Sorghum viruses viz. chlorotic spot, mosaic 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 	

콩 (Glycine spp.)	재식용 종자	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: <ul style="list-style-type: none"> (a) Downy mildew(<i>Peronospora manshurica</i>) (b) Stem canker(<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i>) (c) Root and stem rot(<i>Phytophthora megasperma</i> var. <i>sojae</i>) (d) Pod and stem blight(<i>Phomopsis longicolla</i>) (e) Soybean cyst nematode(<i>Heterodera glycines</i>) (f) Bacterial wilt(<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>), (g) Soybean viruses viz. dwarf, chlorotic mottle, stunt, poty, tobacco black ring (h) Bruchids(<i>Bruchidius</i> spp.) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 ○ 흙부착이 없을 것
	식용 또는 가공용 콩	<ul style="list-style-type: none"> ○ Devitalisation of seed at the country of origin just prior to export. ○ Devitalisation 처리내용을 PC에 기재 	-
핵과류 (<i>Prunus</i> spp.) (자두, 복숭아, 체리, 살구, 아몬드 등)	재식용 핵(종자), 줄기묘목 접수·삽수 등 묘목류	<ul style="list-style-type: none"> ○ Freedom from: <ul style="list-style-type: none"> (a) Crown gall(<i>Agrobacterium tumefaciens</i>) (b) Hairy root(<i>A. rhizogenes</i>) (c) Bacterial die back of peach(<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> syn. <i>P. morsprunorum</i>) (d) Black knot(<i>Dibotrya morbosum</i>) (e) Gummosis(<i>Eutypa armeniaceae</i>) (f) Brown rot(<i>Monilinia fructicola</i>)(American strain_) (g) Blossom blight & fruit rot(<i>M. laxa</i>) (h) Scab(<i>Venturia cerasi</i>, <i>V. carpophila</i>) (i) Cherry leaf spot(<i>Blumeriella jaapii</i>) (j) Plum weevil(<i>Conotrachelus menuphar</i>) Stone viruses viz. <i>Prunus virus S</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1~2년간 격리재배 ○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요 ○ 접수·삽수 묘목류는 해충에 대해 적절한 방법으로 처리 또는 훈증 ○ 핵(종자)는 적절한 살균제 처리 ○ 처리는 수출국에서 선적전 실시하고 처리내용을 PC에 기재

<p>핵과류 (Prunus spp.) (자두, 복숭아, 체리, 살구, 아몬드 등)</p>	<p>조직배양체</p>	<p>○ Certified that the tissue-cultured plants obtained from mother stock indexed/tested and maintained virus-free.</p>	<p>○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요</p>
	<p>생과실</p>	<p>○ Freedom from: (a) Oriental fruit moth(Cydia molesta) (b) Gypsy moth(Lymantria dispar) (c) Mediterranean fruit fly(Ceratitis capitata) (d) Manchurian fruit moth(Cydia inopinata) (e) Cherry fruitworm(C. packardi) (f) Plum moth(C. prunivora) (g) Mexican fruitflies(Rhagoletis spp.) (h) Peach fruit moth(Carposina niponensis)</p>	<p>○ 국제기준에 따라 지중해과실파리 및 체리과실파리무발생 지역 산</p> <p>○ 21℃이상에서 2g/m³로 2시간 또는 이와 동등하게 MB훈증 처리 또는,</p> <p>○ 0℃이하에서 10일간/0.55℃이하에서 11일/1.1℃이하에서 12일간 선적 전 저온처리 및 저온수송</p>
	<p>식용 건조과실</p>	<p>○ Freedom from: (a) Mediterranean flour moth(Ephestia kuehniella) (b) Apricot chalcid</p>	<p>○ 28℃ 이상에서 16g/m³로 24시간 MB훈증 처리</p> <p>○ 처리내용을 PC에 기재</p>
<p>해바라기 (Helianthus spp.)</p>	<p>재식용 종자</p>	<p>○ Freedom from: (b) Leaf spot(Septoria helianthi) (d) Sunflower viruses viz. (e) Bruchid(Bruchidius spp.) (f) Larger Dermestid beetle(Trogoderma versicolor)</p>	<p>○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요</p> <p>○ 수출국에서 선적전 metalaxyl 2% 처리</p> <p>○ 처리내용을 PC에 기재</p>
	<p>식용 또는 가공용 씨앗</p>	<p>-</p>	<p>○ 수출전 devitalization 처리</p> <p>○ 처리내용을 PC에 기재</p>

원목	밤나무류 (<i>Castanea</i> spp.)	원목 (수피 포함)	○ Freedom from: (a) Chest nut blight(<i>Cryphonectria parasitica</i>)-American strain	○ 21℃ 이상에서 48g/m ³ 로 24시간 또는 이와 동등하게 MB훈증 또는 KD 처리 ○ 처리내용을 PC에 기재
	느릅나무류 (<i>Ulmus</i> spp.)	원목 (수피 포함)	○ Freedom from: (a) Dutch elm disease(<i>Ceratocystis ulmi</i>)-American & European strains (b) Elm bark beetle(<i>Scolytidae</i>)	○ 21℃ 이상에서 48g/m ³ 로 24시간 또는 이와 동등하게 MB훈증 또는 KD 처리 ○ 처리내용을 PC에 기재
	오크류 (<i>Quercus</i> spp.)	원목 (수피 포함)	○ Freedom from: (a) Oak wilt(<i>Ceratocystis fagacearum</i>) (b) Oak bark beetles(<i>Pseudopityophthorus</i> spp.)	○ 21℃ 이상에서 48g/m ³ 로 24시간 또는 이와 동등하게 MB훈증 또는 KD 처리 ○ 처리내용을 PC에 기재
	담배 (<i>Nictiana</i> <i>tabaccum</i>)	미가공 잎	○ Freedom from: (a) Chocolate moth(<i>Ephestia elutella</i>) (b) Blue mould(<i>Peronospora hyoscyami</i> f.sp. <i>tabacina</i>)	○ 톤당 ALP(인화늄) 3정을 5~7일간 처리
	토마토 (<i>Lycopersicon</i> <i>esculentum</i>)	채식용 종자	○ Freedom from: (a) <i>Peronospora hyoscyami</i> sp. <i>tabacina</i> (b) <i>Phoma andigena</i> (c) <i>Verticillium albo-atrum</i> (d) <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (e) Bacterial canker(<i>Clavibacter michiganensis</i> sub sp. <i>michiganensis</i>) (f) pepino mosaic, tomato aspermy, tomato black ring, tomato bushy stunt, tomato ring spot virus	-
	수박 (<i>Citrullus lanatus</i>)	채식용 종자	○ Freedom from: (a) Bacterial fruit blotch(<i>Acidovorax avenae</i> sub sp. <i>citrulli</i>) (c) Soft rot(<i>Xanthomonas melonis</i>) (d) Watermelon viruses viz squash mosaic virus (e) <i>Verticillium albo-atrum</i>	○ 상업적 수입시 DAC의 사전승인 필요
		식용 씨앗	-	○ 수출전 열처리하여 devitalization ○ 처리내용을 PC에 기재

|| 중앙아시아 ||

- 다음 품목은 '06년 이후 수출 기록이 있으며, 그 외 품목은 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 품목별로 수출가능 여부에 대한 확인이 필요함

15 우즈베키스탄

- 서양란묘, 선인장묘, 알로에묘, 양배추종자, 장미절화
- 상대국 검역기관이 수입허가서를 발급한 품목의 경우 수출 가능함

16 카자흐스탄

- 감자, 양배추종자

17 키르기즈스탄

- 선인장묘

2. 북미

18 미국

수출가능 품목

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미, 흑미)
- 과실류 : 감(단감), 감귤, 밤, 배, 참다래, 포도, 후지사과, 토마토
- 채소류 : 가지, 고들빼기, 고추, 근대, 냉이, 딸기(수출가능시기: 9.15~5.31), 땅콩, 더덕, 도라지, 두릅, 들깻잎, 마늘, 무, 미나리, 상추, 수박, 쪽, 생강, 시금치, 얌(Yam), 양갓냉이, 양파, 연근, 오이, 우엉, 참깻잎, 참외, 취나물, 토란, 파프리카, 호박, 호박잎
- ※ 미나리 : 뿌리가 없는 상태의 미나리 잎과 줄기로 상업화물로 수출하여야 함
- 종자류 : 가지, 고추, 당근, 무, 멜론, 배추, 브로콜리, 상추, 수박, 시금치, 양배추, 양파, 오이, 참외, 토마토, 파, 호박
- 버섯류 : 느타리, 만가닥, 송이, 새송이, 양송이, 영지, 표고, 팽이
- 절화류 : 글라디올러스, 백합, 심비디움, 장미, 카네이션, 튜립, 호접란, 국화
- 묘목·구근류(재배매체 제거) : 선인장, 호접란, 심비디움

수출불가 품목

- 곡 류 : 팥, 녹두, 옥수수
- 채소류 : 감자, 고구마, 당근, 배추, 브로콜리, 수삼, 양배추,
※ 박과류 중 Ivy gourd(*Coccinia grandis*)는 하와이 수출불가
- 과실류 : 대추, 복숭아, 살구, 자두
- 화훼묘·분화 : 재배매체에 심겨진 모든 식물

조건부 수출품목 및 요건

□ 조건부 수출품목

수출품목	수출검역 요건	비 고
감(단감)	○ 수출단지 지정, 재배지검사(3회), 선과검사 등	
감 곶 한라봉,천혜향	○ 선과장 등록, 표면살균, 수출검사	
국 화	○ 생산장소 지정, 재배지검사, 포장상자 표기, 수출검사('07년 미국이 검역요건 부과)	
딸 기	○ 수출가능 기간 : 9.15.~5.31.	
수 박	○ 온실등록, 재배지 예찰트랩조사, 수출검사 (12.1.~4. 30일 기간에만 수출 가능)	
오 이		
참 외		
호 박		
밤	○ MB훈증(수출전 또는 미국 도착 후) ○ 국내에서 수출전 MB훈증 시에는 미검역관 입회	
배	○ 수출단지 지정, 선과장 승인, 과실 봉지씌우기, ○ 재배지검사, 양국 검역관 합동 수출검사 등	
분 재 류	○ 양묘장 등록, 재배지 검사, 수출검사 * 미국 재식용 식물 검역강화 규정 발효에 따라 수출 전 사전 확인 필요	
사과(후지)	○ 40일간 저온처리 + 메틸브로마이드(MB) 훈증 ○ 양국 검역관 합동 수출검사	
파프리카	○ 수출단지 지정, 온실재배, 재배지검사, 수출검사	
포 도	○ 수출단지 지정, 과실 봉지씌우기, 재배지검사, 수출검사	
토 마 토	○ 수출단지 등록, 호박과실파리 예찰 및 절개검사 등	
뿌리달린 냉이	○ 수출포장 등록 및 토양검사, 수출검역 등	

□ 수출식물검역증명서 부기사항

품목	부기사항
감	The fruits in this shipment are free of <i>Conogethes punctiferalis</i> , <i>Planococcus kraunhiae</i> , <i>Stathmopoda masinissa</i> and <i>Tenuipalpus zhizhilashiviliae</i> .
감귤 한라봉 천혜향	The fruit was given a surface sterilization in accordance with 7CFR part 305 and was inspected and found free of <i>Elsinoe australis</i> . ※ 오렌지더듬이병 표면살균을 실시한 경우 추가 부기사항 : The citrus in this consignment were cleaned using normal packinghouse procedures.
국화(절화)	The place of production as well as the consignment have been inspected and found free of <i>Puccinia horiana</i> .”
뿌리달린 냉이	The shepherd's purse with roots in this consignment has been produced and inspected in accordance with the requirements of 7 CFR 319.56-51 and found free from <i>Hemicycliophora koreana</i> , <i>Paratylenchus pandus</i> , <i>Rotylenchus orientalis</i> , and <i>Rotylenchus pini</i> .
미나리	The water dropwort (<i>Oenanthe javanica</i>) in this shipment was inspected and considered free from Water Dropwort Withes's Broom and <i>Puccinia oenanthes-stoloniferae</i> .
박과작물 (참외, 오이, 호박, 수박)	The regulated articles in this shipment were grown in registered greenhouses as specified by 7CFR 319.56-36.
밤 (한국에서 MB혼증시)	This is to certify that this consignment is composed solely of chestnuts covered by the attached Master PPQ Form 203, Number_____, issued by APHIS officer _____. ※ 밤을 저장 후 수출하거나, 저장 후 2회 이상 분할하여 수출하는 경우
밤 (미국에서 MB혼증시)	Although the shipment has been observed to be inspected, the Import Permit will insure treatment in the U.S.A. to render it free of pests.
배 후지사과	This is to further certify that this consignment is composed solely of fruit covered by the attached Master PPQ FORM 203 (NO._____) issued by APHIS officer _____. Container NO.: _____, SEAL NO. : _____ ※ 한·미 검역관 합동검사 후 미국검역관이 떠난 후에 적용
분 재	These plants were grown in accordance with 7 CFR 319-37-5(q)(2)(i)-(v). ※ 알락하늘소·유리알락하늘소 기주식물인 경우 : The plants for planting in this shipment, including all plant part (e.g. rootstock, scion, etc.) were solely grown in Korea under the condition of Federal Order #DA-2011-18 dated April, 2011 and the place of production and the plants are, and have been, found free of signs and presence of <i>A. chinensis</i> and/or <i>A. glabripennis</i> .
파프리카	These peppers were grown in greenhouses in accordance with the conditions in 7CFR 319.56-42 and were inspected and found free from <i>Agrotis segetum</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Helicoverpa assulta</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Monilinia fructigena</i> , <i>Ostrinia furnacalis</i> , <i>Scirtothrips dorsalis</i> , <i>Spodoptera litura</i> , and <i>Thrips palmi</i> .
포도	The fruit in the shipment was found free from <i>C. punctiferalis</i> , <i>E. ambiguella</i> , <i>S. pilleriana</i> , <i>S. auriferella</i> , <i>M. fructigena</i> and <i>Nippoptilia vitis</i> .
토마토	Tomatoes in this consignment were grown in pest-exclusionary structures in accordance with the conditions in 7CFR 319.56-52 and were inspected and found free from <i>Bactrocera depressa</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Helicoverpa assulta</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Ostrinia furnacalis</i> , <i>Scirtothrips dorsalis</i> , and <i>Thrips palmi</i> .

19 미국(팜, 사이판)

수출가능 품목

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미, 흑미), 대두
- 과실류 : 감(단감), 감귤, 배, 사과, 참다래, 포도, 밤, 토마토, 복숭아, 넥타린, 살구, 자두, 양벚, 비과(Loquat)
- 채소류 : 가지, 감자, 고구마, 고들빼기, 고추, 근대, 냉이, 당근, 대황(Rhubarb), 딸기(수출가능시기: 9.15~5.31), 땅콩, 더덕, 도라지, 두릅, 들깻잎, 마늘, 마쉬멜로우잎, 무, 미나리, 배추, 상추, 셀러리, 수박, 쪽, 생강, 시금치, 순무, 아티초크(Artichoke), 얀(Yam), 양갓냉이, 양배추, 양파, 연근, 완두, 오이, 오크라, 우엉, 참깻잎, 참외, 취나물, 콩(Bean), 파속식물(*Allium* spp.), 파슬리, 파프리카, 호박, 호박잎

※ 파속(*Allium* sp.) 식물은 지상부가 없는 상태의 Bulb만 수출 가능

- 종자류 : 가지, 고추, 당근, 무, 멜론, 배추, 브로콜리, 상추, 수박, 양배추, 양파, 오이, 참외, 토마토, 파, 호박
- 버섯류 : 송이, 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이, 양송이, 만가닥
- 절화류 : 장미, 카네이션, 심비디움, 호접란, 튜립, 글라디올러스, 백합, 국화
- 묘목, 구근류(재배매체 제거) : 선인장, 호접란, 심비디움

★ 밤, 국화의 수출검역요건과 미나리의 수출식물검역증명서 부기사항은 미국(본토, 하와이) 참고

수출불가 품목

- 곡 류 : 팥, 녹두, 옥수수
- 채소류 : 토란, 박과작물 중 Ivy gourd(*Coccinia grandis*)는 수출불가

20 멕시코

- 수출이 가능한 품목은 아래 종자류이며, 그 외 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함
- 현재 사과, 배, 토마토, 접목선인장 및 입병채배 버섯류는 수출허용을 요청하여 상대국이 PRA 절차를 진행 중임

수출가능 품목

- 종자류

학명	한글명
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	꽃양배추
<i>Allium cepa</i>	양파
<i>Capsicum annum</i>	고추
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>	카르마 양배추
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	꽃양배추
<i>Lactuca sativa</i>	상추
<i>Cucumis melo</i>	참외
<i>Brassica rapa</i>	유채
<i>Brassica chinensis</i>	청경채
<i>Capsicum frutescens</i>	고추
<i>Raphanus sativus</i>	무
<i>Citrullus lanatus</i>	수박
<i>Solanum melongena</i>	가지
<i>Cucurbita maxima</i>	밤호박
<i>Spinacea oleracea</i>	시금치
<i>Allium porrum</i>	유리파

21 캐나다

수출가능 품목

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미, 흑미), 콩, 옥수수, 수수, 팥
- 과실류 : 감귤, 감(단감), 참다래, 대추, 꽃감, 밤, 사과, 배, 밤, 포도
- 채소류 : 가지, 고추(피망), 호박, 냉이, 달래, 들깻잎, 미나리, 배추, 브로콜리, 부추, 상추, 썩, 썩갓, 취나물, 당근, 도라지, 무, 양파, 연근, 토란, 참깨, 고구마, 수박, 참외, 오이, 메론, 토마토, 양배추
- 종자류 : 고추, 토마토, 박, 수박, 오이, 참외, 호박, 근대, 대파, 부추, 상추, 시금치, 썩갓, 아욱, 양배추, 청경채, 당근, 무, 양파, 인삼
- 버섯류 : 송이, 양송이, 팽이, 표고, 아가리쿠스, 재배매체가 부착된 버섯류
- 절화류 : 거베라, 국화, 글라디올러스, 백합, 장미, 아이리스, 안개초, 카네이션, 칼라, 튜립, 프리지아, 해바라기, 난초
- 묘목·구근류(재배매체 제거) : 동양란, 서양란, 소사나무묘, 심비디움, 철쭉속(*Rhododendron* spp.), 풍란

수출불가 품목

- 곡 류 : 보리, 밀
- 과실류 : 복숭아, 살구, 자두
- 채소류 : 감자, 딸기
- 화훼류 기타 : 낙상홍, 단풍나무, 소나무, 블루베리묘목, 사과묘목

조건부 수출품목 및 요건

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고																																	
캐나다	밤	<p>○ 수출국에서 MB(Methyl Bromide)훈증 또는 온탕처리(Hot Water Treatment)하고 동 사실을 PC에 부기해야 함.</p> <p>○ PC 부기사항(부기모델)</p> <p><MB훈증의 경우></p> <p>- 상압훈증(Normal atmospheric)</p> <p>“Material was fumigated with 약량(lbs/1,000ft³) methyl bromide at _____ Celcius degree(_____ Farenheit degrees) for __ hours at normal atmospheric pressure</p> <p>- 26"진공훈증(26" vacuum)</p> <p>“Material was fumigated with 약량(lbs/1,000ft³) methyl bromide at _____ Celcius degree(_____ Farenheit degrees) for __ hours at in a 26" vacuum.</p> <p><온탕처리의 경우>(50℃에서 최소 45분간)</p> <p>“Material was hot water treated for a minimum of 45 minutes at 50 Celcius degrees(122 Farenheit degrees)</p> <p>○ MB훈증 기준</p> <p>- 상압훈증(Normal atmospheric)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">32-36℃</td> <td style="width: 35%;">MB 65g/m³(4lbs/1,000ft³)</td> <td style="width: 50%;">3시간</td> </tr> <tr> <td>27-31℃</td> <td>MB 65g/m³(4lbs/1,000ft³)</td> <td>4시간</td> </tr> <tr> <td>21-26℃</td> <td>MB 80g/m³(5lbs/1,000ft³)</td> <td>4시간</td> </tr> <tr> <td>16-20℃</td> <td>MB 80g/m³(5lbs/1,000ft³)</td> <td>5시간</td> </tr> <tr> <td>10-15℃</td> <td>MB 96g/m³(6lbs/1,000ft³)</td> <td>5시간</td> </tr> <tr> <td>4-9℃</td> <td>MB 96g/m³(6lbs/1,000ft³)</td> <td>6시간</td> </tr> </table> <p>- 26"진공훈증(26" vacuum)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">27-36℃</td> <td style="width: 35%;">MB 48g/m³(3lbs/1,000ft³)</td> <td style="width: 50%;">2시간</td> </tr> <tr> <td>21-26℃</td> <td>MB 64g/m³(4lbs/1,000ft³)</td> <td>2시간</td> </tr> <tr> <td>16-20℃</td> <td>MB 64g/m³(4lbs/1,000ft³)</td> <td>3시간</td> </tr> <tr> <td>10-15℃</td> <td>MB 64g/m³(4lbs/1,000ft³)</td> <td>4시간</td> </tr> <tr> <td>4-9℃</td> <td>MB 64g/m³(4lbs/1,000ft³)</td> <td>5시간</td> </tr> </table>	32-36℃	MB 65g/m ³ (4lbs/1,000ft ³)	3시간	27-31℃	MB 65g/m ³ (4lbs/1,000ft ³)	4시간	21-26℃	MB 80g/m ³ (5lbs/1,000ft ³)	4시간	16-20℃	MB 80g/m ³ (5lbs/1,000ft ³)	5시간	10-15℃	MB 96g/m ³ (6lbs/1,000ft ³)	5시간	4-9℃	MB 96g/m ³ (6lbs/1,000ft ³)	6시간	27-36℃	MB 48g/m ³ (3lbs/1,000ft ³)	2시간	21-26℃	MB 64g/m ³ (4lbs/1,000ft ³)	2시간	16-20℃	MB 64g/m ³ (4lbs/1,000ft ³)	3시간	10-15℃	MB 64g/m ³ (4lbs/1,000ft ³)	4시간	4-9℃	MB 64g/m ³ (4lbs/1,000ft ³)	5시간	
32-36℃	MB 65g/m ³ (4lbs/1,000ft ³)	3시간																																		
27-31℃	MB 65g/m ³ (4lbs/1,000ft ³)	4시간																																		
21-26℃	MB 80g/m ³ (5lbs/1,000ft ³)	4시간																																		
16-20℃	MB 80g/m ³ (5lbs/1,000ft ³)	5시간																																		
10-15℃	MB 96g/m ³ (6lbs/1,000ft ³)	5시간																																		
4-9℃	MB 96g/m ³ (6lbs/1,000ft ³)	6시간																																		
27-36℃	MB 48g/m ³ (3lbs/1,000ft ³)	2시간																																		
21-26℃	MB 64g/m ³ (4lbs/1,000ft ³)	2시간																																		
16-20℃	MB 64g/m ³ (4lbs/1,000ft ³)	3시간																																		
10-15℃	MB 64g/m ³ (4lbs/1,000ft ³)	4시간																																		
4-9℃	MB 64g/m ³ (4lbs/1,000ft ³)	5시간																																		

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고
	배	<ul style="list-style-type: none"> ○ 캐나다 수출단지에서 생산된 과실만 수출 가능 ○ 포장 Box에 “캐나다 수출용(For Canada)” 과 “재배자명”을 영문으로 표기 ○ PC에 다음사항 중 한가지 부기 <p><British Columbia주로 수송될 화물에 대하여></p> <ul style="list-style-type: none"> - “The material was produced under a pest management program and is free of <i>Alternaria gaisen</i>, <i>Carposina sasakii</i>, <i>Conogethes(Dichocrocis) punctiferalis</i>, <i>Grapholita molesta</i>, <i>Numonia pirivorella</i>, <i>Monilinia fructigena</i>, <i>T. truncatus</i> and <i>A. viennensis</i>” <p><British Columbia주 이외의 주로 수송될 화물에 대하여></p> <ul style="list-style-type: none"> - “The material was produced under a pest management program and is free of <i>Alternaria gaisen</i>, <i>Carposina sasakii</i>, <i>Conogethes(Dichocrocis) punctiferalis</i>, <i>Numonia pirivorella</i>, <i>Monilinia fructigena</i>, <i>T. truncatus</i> and <i>A. viennensis</i>” <p>※ PC는 선적전 14일이내에 발급되어야 하며, 원본은 캐나다행 선적화물에 첨부시킴.</p>	
	사과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 캐나다 수출단지에서 생산된 과실만 수출 가능 ○ 포장 Box에 “캐나다 수출용(For Canada)” 과 “재배자명”을 영문으로 표기 ○ PC에 다음사항 중 한가지 부기 <p><나무에 생육하는 동안 봉지를 씌웠고 British Columbia주로 수송될 화물에 대하여></p> <ul style="list-style-type: none"> - “The material was produced under a pest management program and is free of <i>Grapholita molesta</i>, <i>Carposina sasakii</i>, <i>Dichocrocis punctiferalis</i>, <i>Gymnosporangium yamada</i>, <i>Sclerotinia fructigena</i>, <i>Amphitetranychus viennensis</i>” <p><나무에 생육하는 동안 봉지를 씌웠고 British Columbia주 이외의 주로 수송될 화물에 대하여></p> <ul style="list-style-type: none"> - “The material was produced under a pest management program and is free of <i>Carposina sasakii</i>, <i>Dichocrocis punctiferalis</i>, <i>Gymnosporangium yamada</i>, <i>Sclerotinia fructigena</i>, <i>Amphitetranychus viennensis</i>” 	

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고
	사과	<p><나무에 생육하는 동안 봉지를 씌우지 않고 소독처리(MB 혼증+저온처리 또는 저온처리+MB 혼증)된 사과로서 British Columbia 주로 수송될 화물에 대하여></p> <p>- “The material was produced under a pest management program for <i>Gymnosporangium yamada</i> and <i>Sclerotinia fructigena</i>, and has been treated to kill <i>Grapholita molesta</i>, <i>Carposina sasakii</i>, <i>Dichocrocis punctiferalis</i>, and <i>Amphitetranychu viennensis</i>”</p> <p><나무에 생육하는 동안 봉지를 씌우지 않고 소독처리(MB 혼증+저온처리 또는 저온처리+MB 혼증)된 사과로서 British Columbia 주 이외의 주로 수송될 화물에 대하여></p> <p>- “The material was produced under a pest management program for <i>Gymnosporangium yamada</i> and <i>Sclerotinia fructigena</i>, and has been treated to kill <i>Carposina sasakii</i>, <i>Dichocrocis punctiferalis</i>, and <i>Amphitetranychu viennensis</i>”</p> <p>※ 국립식물검역소가 예찰결과 보고서를 캐나다 식품검사청에 통보한 다음 동 기관으로부터 선적을 하여도 좋다는 서신을 받은 후 선적</p> <p>※ PC는 선적전 14일이내에 발급되어야 하며, 원본은 캐나다행 선적화물에 첨부시킴.</p> <p>※ PC사본을 화물의 도착항이 위치하고 있는 캐나다 식품검사청 지역사무소에 적어도 화물이 도착하기 3일전까지 FAX 송부해야 함. → PC발급 즉시 사본을 수출지원과로 FAX 송부</p>	

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고
	난초류	<p>☐ 흙 또는 흙과 유사한 배양체를 사용한 경우 : 수입금지</p> <p>☐ 승인된 배양체를 사용한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수출자는 캐나다 배양체 프로그램(Canadian Growing Media program)에 의거 사전승인을 받아야 함. ○ PC에 다음사항 부기 <p>“The material was propagated in conformance with the Canadian Growing Media Program” (동 식물은 캐나다 배양체 프로그램에 부합하는 방식으로 증식되었음)</p> <p>☐ 배양체를 사용하지 않은 경우(뿌리가 노출된 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 흙, 모래 및 기타 부식물이 없어야 함. ○ PC에 다음사항중 한가지 부기 <p>“Material was grown in soil where the potato wart disease(<i>Synchytrium endobioticum</i>) has not been recorded and where, based on official soil surveys or other precautionary practices, the potato cyst nematode (<i>Globodera rostochiensis</i> and <i>Globodera pallida</i>) and the soybean cyst nematode(<i>Heterodera glycines</i>) do not occur” (동 식물은 감자암종병이 발생하지 않은 토양 및 토양에 대한 공식적인 조사 또는 기타 방법에 의해 감자씨스트선충 및 콩씨스트선충이 발생하지 않는 지역에서 재배되었음)</p> <p>“Potato wart disease(<i>Synchytrium endobioticum</i>), potato cyst nematode (<i>Globodera rostochiensis</i> and <i>G. pallida</i>) and the soybean cyst nematode(<i>Heterodera glycines</i>) do not occur in the country of origin of the plant material” (동 식물의 원산국에서는 감자암종병, 감자씨스트선충 및 콩씨스트선충이 발생하지 않음)</p> <p>☐ 멸균된 용기내에 agar 또는 액체배지상에서 조직배양된 난초류</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수출자는 캐나다 배양체 프로그램(Canadian Growing Media program)에 의거 사전승인을 받지 않아도 됨. ○ PC첨부(부기사항 없음) 	<p>캐나다 식품검사청 고시 D-96-20 (배양체 프로그램) 참조</p>

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고
		☐ 돌, 수피가 없는 목가공품과 같이 단단한 불활성물체의 표면에 뿌리가 노출된 상태로 착생한 난초류 ☐ 수출자는 캐나다 배양체 프로그램(Canadian Growing Media program)에 의거 사전승인을 받지 않아도 됨. ☐ PC첨부(부기사항 없음)	
	묘목류 (수입이 허용된 품목만 해당)	<p style="text-align: center;"><u><캐나다의 금지품이 아닌 뿌리가 부착된 식물류></u></p> <p>※ 수입금지품목 : <i>Pinus spp., Prunus spp., Acer spp., Abies spp., Larix spp., Picea spp., Ulmus spp., Malus spp., Pyrus spp., Fraxinus spp., Vitis spp.</i> 등</p> <p>※ 재식용 식물 검역강화 규정(NAPPRA) 발효에 따라 수출 전 사전 확인 필요</p> ☐ 흙 또는 흙과 관련된 물질이 부착된 경우 : 수입금지 ☐ 흙이나 재배매체가 없는 경우 ☐ 흙, 모래 및 기타 부식물이 없어야 함. ☐ PC에 다음사항 중 한가지 부기 <p>“Material was grown in soil where the potato wart disease(<i>Synchytrium endobioticum</i>) has not been recorded and where, based on official soil surveys or other precautionary practices, the potato cyst nematode (<i>Globodera rostochiensis</i> and <i>Globodera pallida</i>) and the soybean cyst nematode(<i>Heterodera glycines</i>) do not occur” (동 식물은 감자암종병이 발생하지 않은 토양 및 토양에 대한 공식적인 조사 또는 기타 방법에 의해 감자씨스트선충 및 콩씨스트선충이 발생하지 않는 지역에서 재배되었음)</p> <p>“Potato wart disease(<i>Synchytrium endobioticum</i>), potato cyst nematode (<i>Globodera rostochiensis</i> and <i>G. pallida</i>) and the soybean cyst nematode(<i>Heterodera glycines</i>) are known not to occur in the country of origin of the plant material” (동 식물의 원산국에서는 감자암종병, 감자씨스트선충 및 콩씨스트선충이 발생하지 않음)</p> ☐ 사용하지 않은 다음의 승인된 포장재료(Packing Material)를 사용해야 함. <p>“buckwheat hulls, cork(ground), paper, peat moss (processed/treated), polyacrylamide(water absorbing polymers), rice chaff, rockwool, sawdust, sphagnum moss(dried/treated), vermiculite, wood shavings (excelsior)</p>	

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고
		☐ 승인된 배양체를 사용한 경우 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수출자는 캐나다 배양체 프로그램(Canadian Growing Media program)에 의거 사전승인을 받아야 함. ○ PC 부기사항 <p>“The material was produced in conformance with the Canadian Growing Media Program” (동 식물은 캐나다 배양체 프로그램에 부합되게 생산되었음)</p> ☐ 멸균된 용기내에 agar 또는 액체배지상에서 조직배양된 묘목류 <ul style="list-style-type: none"> ○ PC첨부(부기사항 없음) <p style="text-align: center;"><u><캐나다의 금지품이 아닌 뿌리가 부착되지 않은 식물류></u></p> ○ 사용하지 않은 승인된 포장재료(Packing Material)를 사용해야 함. 	
	재배매체 부착된 한국산 입병재배 버섯	☐ 농림축산검역본부의 생산시설에 대한 사전 승인 필요 <ul style="list-style-type: none"> ○ PC 부기사항 <p>“This shipment's growing media is free from soil and originated from a pre-approved production facility(승인받은 시설명).” (동 선적분의 재배매체는 흙 부착이 없고, 사전 승인된 시설에서 생산된 것임)</p> 	
	포도	☐ 한국산 포도 생과실의 캐나다 수출검역요령에 따라 생산 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수출단지 지정, 봉지씌우기, 재배지검역, 선과검사, 포장상자에 농가코드번호 기재, 수출검역 등 ○ 부기사항 : 없음 <ul style="list-style-type: none"> ※ 봉지씌우기 재배를 하지 않은 경우 MB 훈증소독 후 수출가능 	
	인삼종자	<ul style="list-style-type: none"> ○ PC 부기사항 <ul style="list-style-type: none"> - 식물검역증명서에 인삼 탄저병 무감염 부기 - 부기사항: "The material in this consignment is free of <i>Colletotrichum panacicola</i>" ○ 토양 및 식물체 잔재물(줄기, 잎, 기타 식물체 지상부) 미혼입

3. 남미국가

22 과테말라

- 수출이 가능한 품목은 아래 채소종자 2종이며, 그 외 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함
- 채소종자 2종{토마토(*Lycopersicum esculentum*), 고추(*Capsicum spp.*) 종자} 부기사항

수출불가 품목

- 신선 농산물 중 수출이 가능한 품목은 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함
- 채소종자 8품목(무, 배추, 양배추, 상추, 브로콜리, 오이, 호박, 당근 종자)은 수출허용 요청을 하여 상대국이 PRA 절차를 진행 중임

국 문

동 화물은 검은무늬병(*Alternarica brassicicola*), 모자이크병(Broad bean wilt virus), 거저리과 해충(*Gonocephalum spp.*), 담배나방(*Helicoverpa assulta*), 캐나다엉겅퀴(*Cirsium arvense*) 및 띠(화분과 식물, *Imperata cylindrica*)에 감염되지 않았음

영 문

This consignment is free from *Alternarica brassicicola*, Broad bean wilt virus, *Gonocephalum spp.*, *Helicoverpa assulta*, *Cirsium arvense* and *Imperata cylindrica*.

23 브라질

수출가능 품목

- 수출이 가능한 품목은 아래 채소종자 8종이며, 그 외 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함
- 채소종자 8종 {브로콜리(*Brassica oleracea* var. *italica*), 케일(*Brassica oleracea* var. *acephala*), 배추(*Brassica campestris* var. *pekinensis*), 방울양배추(*Brassica oleracea* var. *gemmifera*), 콜리플라워(*Brassica oleracea* var. *botrytis*), 콜라비(*Brassica oleracea* var. *gongylodes*), 양배추(*Brassica oleracea* var. *capitata*), 무(*Raphanus sativus*) 종자} 부기사항

국 문

I - AD8: 공식적인 검역병해충 목록에 의거, *Tobacco rattle virus*와 *Tomato black ring virus*는 한국에 분포하지 않는 검역병해충이다.

II - AD5: 종자의 생산포장은 재배기간 중 공식적인 검사를 받았으며 *Albugo macrospora*, *Cladosporium variabile*, *Colletotrichum higginsianum* 및 *Fusarium oxysporum* f. sp. *Spinaciae*가 검출되지 않았다.

또는

AD15: 공식적인 실험실검사 결과, 화물은 *Albugo macrospora*, *Cladosporium variabile*, *Colletotrichum higginsianum* 및 *Fusarium oxysporum* f. sp. *Spinaciae*에 감염되지 않았다.

III - AD5: 종자의 생산포장은 재배기간 중 공식적인 검사를 받았으며 *Euphorbia esula*, *Euphorbia helioscopia*, *Hibiscus trionum*, *Imperata cylindrica*, *Polygonum nepalense*, *Senecio vulgaris*, *Setaria pumila*, *Sonchus arvensis*가 검출되지 않았다.

또는

AD15: 공식적인 실험실검사 결과, 화물은 *Euphorbia esula*, *Euphorbia helioscopia*, *Hibiscus trionum*, *Imperata cylindrica*, *Polygonum nepalense*, *Senecio vulgaris*, *Setaria pumila*, *Sonchus arvensis*에 감염되지 않았다.

IV - AD5 : 종자의 생산포장은 재배기간 중 공식적인 검사를 받았으며 *Cirsium arvense*, *Cuscuta australis*, *Cuscuta campestris*, *Orobanche* spp.가 검출되지 않았다.

그리고

AD15: 공식적인 실험실검사 결과, 화물은 *Cirsium arvense*, *Cuscuta australis*, *Cuscuta campestris*, *Orobanche* spp.에 감염되지 않았다.

V - AD2: 화물은 *Latheticus oryzae*과 *Acarus siro*을 방제하기 위하여 공식적인 감독 하에 소독처리 되었다. (약제명, 약량 또는 농도, 온도, 처리 시간 반드시 명기)

VI - AD2: 공식적인 실험실검사 결과, 화물은 *Ditylenchus dipsaci*에 감염되지 않았다.

영문

I - AD8: *Tobacco rattle virus* and *Tomato black ring virus* are quarantine pests, absent in the Republic of Korea according to the official quarantine pest list;

II - AD5: the seeds' place of production was submitted to official inspection during the growing season and *Albugo macrospora*, *Cladosporium variabile*, *Colletotrichum higginsianum* and *Fusarium oxysporum* f. sp. *spinaciae* were not detected;

or

AD15: the consignment is free from *Albugo macrospora*, *Cladosporium variabile*, *Colletotrichum higginsianum* and *Fusarium oxysporum* f. sp. *spinaciae*, according to the official laboratory report;

III - AD5: the seeds' place of production was submitted to official inspection during the growing season and *Euphorbia esula*, *Euphorbia helioscopia*, *Hibiscus trionum*, *Imperata cylindrica*, *Polygonum nepalense*, *Senecio vulgaris*, *Setaria pumila* and *Sonchus arvensis* were not detected;

or

AD15: the consignment is free from *Euphorbia esula*, *Euphorbia helioscopia*, *Hibiscus trionum*, *Imperata cylindrica*, *Polygonum nepalense*, *Senecio vulgaris*, *Setaria pumila* and *Sonchus arvensis*, according to the official laboratory report;

IV - AD5: the seeds' place of production was submitted to official inspection during the growing season and *Cirsium arvense*, *Cuscuta australis*, *Cuscuta campestris* and *Orobanche* spp., Were not detected;

and

AD15: the consignment is free from *Cirsium arvense*, *Cuscuta australis*, *Cuscuta campestris* and *Orobanche* spp., according to the official laboratory report;

V - AD2: the consignment have been treated with (must specify: product, dose or concentration, temperature, time-frame of exposure) under official supervision to control *Latheticus oryzae* and *Acarus siro*;

VI - AD15: the consignment is free from *Ditylenchus dipsaci*, according to the official laboratory report.

수출불가 품목

- 현재 배 생과실과 채소종자 9품목{상추, 토마토, 오이, 호박, 당근, 파, 양파, 수박, 메론}은 수출허용을 요청하여 상대국이 PRA 절차를 진행 중임

24 베네수엘라

수출가능 품목

- 종자류 11품목{당근, 메론, 박초이(청경채), 배추, 상추, 수박, 시금치, 양배추, 양파, 오이, 토마토}은 베네수엘라 식물검역기관의 수입허가 및 수출식품검역증명서를 첨부하는 조건으로 수출가능
- 이외 수출이 가능한 품목은 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

25 아르헨티나

수출가능 품목

- 종자류 : 수박, 양배추, 배추, 상추, 당근, 시금치, 토마토, 오이, 양파, 메론, 박초이(청경채)

※ 수출식품검역증명서에 컨테이너번호 반드시 기재

- 채소종자 이외의 품목에 대한 수출가능 여부는 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함
- 현재 사과, 배 생과실은 수출허용을 요청하여 상대국이 PRA 절차를 진행 중임
- 건인삼(백삼) 및 건은행잎은 아르헨티나측이 우려하는 *Trogoderma* spp.(수수랭이류) 등 병해충에 대한 검사를 철저히 실시하고 이상이 없을 경우 다음 사항이 부기된 PC첨부
 “This product has been thoroughly inspected and found free from *Trogoderma* spp.”

26 우루과이

- 신선 농산물 중 수출이 가능한 품목은 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계자료도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

중 에콰도르

- 신선 농산물 중 수출이 가능한 품목은 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계자료도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함
- 현재 사과, 배, 파프리카 생과실 및 채소종자 9품목{무, 배추, 양배추, 상추, 브로콜리, 토마토, 오이, 호박, 당근}은 수출허용을 요청하여 상대국이 PRA 절차를 진행 중임

28 칠레

수출가능 품목

- 종자류 : 무, 배추 등
- 과실류 : 사과·배
 - ※ 재배 중 검사 및 수출식물검역증명서에 우려병해충 미감염 부기
- 상기 품목 이 외에 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

조건부 수출품목 및 요건

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고
칠레	사과	<p>○ PC 부기사항</p> <p>“This is to certify that apples covered by this certificate are free of <i>Anthonomus pomorum</i>, <i>Carposina sasaki</i>, <i>Dichodrosis punctiferalis</i>, <i>Ectomyelois pyrivorella</i>, <i>Rhynchites heros</i> and they have been grown in the designated export area”</p> <p>(이 화물은 대칠레 수출재배단지에서 생산되었으며 배꽃바구미 · 복숭아거위벌레 · 복숭아심식나방 · 복숭아명나방 · 배명나방 · 참거위벌레에 감염되지 아니하였음)</p>	
	배	<p>○ PC 부기사항</p> <p>“This is to certify that pears covered by this certificate are free of <i>Anthonomus pomorum</i>, <i>Carposina sasaki</i>, <i>Dichodrosis punctiferalis</i>, <i>Ectomyelois pyrivorella</i>, <i>Rhynchites heros</i> and they have been grown in the designated export area”</p> <p>(이 화물은 대칠레 수출재배단지에서 생산되었으며, 검사 결과 배꽃바구미 · 복숭아거위벌레 · 복숭아심식나방 · 복숭아명나방 · 배명나방에 감염되지 아니하였음)</p>	

< 국산 과채·아로마용·약용 종자류의 대칠레 수출검역요건 >
칠레규정 제7386호('14.2.18. 시행) 및 제9254호('15.3.26. 시행)

부기요건이 있는 경우

- 종자류에 대한 PC 부기사항 유형 (표 가항)
 - 재배기간 중 소독처리 결과 그리고/또는 재배지검역 결과 무발생포장 증명
 - 재배기간 중 재배지검역 결과 무발생포장 증명 그리고/또는 실험실분석(진단기술 명시) 결과
- 소독처리 적용 기준
 - 콩바구미과 해충: USDA 및 FAO 기준에 따라 수출국에서 MB 또는 PH3 소독처리 (참고 1)
 - 콩바구미과 이외 병해충: 수출국에서 이행하는 소독처리방법 인정
 - * 소독처리 방법 및 결과는 식물검역증명서 III항(소독 결과)에 부기
- 재배지검역 절차는 농림축산검역본부고시 「수출식물의 검역요령」을 따름
- 병해충이 우리나라 미분포 시 소독처리 및 재배지검역 결과 부기사항 대체 가능
“ (병해충)이 (한국)에 미분포함 ”
 - 해당 병해충별 국내 분포 여부 및 대체 부기사항 영문 (참고 2)

부기요건이 없는 경우

- 일반 수출검역 결과 합격 시 부기사항 없이 PC 발급 (표 다항)

공통 수출검역요건

- 흙 및 식물체 잔재물이 포함되지 않을 것
- 최초 사용하는 신규 용기에 포장하고, 라벨을 부착할 것

국산 과채 · 아로마 · 약용 종자류의 대칠레 수출검역요건

가. 수출검역증명서에 소독처리, 재배지검역, 실험실분석 결과 부기

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
<i>Abelmoschus esculentus</i> (오크라 okra) (= <i>Hibiscus esculentus</i>)	<ul style="list-style-type: none"> The shipment has been subjected to fumigation treatment (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) to control <i>Callosobruchus maculatus</i> (Family: Bruchidae) in accordance with the Regulation Article 3. 	<ul style="list-style-type: none"> 본 화물은 동 결의한 제3항에 명시된 바에 따라 <i>Callosobruchus maculatus</i>(Bruchidae 과) 방제를 위해 훈증소독처리를 실시하였음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것)
<i>Allium ampeloprasum</i> (코끼리마늘) <i>Allium ascalonicum</i> (쪽파 shallot) <i>Allium cepa</i> (양파) <i>Allium fistulosum</i> (파) <i>Allium porrum</i> (리크, leek) <i>Allium schoenoprasum</i> <i>Allium tuberosum</i> (부추)	<ul style="list-style-type: none"> The shipment has been treated to control <i>Alternaria porri</i> (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Alternaria porri</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> 본 화물은 <i>Alternaria porri</i> 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 재배지검역 결과 <i>Alternaria porri</i> 무발생 포장에서 생산되었음
<i>Apium graveolens</i> (셀러리)	<ul style="list-style-type: none"> The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum acutatum</i> and <i>Phoma apiicola</i> (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum acutatum</i> and <i>Phoma apiicola</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> 본 화물은 <i>Colletotrichum acutatum</i> 및 <i>Phoma apiicola</i> 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum acutatum</i> 및 <i>Phoma apiicola</i> 무발생 포장에서 생산되었음
<i>Apium graveolens</i> var. <i>rapaceum</i> (셀러리악 celeriac)	<ul style="list-style-type: none"> The shipment has been treated to control <i>Phoma apiicola</i> (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or The shipment comes from a field inspection during the last period of active growth and found free of <i>Phoma apiicola</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> 본 화물은 <i>Phoma apiicola</i> 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 마지막 재배기간 중의 재배지 검역 결과 <i>Phoma apiicola</i> 무발생 포장에서 생산되었음

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
<i>Benincasa hispida</i> (동아, 동과)	<ul style="list-style-type: none"> • The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or • The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • 본 화물은 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 • 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 무발생 포장에서 생산되었음
<i>Cajanus cajan</i> (비둘기콩)	<ol style="list-style-type: none"> 1. • The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum truncatum</i> (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or • The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum truncatum</i>. <ol style="list-style-type: none"> 2. The shipment has been subjected to fumigation treatment (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) to control <i>Callosobruchus</i> spp. and <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Family: Bruchidae) in accordance with the Regulation Article 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. • 본 화물은 <i>Colletotrichum truncatum</i> 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 • 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum truncatum</i> 무발생 포장에서 생산되었음 <ol style="list-style-type: none"> 2. 본 화물은 동 결의한 제3항에 명시된 바에 따라 <i>Callosobruchus</i> spp. 및 <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Bruchidae 과) 방제를 위해 훈증소독처리를 실시하였음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것)
<i>Capsicum annuum</i> (var. <i>longum</i> , <i>grossum</i>) (고추) <i>Capsicum baccatum</i> (고추속의 일종) <i>Capsicum chinense</i> (고추속의 일종) <i>Capsicum frutescens</i> (고추속의 일종) <i>Capsicum nahum</i> (고추속의 일종) <i>Capsicum pubescens</i> (푸베센스고추 apple chile)	<ul style="list-style-type: none"> • The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum acutatum</i> and <i>C. capsici</i> (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or • The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum acutatum</i> and <i>C. capsici</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • 본 화물은 <i>Colletotrichum acutatum</i> 및 <i>C. capsici</i> 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 • 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum acutatum</i> 및 <i>C. capsici</i> 무발생 포장에서 생산되었음

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
<i>Cicer arietinum</i> (매부리콩/쌈갈콩 chick-pea)	<ul style="list-style-type: none"> • The shipment has been treated to control <i>Ascochyta rabiei</i> (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or • The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Ascochyta rabiei</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • 본 화물은 <i>Ascochyta rabiei</i> 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 • 재배지검역 결과 <i>Ascochyta rabiei</i> 무발생 포장에서 생산되었음
<i>Citrullus lanatus</i> (수박) (= <i>C. vulgaris</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. • The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> and <i>Acidovorax avenae</i> ssp. <i>citrulli</i>. or • The shipment is free of <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> and <i>Acidovorax avenae</i> ssp. <i>citrulli</i> according to the official result of laboratory analysis indicating the diagnostic technique used. <ol style="list-style-type: none"> 2. • The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or • The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. • 본 화물은 재배기간 동안 재배지검역 및 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> 및 <i>Acidovorax avenae</i> ssp. <i>citrulli</i> 무발생 포장에서 생산되었음 또는 • 본 화물은 실험실 공식 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> 및 <i>Acidovorax avenae</i> ssp. <i>citrulli</i> 무감염되었음 * 실험실 공식 분석은 소독처리 이전에 이행되어야 함 <ol style="list-style-type: none"> 2. • 본 화물은 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 • 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 무발생 포장에서 생산되었음

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
<i>Coriandrum sativum</i> (고수 coriander)	<p>1. • The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>(= <i>X. campestris</i> pv. <i>carotae</i>)</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>• The shipment is free of <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>(= <i>X. campestris</i> pv. <i>carotae</i>) according to the official result of laboratory analysis indicating the diagnostic technique used.</p> <p>2. • The shipment has been treated to control <i>Phoma apicola</i> (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III)</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>• The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Phoma apicola</i>.</p>	<p>1. • 본 화물은 재배기간 동안 재배지검역 및 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>(= <i>X. campestris</i> pv. <i>carotae</i>) 무발생 포장에서 생산되었음</p> <p style="text-align: center;">또는</p> <p>• 본 화물은 실험실 공식 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>(= <i>X. campestris</i> pv. <i>carotae</i>) 무감염되었음</p> <p style="text-align: center;">* 실험실 공식 분석은 소독 처리 이전에 이행되어야 함</p> <p>2. • 본 화물은 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것)</p> <p style="text-align: center;">또는</p> <p>• 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 무발생 포장에서 생산되었음</p>
<i>Cucumis melo</i> (멜론)	<p>1. • The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> and <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i>.</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>• The shipment is free of <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> and <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> according to the official result of laboratory analysis indicating the diagnostic technique used.</p>	<p>1. • 본 화물은 재배기간 동안 재배지검역 및 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> 및 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> 무발생 포장에서 생산되었음</p> <p style="text-align: center;">또는</p> <p>• 본 화물은 실험실 공식 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> 및 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> 무감염되었음</p> <p style="text-align: center;">* 실험실 공식 분석은 소독 처리 이전에 이행되어야 함</p>

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
- <i>Cucumis melo</i> (멜론) 계속 -	<p>2. • The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III)</p> <p>or</p> <p>• The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>).</p>	<p>2. • 본 화물은 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는</p> <p>• 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 무발생 포장에서 생산되었음</p>
<i>Cucumis metuliferus</i> (오이속의 일종)	<p>1. • The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i></p> <p>or</p> <p>• The shipment is free of <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> according to the official result of laboratory analysis indicating the diagnostic technique used.</p> <p>2. • The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III)</p> <p>or</p> <p>• The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>).</p>	<p>1. • 본 화물은 재배기간 동안 재배지검역 및 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>X. campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> 무발생 포장에서 생산되었음 또는</p> <p>• 본 화물은 실험실 공식 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>X. campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> 무감염되었음</p> <p>* 실험실 공식 분석은 소독처리 이전에 이행되어야 함</p> <p>2. • 본 화물은 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는</p> <p>• 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 무발생 포장에서 생산되었음</p>

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
<i>Cucumis sativus</i> (오이)	<p>1. • The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> and <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i>.</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>• The shipment is free of <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> and <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> according to the official result of laboratory analysis indicating the diagnostic technique used.</p> <p>2. • The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III)</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>• The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>).</p>	<p>1. • 본 화물은 재배기간 동안 재배지검역 및 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> 및 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> 무발생 포장에서 생산되었음</p> <p style="text-align: center;">또는</p> <p>• 본 화물은 실험실 공식 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> 및 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> 무감염되었음</p> <p style="text-align: center;">* 실험실 공식 분석은 소독 처리 이전에 이행되어야 함</p> <p>2. • 본 화물은 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것)</p> <p style="text-align: center;">또는</p> <p>• 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 무발생 포장에서 생산되었음</p>
<p><i>Cucurbita ficicolla</i>(호박속의 일종) <i>Cucurbita foetidissima</i>(호박속의 일종) <i>Cucurbita maxima</i> (호박(서양종) giant pumpkin) <i>Cucurbita moschata</i>(호박(동양종))</p>	<p>1. • The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i>.</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>• The shipment is free of <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> according to the official result of laboratory analysis indicating the diagnostic technique used.</p>	<p>1. • 본 화물은 재배기간 동안 재배지검역 및 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> 무발생 포장에서 생산되었음</p> <p style="text-align: center;">또는</p> <p>• 본 화물은 실험실 공식 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> 무감염되었음</p> <p style="text-align: center;">* 실험실 공식 분석은 소독 처리 이전에 이행되어야 함</p>

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
- <i>Cucurbita ficicolla</i> , <i>Cucurbita foetidissima</i> , <i>Cucurbita maxima</i> , <i>Cucurbita moschata</i> 계속 -	<p>2. • The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III)</p> <p>or</p> <p>• The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>).</p>	<p>2. • 본 화물은 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는</p> <p>• 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 무발생 포장에서 생산되었음</p>
<i>Cucurbita pepo</i> (조롱박) <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>medullosa</i> (호박속의 일종)	<p>1. • The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> and <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i>.</p> <p>or</p> <p>• The shipment is free of <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> and <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> according to the official result of laboratory analysis indicating the diagnostic technique used.</p> <p>2. • The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III)</p> <p>or</p> <p>• The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>).</p>	<p>1. • 본 화물은 재배기간 동안 재배지검역 및 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> 및 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> 무발생 포장에서 생산되었음</p> <p>또는</p> <p>• 본 화물은 실험실 공식 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> 및 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> 무감염되었음</p> <p>* 실험실 공식 분석은 소독처리 이전에 이행되어야 함</p> <p>2. • 본 화물은 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는</p> <p>• 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 무발생 포장에서 생산되었음</p>

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
<i>Daucus carota</i> (당근)	<ul style="list-style-type: none"> The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>(= <i>X. campestris</i> pv. <i>carotae</i>) or The shipment is free of <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>(= <i>X. campestris</i> pv. <i>carotae</i>) according to the official result of laboratory analysis indicating the diagnostic technique used. 	<ul style="list-style-type: none"> 본 화물은 재배기간 동안 재배지검역 및 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>(= <i>X. campestris</i> pv. <i>carotae</i>) 무발생 포장에서 생산되었음 또는 본 화물은 실험실 공식 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>(= <i>X. campestris</i> pv. <i>carotae</i>) 무감염되었음 * 실험실 공식 분석은 소독 처리 이전에 이루어져야 함
<i>Foeniculum dulce</i> (회향 fennel) (= <i>F. vulgare</i> var. <i>dulce</i>) <i>Foeniculum vulgare</i> (회향 common fennel)	<ul style="list-style-type: none"> The shipment has been treated to control <i>Phoma apiicola</i> (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Phoma apiicola</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> 본 화물은 <i>Phoma apiicola</i> 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 재배지검역 결과 <i>Phoma apiicola</i> 무발생 포장에서 생산되었음
<i>Lablab purpureus</i> (= <i>Dolichos lablab</i>) (편두 lablab-bean)	<ol style="list-style-type: none"> The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> and <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>. or The shipment is free of <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> and <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> according to the official result of laboratory analysis indicating the diagnostic technique used. 	<ol style="list-style-type: none"> 본 화물은 재배기간 동안 재배지검역 및 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> 및 <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> 무발생 포장에서 생산되었음 또는 본 화물은 실험실 공식 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> 및 <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> 무감염되었음 * 실험실 공식 분석은 소독 처리 이전에 이루어져야 함

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
- <i>Lablab purpureus</i> (= <i>Dolichos lablab</i>) 계속 -	2. The shipment has been subjected to fumigation treatment (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) to control <i>Callosobruchus</i> spp. and <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Family: Bruchidae) in accordance with the Regulation Article 3.	2. 본 화물은 동 결의한 제3항에 명시된 바에 따라 <i>Callosobruchus</i> spp. 및 <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Bruchidae 과) 방제를 위해 훈증소독처리를 실시하였음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것)
<i>Lagenaria siceraria</i> (박과 bottle ground)	<ul style="list-style-type: none"> The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> 본 화물은 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 무발생 포장에서 생산되었음
<i>Lathyrus sativus</i> (하늘콩 clickling-pea) <i>Lens culinaris</i> (렌틸콩 lentil)	<ul style="list-style-type: none"> The shipment has been subjected to fumigation treatment (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) to control <i>Bruchidius</i> spp.(except <i>B. endotubercularis</i>), <i>Bruchus</i> sp.(except <i>B. pisorum</i> and <i>B. rufimanus</i>), <i>Callosobruchus</i> spp. and <i>Zabrotes subfasciatus</i>(Col.: Bruchidae) in accordance with the Regulation Article 3. 	<ul style="list-style-type: none"> 본 화물은 동 결의한 제3항에 명시된 바에 따라 <i>Bruchidius</i> spp.(<i>B. endotubercularis</i> 제외), <i>Bruchus</i> sp.(<i>B. pisorum</i> 및 <i>B. rufimanus</i> 제외), <i>Callosobruchus</i> spp. 및 <i>Zabrotes subfasciatus</i>(Bruchidae 과) 방제를 위해 훈증소독처리를 실시하였음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것)

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
<p><i>Lycopersicon esculentum</i>(토마토) (= <i>Solanum lycopersicum</i>) <i>Lycopersicon esculentum</i> × <i>Lycopersicon hirsutum</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of Potato spindle tuber viroid(PSTVd). or • The shipment is free of Potato spindle tuber viroid(PSTVd) according to the official result of laboratory analysis. 	<ul style="list-style-type: none"> • 본 화물은 재배기간 동안 재배지검역 및 분석*(진단기술명시) 결과 Potato spindle tuber viroid(PSTVd) 무발생 포장에서 생산되었음 또는 • 본 화물은 실험실 공식 분석 * 결과 Potato spindle tuber viroid(PSTVd) 무감염되었음 * 실험실 공식 분석은 소독처리 이전에 이행되어야 함
<p><i>Morinda charantia</i>(여주 balsam pear)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or • The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • 본 화물은 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 • 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 무발생 포장에서 생산되었음
<p><i>Petroselinum crispum</i> (<i>P. hortense</i>) (파슬리)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The shipment has been treated to control <i>Phoma apiicola</i> (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or • The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Phoma apiicola</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • 본 화물은 <i>Phoma apiicola</i> 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 • 재배지검역 결과 <i>Phoma apiicola</i> 무발생 포장에서 생산되었음

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
<p><i>Phaseolus coccineus</i> (=<i>P. multiflorus</i>) (강남콩속의 일종 multiflora bean)</p> <p><i>Phaseolus lunatus</i> (강남콩속의 일종 lama bean)</p> <p><i>Phaseolus vulgaris</i> (강남콩 kidney bean)</p>	<p>1. • The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>.</p> <p>or</p> <p>• The shipment is free of <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> according to the official result of laboratory analysis indicating the diagnostic technique used.</p> <p>2. • The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum truncatum</i> (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III)</p> <p>or</p> <p>• The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum truncatum</i>.</p> <p>3. The shipment has been subjected to fumigation treatment (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) to control <i>Bruchidius</i> spp.(except <i>B. endotubercularis</i>), <i>Bruchus</i> sp.(except <i>B. pisorum</i> and <i>B. rufimanus</i>), <i>Callosobruchus</i> spp. and <i>Zabrotes subfasciatus</i>(Col.: Bruchidae) in accordance with the Regulation Article 3.</p>	<p>1. • 본 화물은 재배기간 동안 재배지검역 및 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> 무발생 포장에서 생산되었음 또는</p> <p>• 본 화물은 실험실 공식 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> 및 <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> 무감염되었음 * 실험실 공식 분석은 소독 처리 이전에 이행되어야 함</p> <p>2. • 본 화물은 <i>Colletotrichum truncatum</i> 방제를 위해 소독 처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는</p> <p>• 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum truncatum</i> 무발생 포장에서 생산되었음</p> <p>3. 본 화물은 동 결의한 제3항에 명시된 바에 따라 <i>Bruchidius</i> spp.(<i>B. endotubercularis</i> 제외), <i>Bruchus</i> sp.(<i>B. pisorum</i> 및 <i>B. rufimanus</i> 제외), <i>Callosobruchus</i> spp. 및 <i>Zabrotes subfasciatus</i>(Bruchidae 과) 방제를 위해 훈증소독처리를 실시하였음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것)</p>

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
<i>Pisum sativum</i> (완두콩)	<p>1. • The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>psii</i>.</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>• The shipment is free of <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>psii</i> according to the official result of laboratory analysis indicating the diagnostic technique used.</p> <p>2. The shipment has been subjected to fumigation treatment (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) to control <i>Bruchidius</i> spp.(except <i>B. endotuberculosis</i>), <i>Callosobruchus</i> spp. and <i>Zabrotes subfasciatus</i>(Family: Bruchidae) in accordance with the Regulation Article 3.</p>	<p>1. • 본 화물은 재배기간 동안 재배지검역 및 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>psii</i> 무발생 포장에서 생산되었음</p> <p style="text-align: center;">또는</p> <p>• 본 화물은 실험실 공식 분석*(진단기술 명시) 결과 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>psii</i> 무감염되었음</p> <p style="text-align: center;">* 실험실 공식 분석은 소독 처리 이전에 이행되어야 함</p> <p>2. 본 화물은 동 결의한 제3항에 명시된 바에 따라 <i>Bruchidius</i> spp.(<i>B. endotuberculosis</i> 제외), <i>Callosobruchus</i> spp. 및 <i>Z a b r o t e s subfasciatus</i>(Bruchidae 과) 방제를 위해 훈증소독처리를 실시하였음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것)</p>
<i>Sesum edule</i> (박과 <i>Sesum</i> 속의 일종)	<p>• The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III)</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>• The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>).</p>	<p>• 본 화물은 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것)</p> <p style="text-align: center;">또는</p> <p>• 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum orbiculare</i>(= <i>C. lagenarium</i>) 무발생 포장에서 생산되었음</p>

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
<i>Solanum tuberosum</i> (씨감자 potato seed)	<ul style="list-style-type: none"> The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of Potato spindle tuber viroid(PSTVd) and Arracacha virus B. 	<ul style="list-style-type: none"> 본 화물은 재배지검역 및 정밀분석(진단법 부기) 결과 Potato spindle tuber viroid(PSTVd) 및 Arracacha virus B 무발생 포장에서 생산되었음
<i>Vicia faba</i> (잠두 broad bean)	<ul style="list-style-type: none"> The shipment has been subjected to fumigation treatment (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) to control <i>Bruchidius</i> spp.(except <i>B. endotubercularis</i>), <i>Bruchus</i> sp.(except <i>B. pisorum</i> and <i>B. rufimanus</i>), <i>Callosobruchus</i> spp. and <i>Zabrotes subfasciatus</i>(Family: Bruchidae) in accordance with the Regulation Article 3. 	<ul style="list-style-type: none"> 본 화물은 동 결의한 제3항에 명시된 바에 따라 <i>Bruchidius</i> spp.(<i>B. endotubercularis</i> 제외), <i>Bruchus</i> sp.(<i>B. pisorum</i> 및 <i>B. rufimanus</i> 제외), <i>Callosobruchus</i> spp. 및 <i>Zabrotes subfasciatus</i>(Bruchidae 과) 방제를 위해 훈증소독처리를 실시하였음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것)
<i>Vigna angularis</i> (팥) (= <i>Phaseolus angularis</i>)	<ol style="list-style-type: none"> The shipment has been subjected to fumigation treatment (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) to control <i>Bruchidius</i> spp.(except <i>B. endotubercularis</i>), <i>Bruchus</i> sp.(except <i>B. pisorum</i> and <i>B. rufimanus</i>), <i>Callosobruchus</i> spp. and <i>Zabrotes subfasciatus</i>(Family: Bruchidae) in accordance with the Regulation Article 3. <ul style="list-style-type: none"> The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum truncatum</i> (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum truncatum</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 본 화물은 동 결의한 제3항에 명시된 바에 따라 <i>Bruchidius</i> spp.(<i>B. endotubercularis</i> 제외), <i>Bruchus</i> sp.(<i>B. pisorum</i> 및 <i>B. rufimanus</i> 제외), <i>Callosobruchus</i> spp. 및 <i>Zabrotes subfasciatus</i>(Bruchidae 과) 방제를 위해 훈증소독처리를 실시하였음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) <ul style="list-style-type: none"> 본 화물은 <i>Colletotrichum truncatum</i> 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum truncatum</i> 무발생 포장에서 생산되었음

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
<i>Vigna mungo</i> (= <i>Phaseolus mungo</i>) (강낭콩속의 일종 black gram)	<p>1. • The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>.</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>• The shipment is free of <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> according to the official result of laboratory analysis indicating the diagnostic technique used.</p> <p>2. The shipment has been subjected to fumigation treatment (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) to control <i>Bruchidius</i> spp.(except <i>B. endotubercularis</i>), <i>Bruchus</i> spp.(except <i>B. pisorum</i> and <i>B. rufimanus</i>), <i>Callosobruchus</i> spp. and <i>Zabrotes subfasciatus</i>(Family: Bruchidae) in accordance with the Regulation Article 3.</p> <p>3. • The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum truncatum</i> (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III)</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>• The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum truncatum</i>.</p>	<p>1. • 본 화물은 재배지검역 및 정밀분석(진단법 부기) 결과 <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> 무발생 포장에서 생산되었음</p> <p style="text-align: center;">또는</p> <p>• 본 화물은 진단법에 따른 실험실정밀 결과 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> 및 <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> 무감염되었음</p> <p>2. 3. 본 화물은 동 결의한 제3항에 명시된 바에 따라 <i>Bruchidius</i> spp.(<i>B. endotubercularis</i> 제외), <i>Bruchus</i> spp.(<i>B. pisorum</i> 및 <i>B. rufimanus</i> 제외), <i>Callosobruchus</i> spp. 및 <i>Zabrotes subfasciatus</i>(Bruchidae 과) 방제를 위해 훈증소독처리를 실시하였음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것)</p> <p>3. • 본 화물은 <i>Colletotrichum truncatum</i> 방제를 위해 소독처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것)</p> <p style="text-align: center;">또는</p> <p>• 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum truncatum</i> 무발생 포장에서 생산되었음</p>

종자 학명(일반명)	부기사항	
	영문(비공식)	국문
<p><i>Vigna radiata</i> var. <i>radiata</i>(녹두) (=<i>Phaseolus aureus</i>) <i>Vigna unguiculata</i>(동부콩 cowpea) (=<i>Vigna sinensis</i>)</p>	<p>1. • The shipment comes from a seed that was inspected and analyzed (specify diagnostic technique) during the period of active growth and found free of <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>. or • The shipment is free of <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> according to the official result of laboratory analysis indicating the diagnostic technique used.</p> <p>2. The shipment has been subjected to fumigation treatment (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) to control <i>Bruchidius</i> spp.(except <i>B. endotubercularis</i>), <i>Bruchus</i> spp.(except <i>B. pisorum</i> and <i>B. rufimanus</i>), <i>Callosobruchus</i> spp. and <i>Zabrotes subfasciatus</i>(Family: Bruchidae) in accordance with the Regulation Article 3.</p> <p>3. • The shipment has been treated to control <i>Colletotrichum truncatum</i> (specify the treatment section of the Phytosanitary Certificate III) or • The shipment comes from a field inspection during the period of active growth and found free of <i>Colletotrichum truncatum</i>.</p>	<p>1. • 본 화물은 재배지검역 및 정밀분석(진단법 부기) 결과 <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> 무발생 포장에서 생산되었음 또는 • 본 화물은 진단법에 따른 실험실정밀 결과 <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> 무감염되었음</p> <p>2. 3. 본 화물은 동 결의한 제3항에 명시된 바에 따라 <i>Bruchidius</i> spp.(<i>B. endotubercularis</i> 제외), <i>Bruchus</i> spp.(<i>B. pisorum</i> 및 <i>B. rufimanus</i> 제외), <i>Callosobruchus</i> spp. 및 <i>Z a b r o t e s subfasciatus</i>(Bruchidae 과) 방제를 위해 훈증소독처리를 실시하였음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것)</p> <p>3. • 본 화물은 <i>Colletotrichum truncatum</i> 방제를 위해 소독 처리되었음 (식물위생증명서 항목 III에 소독처리 결과를 부기할 것) 또는 • 재배지검역 결과 <i>Colletotrichum truncatum</i> 무발생 포장에서 생산되었음</p>

콩바구미과 해충에 대한 종자류 소독처리 요건

1) 상압 훈증상에서 MB 훈증 대상 종자류

Abelmoschus esculentus, *Cajanus cajan*, *Lablab purpureus*, *Lathyrus sativus*, *Lens culinaris*, *Phaseolus coccineus*(=*P. multiflorus*), *Phaseolus lunatus*, *Phaseolus vulgaris*, *Pisum sativum*, *Vigna angularis*, *Vigna mungo*(= *Phaseolus mungo*), *Vigna radiata* var. *radiata*(= *Phaseolus aureus*), *Vigna unguiculata*(= *Vigna sinensis*)

온도 (°C)	약량 (g/m ³)	최소 농도(g):					
		0.5시간	2시간	2.5시간	3시간	3.5시간	4시간
> 21.1	48	38	-	24	-	-	-
15.5 - 21.0	48	38	29	-	24	-	-
10.0 - 15.4	48	38	29	-	-	24	-
4.4 - 9.9	48	38	29	-	-	-	24

USDA/APHIS/PPQ 소독처리 매뉴얼 T203-d-1

2) 진공 훈증상에서 MB 훈증(660mm = 26") 대상 종자: *Vicia faba*

약량 (g/m ³)	투약시간 (시간)	온도 (°C)
48	3.5	21.1 - 35.5
48	4	15.5 - 21.0
48	4.5	10.0 - 15.4
48	5	4.4 - 9.9

USDA/APHIS/PPQ 소독처리 매뉴얼 T203-d-2

3) 포스핀 훈증: 상기 1) 및 2)에서 언급한 모든 종자류

약량 (g/m ³)	투약시간 (일)	온도 (°C)
2.5	7	12 - 15.9
2.5	6	16 - 20.9
2.5	5	21 - 25.9
2.5	4	26 이상

FAO 해충 방제 훈증처리 매뉴얼

칠레측 우려 병해충에 대한 국내 분포 여부*

국내 분포(14종)	국내 미분포(11종)
<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Collosobruchus</i> spp.[Bruchidae과 (콩바구미과)] - 국내 분포종: <i>Collosobruchus chinensis</i> (팥바구미) ○ <i>Bruchidius</i> spp. [Bruchidae과 (콩바구미과)] - 국내 분포종: <i>Bruchidius coreanus</i>, <i>B. dorsalis</i>, <i>B. japonicus</i>, <i>B. urbanus</i>, <i>B. compactus</i> ○ <i>Bruchus</i> spp. [Bruchidae과 (콩바구미과)] - 국내 분포종: <i>Bruchus pisorum</i>, <i>B. rufimanus</i> ○ <i>Alternaria porri</i> ○ <i>Colletotrichum orbiculare</i> (= <i>C. lagenarium</i>) ○ <i>Colletotrichum truncatum</i> ○ <i>Colletotrichum acutatum</i> ○ <i>Acidovorax avenae</i> ssp. <i>citrulli</i> ○ <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Callosobruchus maculatus</i> [Bruchidae과 (콩바구미과)] ○ <i>Zabrotes subfasciatus</i> [Bruchidae과 (콩바구미과)] ○ <i>Phoma apiicola</i> ○ <i>Colletotrichum capsici</i> ○ <i>Ascochyta rabiei</i> ○ <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> ○ <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> (= <i>X. campestris</i> pv. <i>carotae</i>) ○ <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> ○ <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> ○ Potato spindle tuber viroid (감자갈축병) ○ Arrancacha virus B

* 2015. 3월 현재 상황이므로 수출식물검역증명서 발급 시점에 우리나라 분포 여부 재확인 필요

국내 미분포 병해충에 대한 종자류 대체 부기사항

병해충 학명	부기사항	
	영문(비공식)	국문
<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Callosobruchus maculatus</i> [Bruchidae(콩바구미과)] ○ <i>Zabrotes subfasciatus</i> [Bruchidae(콩바구미과)] ○ <i>Phoma apiicola</i> ○ <i>Colletotrichum capsici</i> ○ <i>Ascochyta rabiei</i> ○ <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> ○ <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>carotae</i> ○ <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>ptsi</i> ○ <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> ○ Potato spindle tuber viroid (감자갈쪽병) ○ Arrancacha virus B 	<p>“(pest(s)) is/are not present in (country).”</p>	<p>“(병해충)은 (국가)에 분포하지 않음”</p>

나. 수출검역증명서 발급 대상 종자류 (특정 부기사항 없음)

학명	일반명(영명)
<i>Achillea millefolium</i>	톱풀속의 일종
<i>Anethum graveolens</i>	소회향
<i>Angelica arcangelica</i>	당귀속의 일종
<i>Anthemis nobilis</i>	<i>Anthemis</i> 속의 일종
<i>Anthriscus cerefolium</i>	<i>Anthriscus</i> 속의 일종(chervil)
<i>Arctium lappa</i>	우엉
<i>Arnica montana</i>	숨방망이속의 일종
<i>Arnica</i> spp.	숨방망이속
<i>Asparagus officinalis</i>	아스파라거스
<i>Artemisia absinthium</i>	쑥속의 일종
<i>Artemisia dracunculus</i>	쑥속의 일종(tarragon)
<i>Artemisia nobilis</i>	쑥속의 일종
<i>Atriplex hortensis</i>	산시금치
<i>Barbarea verna</i> (= <i>B. praecox</i>)	후추풀(cress)
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>hortensis</i>	근대속의 일종
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>cicla</i>	근대속의 일종
<i>Bixa orellana</i>	홍목과 <i>Bixa</i> 속의 일종
<i>Borago officinalis</i>	서양지치
<i>Brassica campestris</i>	배추
<i>Brassica campestris</i> (ssp. <i>chinensis</i> , <i>pekinensis</i> , <i>rapifera</i>)	배추속의 일종
<i>Brassica carinata</i>	배추속의 일종
<i>Brassica juncea</i>	갓
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	스웨덴 순무
<i>Brassica nigra</i>	흑갓

학명	일반명(영명)
<i>Brassica oleracea</i> (var. <i>acephala</i> , <i>botrytis</i> , <i>capitata</i> , <i>gemmifera</i> , <i>gongylodes</i> , <i>italica</i>)	양배추 등
<i>Brassica perviridis</i>	배추속의 일종
<i>Brassica rapa</i> var. <i>japonica</i>	배추속의 일종
<i>Calendula officinalis</i>	금잔화속의 일종(garden marigold)
<i>Capparis</i> spp.	풍접초과 <i>Capparis</i> 속
<i>Carum carvi</i>	장회향(caraway)
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	산형과 <i>Chaerophyllum</i> 속의 일종
<i>Chelidonium majus</i>	애기똥풀(greater celandine)
<i>Cichorium endivia</i> (var. <i>crispum</i> , <i>latifolia</i>)	꽃상추속의 일종
<i>Cichorium intybus</i>	치커리
<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>	꽃상추속의 일종
<i>Cnicus benedictus</i>	국화과 <i>Cnicus</i> 속의 일종
<i>Cryptotaenia japonica</i>	파드득나물
<i>Cuminum cyminum</i>	커민 cummin
<i>Cymbopogon citratus</i>	레몬그래스 lemon grass
<i>Cynara scolymus</i>	아티초크 artichoke
<i>Echinacea angustifolia</i>	국화과 <i>Echinacea</i> 속의 일종
<i>Echinacea purpurea</i>	국화과 <i>Echinacea</i> 속의 일종 (purple coneflower)
<i>Eruca sativa</i>	십자화과 <i>Eruca</i> 속의 일종 (garden rocket)
<i>Eruca vesicaria</i>	십자화과 <i>Eruca</i> 속의 일종 (purple-vein rocket)
<i>Galium odoratum</i>	솔나무속의 일종
<i>Hesperis steviniana</i>	국화과 <i>Hesperis</i> 속의 일종
<i>Hypericum perforatum</i>	서양고추나물
<i>Hypericum olympicum</i>	물레나무속의 일종

학명	일반명
<i>Lactuca sativa</i>	상추
<i>Lavandula latifolia</i>	꿀풀과 <i>Lavandula</i> 속의 일종
<i>Lavandula angustifolia</i> (= <i>L. officinalis</i>)	라벤더
<i>Lepidium album</i>	다닥냉이속의 일종
<i>Lepidium sativum</i>	큰다닥냉이
<i>Lippia citriodora</i>	레몬버베나(lemon verbena)
<i>Lippia triphylla</i>	<i>Lippia</i> 속의 일종
<i>Macromeria viminea</i>	지치과 <i>Macromeria</i> 속의 일종
<i>Matricaria chamomilla</i>	카밀레
<i>Matricaria recutita</i> (= <i>Chamomilla recutita</i>)	개꽃속의 일종
<i>Melissa officinalis</i>	꿀풀과 <i>Melissa</i> 속의 일종
<i>Mentha arvensis</i>	박하
<i>Mentha citrata</i> (= <i>M. piperita</i> var. <i>citrata</i>)	박하속의 일종
<i>Mentha gentilis</i> (= <i>M. arvensis</i> × <i>M. spicata</i>)	박하속의 일종
<i>Mentha piperita</i> (<i>M. aquatica</i> × <i>M. spicata</i>)	매운 박하
<i>Mentha pulegium</i>	박하속의 일종
<i>Montia perfoliata</i>	박하속의 일종
<i>Myrrhis odorata</i>	스위트시슬리(sweet cicely)
<i>Nasturtium officinalis</i>	십자화과 <i>Nasturtium</i> 속의 일종
<i>Nepeta cataria</i>	개박하
<i>Ocimum basilicum</i>	바실
<i>Origanum majorana</i> (= <i>Magorana hortensis</i>)	꿀풀과 <i>Origanum</i> 속의 일종
<i>Origanum vulgare</i>	꽃박하

학명	일반명
<i>Pelargonium asperum</i>	제라늄속의 일종
<i>Physalis peruviana</i>	케이프구즈베리
<i>Pimpinella anisum</i>	아니스(anise)
<i>Piper nigrum</i>	후추
<i>Plantago lanceolata</i>	창질경이
<i>Raphanus sativus</i>	무우
<i>Raphanus sativus</i> (var. <i>longipinnatus</i> , <i>radicula</i>)	무우아재비, 갯무
<i>Rosmarinus officinalis</i>	로즈마리
<i>Rosmarinum prostratus</i>	꿀풀과 <i>Rosmarinum</i> 속의 일종
<i>Rumex acetosa</i>	수영 sorrel
<i>Rumex acetocella</i>	애기수영
<i>Rumex scutatus</i>	여뀌과 소리쟁이속의 일종
<i>Ruscus aculeatus</i>	러스커스
<i>Ruta bracteosa</i> (= <i>R. graveolens</i>)	운향과 <i>Ruta</i> 속의 일종
<i>Salvia officinalis</i>	세이지(sage)
<i>Salvis</i> spp.	사루비아속
<i>Sambucus nigra</i>	딱총나무속의 일종
<i>Satureja hortensis</i>	세이보리(savory)
<i>Satureja</i> spp.	꿀풀과 <i>Satureja</i> 속의 일종
<i>Sinapis alba</i>	들갓속의 일종
<i>Solanum melongena</i>	가지
<i>Spinacea oleracea</i>	시금치

학명	일반명
<i>Tanacetum parthenium</i>	쑥국화속의 일종
<i>Taraxacum officinale</i>	서양민들레
<i>Tetragonia expansa</i> (= <i>T. tetragonioides</i>)	뉴질랜드시금치
<i>Thymus</i> spp.	백리향속
<i>Tragopogon porrifolius</i>	쇠채아재비속의 일종
<i>Tropaeolum majus</i>	한련 indian cress
<i>Urtica dioica</i>	췌기풀속의 일종
<i>Valeriana officinalis</i>	쥐오줌풀
<i>Valerianella locusta</i> (= <i>V. olitoria</i>)	돌상추

29 콜롬비아

수출가능 품목

- 채소종자 11품목{수박, 양배추, 배추, 상추, 당근, 시금치, 토마토, 오이, 양파, 메론, 박초이(청경채)}은 수출이 가능하며, 수출시 재배지 검사 및 수출식물검역증명서를 첨부해야 함
- 채소종자 11품목 외 수출이 가능한 품목은 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계자료도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

조건부 수출품목 및 요건

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고
콜롬비아	오이종자	<p>○ PC 부기사항</p> <p>“The seed has been inspected on growing season” “The seed is free from noxious weed” “The seed is believed not to be GMO” (종자는 생산지에서 재배지 검사를 했음) (작물에 해를 주는 잡초가 혼입되지 않았음) (수출종자는 유전자 변형된 것이 아닐 것)</p> <p>“<i>Fusarium oxysporum</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>, Squash mosaic virus have not been detected from the seed” (종자에서 <i>Fusarium oxysporum</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>, Squash mosaic virus 등이 전혀 검출되지 않았음)</p> <p>“The seed has been grown in the area free from <i>Cladosporium cucumerium</i>” (<i>Cladosporium cucumerium</i>이 검출되지 않은 지역에서 생산된 것임)</p> <p>“The seed is free from <i>Trogoderma granarium</i>” (<i>Trogoderma granarium</i>이 검출되지 않았음)</p>	
	박과류 종자 (Gourd, Calabash)	<p>○ PC 부기사항</p> <p>“The seed has been inspected on growing season” “The seed is free from noxious weed” “The seed is believed not to be GMO” (종자는 생산지에서 재배지 검사를 했음) (작물에 해를 주는 잡초가 혼입되지 않았음) (수출종자는 유전자 변형된 것이 아닐 것)</p> <p>“The seed is free from <i>Cladosporium cucumerium</i>, <i>Phoma citrulina</i>” (종자에서 <i>Cladosporium cucumerium</i>, <i>Phoma citrulina</i> 등이 전혀 검출되지 않았음)</p>	

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고
	<p>토마토 종자</p>	<p>○ PC 부기사항</p> <p>“The seed has been inspected on growing season” “The seed is free from noxious weed” “The seed is believed not to be GMO” (종자는 생산지에서 재배지 검사를 했음) (작물에 해를 주는 잡초가 혼입되지 않았음) (수출종자는 유전자 변형된 것이 아닐 것)</p> <p>“The seed is free from <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>, Tomato black ring virus, Tomato bunchy top virus, Tomato ring spot virus” (종자에서 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>, Tomato black ring virus, Tomato bunchy top virus, Tomato ring spot virus 등이 전혀 검출되지 않았음)</p>	
	<p>무종자</p>	<p>○ PC 부기사항</p> <p>“The seed has been inspected on growing season” “The seed is free from noxious weed” “The seed is believed not to be GMO” (종자는 생산지에서 재배지 검사를 했음) (작물에 해를 주는 잡초가 혼입되지 않았음) (수출종자는 유전자 변형된 것이 아닐 것)</p> <p>“The seed is free from <i>Phoma lingam</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Alternaria brassicicola</i>, <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>, <i>Leptosphaeria maculans</i>” (종자에서 <i>Phoma lingam</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Alternaria brassicicola</i>, <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>, <i>Leptosphaeria maculans</i> 등이 전혀 검출되지 않았음)</p> <p>“The seed is free from <i>Trogoderma granarium</i>” (<i>Trogoderma granarium</i>이 검출되지 않았음)</p>	

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고
	브로콜리 종자, 꽃양배추 종자, 순무종자	○ PC 부기사항 “The seed has been inspected on growing season” “The seed is free from noxious weed” “The seed is believed not to be GMO” (종자는 생산지에서 재배지 검사를 했음) (작물에 해를 주는 잡초가 혼입되지 않았음) (수출종자는 유전자 변형된 것이 아닐 것) “The seed is free from <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> ” (종자에서 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> 등이 전혀 검출되지 않았음) “The seed is free from <i>Trogoderma granarium</i> ” (<i>Trogoderma granarium</i> 이 검출되지 않았음)	
	상추종자	○ PC 부기사항 “The seed has been inspected on growing season” “The seed is free from noxious weed” “The seed is believed not to be GMO” (종자는 생산지에서 재배지 검사를 했음) (작물에 해를 주는 잡초가 혼입되지 않았음) (수출종자는 유전자 변형된 것이 아닐 것) “The seed is free from <i>Septoria lectucea</i> , <i>Pseudomonas chicori</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vitians</i> , <i>Arabis mosaic virus</i> , <i>Lettuce mosaic virus</i> , <i>Lettuce yellow mosaic virus</i> , <i>Tomato spotted wilt virus</i> ” (종자에서 <i>Septoria lectucea</i> , <i>Pseudomonas chicori</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vitians</i> , <i>Arabis mosaic virus</i> , <i>Lettuce mosaic virus</i> , <i>Lettuce yellow mosaic virus</i> , <i>Tomato spotted wilt virus</i> 등이 전혀 검출되지 않았음) “The seed is free from <i>Trogoderma granarium</i> ” (<i>Trogoderma granarium</i> 이 검출되지 않았음)	

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고
	양배추 종자	<p>○ PC 부기사항</p> <p>“The seed has been inspected on growing season” “The seed is free from noxious weed” “The seed is believed not to be GMO” (종자는 생산지에서 재배지 검사를 했음) (작물에 해를 주는 잡초가 혼입되지 않았음) (수출종자는 유전자 변형된 것이 아닐 것)</p> <p>“The seed is free from <i>Phoma lingam</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Alternaria brassicicola</i>, <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i>” (종자에서 <i>Phoma lingam</i>, <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Alternaria brassicicola</i>, <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> 등이 전혀 검출되지 않았음)</p> <p>“The seed is free from noxious weeds. Especially free from <i>Cyperus</i>, <i>Cuscuta</i>, <i>Striga</i> and <i>Crobanche</i>” (종자에 영향을 미칠 수 있는 잡초가 없음. 특히 <i>Cyperus</i>, <i>Cuscuta</i>, <i>Striga</i> 및 <i>Crobanche</i> 속과 같은 잡초는 발견되지 않았음)</p>	
	당근 종자	<p>○ PC 부기사항</p> <p>“The seed has been inspected on growing season” “The seed is free from noxious weed” “The seed is believed not to be GMO” (종자는 생산지에서 재배지 검사를 했음) (작물에 해를 주는 잡초가 혼입되지 않았음) (수출종자는 유전자 변형된 것이 아닐 것)</p> <p>“The seed is free from <i>Stemphylium radicinum</i>, <i>Alternaria dauci</i>, <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>carotae</i>” (종자에서 <i>Stemphylium radicinum</i>, <i>Alternaria dauci</i>, <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>carotae</i> 등이 전혀 검출되지 않았음)</p>	

수출불가 품목

- 신선 농산물 중 수출이 가능한 품목은 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계자료도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함
- 현재 무균배양 인공씨감자는 수출허용을 요청하여 상대국이 PRA 절차를 진행 중임

30 페루

수출가능 품목

- 과실류 : 배·파프리카
 - ※ 재배 중 검사 및 수출식물검역증명서에 우려병해충 미감염 부기
- 식물체 : 선인장 (*Gymnocalycium mihanovichii* var. *hibotan*)
- 종자류 : 수출이 가능한 품목은 아래 종자류이며, 그 외 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

학명	한글명
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar <i>cymosa</i> (= <i>B. oleracea</i> var. <i>italica</i>)	브로콜리
<i>Lagenaria siceraria</i> (= <i>Cucurbita lagenaria</i>)	재래박
<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i> (= <i>B. pekinensis</i>)	양배추
<i>Cucumis melo</i>	멜론
<i>Cucumis sativus</i>	오이
<i>Capsicum annuum</i>	고추
<i>Raphanus sativus</i>	무
<i>Citrullus lanatus</i>	수박
<i>Lycopersicon esculentum</i>	토마토
<i>Cucurbita pepo</i> (= <i>Cucurbita mammeata</i>)	조롱박

조건부 수출품목 및 요건

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고
페루	배	<p>○ PC 부기사항</p> <p>"Container seal number" (컨테이너 봉인번호)</p> <p>"Fresh pears come from fields and packinghouses registered by QIA-Korea"</p> <p>(배 생과실은 한국 QIA에 등록된 재배지 및 선과장에서 생산되었음)</p> <p>"Product free from <i>Carposina sasakii</i>, <i>Conogethes punctiferalis</i>, <i>Grapholita moesta</i>, <i>Lopholeucaspis japonica</i>, <i>Pseudococcus comstocki</i>, <i>Botryosphaeria dothidea</i>, <i>Molinia fructigena</i> and <i>Nectria galligena</i>"</p> <p>(동 화물은 복숭아심식나방, 복숭아명나방, 복숭아순나방, 배나무흰각지벌레, 가루각지벌레, 겹무늬병, 잣빛무늬병 및 흑병에 감염되지 않았음)</p>	
	파프리카	<p>○ PC 부기사항</p> <p>"Container seal number" (컨테이너 봉인번호)</p> <p>"Fresh paprika come from green houses or fields and packinghouses registered by QIA-Korea"</p> <p>(파프리카 생과실은 한국 QIA에 등록된 재배지(온실 또는 포장) 및 선과장에서 생산되었음)</p> <p>"Product free <i>Frankliniella intonsa</i>, <i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Helicoverpa assulta</i> and <i>Thrips palmi</i>"</p> <p>(동 화물은 대만총채벌레, 왕담배나방, 담배나방 및 오이 총채벌레에 감염되지 않았음)</p>	

31 멕시코

수출가능 품목

○ 과실류 : 배

※ 재배 중 검사 및 수출식물검역증명서에 우려병해충 미감염 부기

○ 종자류 : 수출이 가능한 품목은 아래 종자류이며, 그 외 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

학명	한글명
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	브로콜리
<i>Allium cepa</i>	양파
<i>Capsicum annum</i>	고추
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>	양배추
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	꽃양배추
<i>Lactuca sativa</i>	상추
<i>Cucumis melo</i>	멜론
<i>Brassica rapa</i>	순무
<i>Brassica chinensis</i>	청경채
<i>Capsicum frutescens</i>	고추속의 일종
<i>Raphanus sativus</i>	무
<i>Citrullus lanatus</i>	수박
<i>Solanum melongena</i>	가지
<i>Cucurbita maxima</i>	서양호박
<i>Spinacea oleracea</i>	시금치
<i>Allium porrum</i>	유럽파

조건부 수출품목 및 요건

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고
멕시코	배	<p>○ PC 부기사항</p> <p>"Container number" (컨테이너 번호)</p> <p>* 필요한 경우 컨테이너 봉인번호(Container seal number)도 함께 부기 가능</p> <p>"This product meets the Work Plant agreed between SAGARPA and QIA, being free of quarantine pests alive."</p> <p>(동 화물은 SAGARPA와 QIA간에 합의한 워크플랜에 적합하고, 살아있는 검역병해충에 감염되지 않았음)</p>

4. 중동 국가

32 바레인

수출가능 품목

- 곡류 : 쌀, 콩
- 과실류 : 배, 사과, 단감, 대추, 잣, 감귤
- 채소류 : 무, 배추, 들깻잎, 콩나물, 참깨, 고추, 버섯 등
- ★ 수출식물검역증명서 첨부. 단, 휴대하는 곡류, 과실, 채소류는 수출식물검역증명서 필요 없음

33 사우디아라비아

수출가능 품목

- 곡 류 : 전체
- 과실류 : 전체(코코넛 과실은 수입금지)
- 채소류 : 전체
- 종자류 : 무
- 버섯류 : 전체
- 화훼류 기타 : 선인장묘
- ★ 수출식물검역증명서 첨부. 단, 휴대하는 곡류, 과실(코코넛 과실은 수입금지), 채소류는 수출식물검역증명서 필요 없으나 입국시 신고하고 검사를 받아야 함

34 아랍에미리트

수출가능 품목

- 곡 류 : 찹쌀, 현미, 보리, 수수, 조, 콩, 팥, 백미
- 과실류 : 배, 사과, 감귤, 단감, 포도, 밤, 매실, 자두, 멜론, 수박, 복숭아, 참외
- 채소류 : 당근, 양배추, 달래, 쑥, 양상추, 우엉, 시금치, 대파, 부추, 배추
- 종자류 : 무, 배추, 오이
- 버섯류 : 송이, 새송이, 양송이, 팽이, 표고
- 화훼류 기타 : 알로에묘, 팔레놉시스묘, 선인장묘
- 기타 : 건채소류, 배합사료

※ 상기 품목 외는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

35 아프가니스탄

수출가능 품목

- 곡 류 : 백미, 옥수수, 콩
- 채소류 : 감자, 고추, 들깻잎, 마늘쫑, 무, 배추, 생강, 오이, 완두, 우엉, 인삼, 참깨, 토마토
- 종자류 : 고추, 시금치, 토마토
- 버섯류 : 송이

※ 상기 품목 외는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

36 오 만

수출가능 품목

- 곡 류 : 전체
- 과실류 : 전체
- 채소류 : 전체
- 종자류 : 고추, 시금치, 토마토, 무
- 버섯류 : 식물검역증명서

※ 수출식물검역증명서 첨부, 휴대식물도 수출식물검역증명서 필요함

37 이 라 크

수출가능 품목

- 곡 류 : 찹쌀, 흑미, 녹두, 수수, 옥수수, 조, 콩, 팥
- 과실류 : 단감, 배, 사과
- 채소류 : 고추, 배추, 생강, 콩나물, 참깨
- 건채류 : 건고구마줄기, 건고사리, 건취나물, 무말랭이, 건토란대
- 종자류 : 고추, 시금치, 토마토
- 버섯류 : 양송이, 표고

※ 상기 품목 외는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

38 이 란

수출가능 품목

- 곡류(백미), 과실류(배), 기타(건채소류)
- 종자류(배추, 브로콜리, 오이, 양파, 양배추, 토마토)

※ 상기 품목 외는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

39 이스라엘

수출가능 품목

- 곡류 : 백미는 소비용에 한해 수출가능
- 배, 뿌리없는 접목선인장은 수출검역요건 이행 조건부로 수출가능

① 배 수출요건

- 1) 배는 과수원 및 선과장 등록, 봉지씌우기 재배, 재배지 예찰결과 보고 (복숭아심식나방, 복숭아순나방, 잣빛무늬병, 산호세각지벌레, 벗나무응애 등), 수출검사, 제반서류(수출식물검사합격증명서, 상대국 수입허가서) 등
- 2) 수출식물검역증명서에 “The consignment is in accord with the bilateral quarantine agreement on Korean pears from the Republic of Korea to Israel of 23 October 2001. The fruit originate from orchards south of the River Han and from orchards clear, with a radius of 200m of *Juniperusspp.* In addition the orchards were found to be: free from *Gymnosporangium spp.*, free from *Monilinia fucticola* for at least six weeks prior to picking of the fruit, free from *Quadraspidiotus perniciosus* during the last two growing seasons, free from the mites *Teranychus kanzawai*, *T. truncatus* and *T. viennensis* according to surveys and practically free from *Grapholita molesta* and *Carposina*

sasakii.” 와 화물 컨테이너 seal번호 부기

② 뿌리없는 접목선인장 수출조건

- 1) 뿌리 없는 접목선인장은 양묘장 등록(매년 2월 1일까지 등록), 재배지 검사, 재배지검사 기록부 기록, 소독처리, 수출검사 등
- 2) 수출식물검역증명서에 “The consignment is in accord with the Bilateral Quarantine Arrangement on unrooted grafted cacti from the Republic of Korea to Israel of June 5, 2008. The mother stock plants from which the unrooted grafted cacti originated were officially inspected during active growth, and found free from *Helminthosporium cactivorum*, *Diaspis boisduvalii*, *cactus X potexvirus* and *cactus mild mottle virus*. The grafted cacti were officially inspected prior to export and found free from *Brevipalpus russulus*, *Incilaria confusa* and all other quarantine pests.” 부기

○ 버섯은 일부 품목(*Agaricus* sp., *Lentinus* sp.)만 수출 가능

- 수출 전에 이스라엘 식물검역당국의 수입허가를 받아야 함

수출불가 품목

- 배, 뿌리없는 접목선인장, 버섯(일부) 이외 품목은 수출할 수 없음
- 사과는 수출허용을 요청하여 이스라엘이 PRA 절차를 진행 중임

솔 예 멘

수출가능 품목

- 종자류 : 후추, 들깨, 치커리 청경채, 가지, 조롱박, 브로콜리, 파프리카, 당근, 멜론, 호박, 무, 겨자, 수박, 배추, 양배추, 꽃양배추, 토마토, 피망, 양상추, 고추, 오이, 양파

※ 상기 품목 외는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

술 카타르

수출가능 품목

○ 곡 류, 과실류, 채소류, 버섯류 : 전체

※ 100kg 이하의 휴대하는 곡류, 과실, 채소류는 수출식물검역증명서 필요
없으나 입국시 신고하고 검사를 받아야 함

술 쿠웨이트

수출가능 품목

○ 곡류(콩), 과실류(배), 종자류(상추, 양배추), 버섯류(표고)

○ 채소류 : 미나리, 썩갓, 참나물, 깻잎

※ 상기 품목 외는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

5. 오세아니아·태평양

술 뉴질랜드

수출가능 품목

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미, 흑미), 찹쌀, 보리, 조, 밀, 옥수수, 콩, 수수
 - ※ 콩, 수수는 발아가 되지 않도록 불활 처리해야 수출가능
- 과실류 : 배(미국, 캐나다, 호주 배 수출단지에서 생산된 배 생과실), 포도(등록된 수출선과장에서 생산된 포도)
- 종자류 : 고추, 무, 배추, 상추, 수박, 시금치, 오이, 참외, 토마토, 파, 호박, 당근, 대파, 브로콜리
- 화훼류 기타 : 선인장묘

수출불가 품목

- 과실류 : 감귤, 포도, 사과, 단감, 밤, 복숭아, 참다래, 살구, 자두
- 채소류 : 파프리카, 메론(참외), 딸기, 인삼, 브로콜리, 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 피망, 오이, 호박, 수박, 토마토, 가지, 고구마, 감자
- 버섯류 : 팽이, 새송이, 느타리, 만가닥, 표고, 송이, 양송이, 영지
- 절화류 : 백합, 장미, 국화, 심비디움, 팔레놉시스, 카네이션, 난초, 튜립
- 화훼류 기타(재배매체 포함) : 철쭉속, 선인장(접목선인장), 장미, 카네이션, 심비디움, 난초, 국화, 튜립, 글라디올러스, 백합
 - ※ 상기 품목 중 진하게 표시된 품목은 뉴질랜드측에 수출허용을 요청하여 상대국이 PRA를 진행 중임

□ 수출검역조건 및 부기사항

- 배는 미국·캐나다·호주 수출단지에서 생산된 것만 수출 가능하며, 다음사항을 수출식물검역증명서에 부기
 - “The Korean pear in this consignment has been inspected in accordance with appropriate official procedures and found to be free of any visually detectable quarantine pests specified by the New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry, and been treated in accordance with Appendix 1 of the Arrangement between the New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry and the Republic of Korea national plant protection organisation concerning the access of host material of fruit fly species of economic significance into New Zealand from the Republic of Korea, and undergone appropriate pest control activities that are effective against *Carposina sasakii*, *Monilinia fructigena* (anamorph *Monilia fructigena*), *Tetranychus kanzawai*.”
- 선인장묘는 다음사항을 수출식물검역증명서에 부기
 - [I] This Botanical Material is the Ornamental Bare-Root Nursery Stock of SPECIMENS ARTIFICIALLY PROPAGATED AS DEFINED BY CITES, INCLUDED IN APPENDIX II - FLORA (PLANTS)- CACTACEAE (Cacti) spp. 7 Product(s).
 - [II] This nursery stock has been sourced from a Pest free place of production which is free from *Helicobasidium mompa*.
 - [III] It was grown from cuttings in a soil-less growing medium in the containers maintained out of contact with the soil.
 - [IV] It has received the following 3 Chemical Dips Treatment within 7 days of export:
 - a) Abamectin @ 0.09gm per liter for a duration of 3-min.
 - b) Chloropiriphos @2.4gm per liter for a duration of 3-min.
 - c) Carbaryl @ 1.5gm per liter for a duration of 3-min.
 - [V] It has received the following 3 Chemical Sprays Treatment within 7 days of export:
 - a) 10mg per liter of Bromo-chloro-dimethylhydantoin for 5 min, and
 - b) 1g per liter of Benzimidole Carbendazim for 20min, and then,
 - c) 2g per liter of Dicarboximide Iprodione for 30min.

○ 포도는 뉴질랜드 수출 선과장에서 생산된 것만 수출 가능하며, 다음 사항을 수출식물검역증명서에 부기

[I] 과수원 등록번호

[II] 선과장 등록번호

[III] 컨테이너 봉인번호

[IV] 부기사항

i) “The table grapes in this consignment have undergone pest control activities that are effective against *Adoxophyes orana*, *Chrysomohalus dictyospermi*, *Conogethes punctiferalis*, *Drosophila suzuki*, *Monilinia fructigena*, *Stathmopoda auriferella*, *Tetranychus kanzawai* and *Thrips palmi* in accordance with the Official Assurance Programme.”(본 포도 화물은 공식 확인 절차에 따라 뉴질랜드 측 우려병해충에 대한 효과적인 방제활동을 수행하였음)

ii) “The Republic of Korea is free of fruit fly species of economic significance associated with fresh table grapes verified in accordance with the Official Assurance Programme.”(대한민국은 공식 절차에 따라 포도와 관련된 경제적으로 중요한 과실파리가 없음이 증명되었음)

[V] 소독처리 세부사항(소독처리 한 경우에 한함)

솔 호 주

수출가능 품목

○ 곡 류 : 백미, 보리, 밀, 수수, 콩, 강낭콩, 팥, 녹두

※ 흙, 잡초, 벌씨 등이 없어야 하고, 깨끗하게 도정되어야 함

○ 과실류 : 배(성환, 하동), 단감, 가공 밤, 파프리카(김제, 도곡), 포도

※ 수출검역요건(식검고시)을 준수해야 함

○ 채소류 : 양파, 파프리카 (수출검역요건 준수)

○ 종자류 : 고추, 무, 배추, 상추, 수박, 시금치, 양배추, 오이, 참외, 파, 호박

- 버섯류 : 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이
 - ※ 팽이, 영지, 새송이는 배지에 동물 및 동물성 부산물이 없어야 하고, 121℃에서 30분간 소독 처리해야 함(PC에 부기)
- 절화류 : 장미, 심비디움, 팔레놉시스
 - ※ 장미 등 증식 가능한 것은 활력제거 처리 및 부기, MB 의무훈증
- 화훼류 기타 : 선인장(점목선인장), 심비디움, 포인세티아, 시클라멘, 아이비

수출불가 품목

- 곡 류 : 옥수수
- 과실류 : 사과, 감귤, 포도, 밤, 복숭아, 자두, 살구, 참다래
- 채소류 : 파프리카, 토마토, 메론(참외), 딸기, 브로콜리, 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 피망, 오이, 호박, 수박, 가지, 고구마, 감자, 수삼
- 절화류 : 백합, 국화, 카네이션, 난초, 튜립, 글라디올러스
- 화훼류 기타(재배매체 포함) : 철쭉속, 장미, 카네이션, 난초, 국화, 튜립, 글라디올러스, 백합

조건부 수출품목 및 요건

국가	품목	요구사항 및 PC부기사항	비고
호주	양파 (가공용)	<p>○ PC 부기사항</p> <p>“A representative sample of 600 onions was inspected and found free from symptoms of onion smut (<i>Urocystis cepulae</i> Frost) and the consignment is practically free from soil”</p> <p>(600개의 대표샘플을 검사한 결과, 감부기병(onion smut : <i>Urocystis cepulae</i> Frost)의 병징이 없으며 실질적으로 흙이 부착되지 않았음)</p> <p>※ 완전히 봉인된 드라이박스(dry box) 또는 냉동선박 컨테이너(reefer shipping containers)로 수입되어야 함.</p>	
	배	<p>○ 모든 박스에 “For Australia” 를 표시하고 과수원 등록번호, 선과장 번호, 검사일자가 표시된 라벨 부착</p> <p>○ PC 부기사항</p> <p>“Produced and inspected under the Korean pear arrangement between NPQS and AQIS”</p> <p>(농림축산검역본부와 호주검역소간의 한국산 배 협정에 따라 생산 및 검사되었음)</p>	
	포도	<p>○ PC 부기사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 선과장 등록번호(또는 선과장명) 2. 부기사항 : “이 화물은 호주의 한국산 포도 수입요건에 따라 한국에서 생산되었으며 검역결과 검역병해충 및 규제물질에 감염되지 않았음” 3. 컨테이너 번호 및 봉인번호(선박화물에 한함) 4. 소독처리 세부사항(소독처리 한 경우에 한함) 	

술 마이크로네시아

- 사과, 배, 감귤, 복숭아, 감(단감), 딸기, 포도, 파프리카, 참외(멜론), 토마토에 대해 수출허용을 요청하여 상대국이 PRA 절차를 진행 중임

※ 신선농산물에 대한 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

술 팔라우

수출가능 품목

- 과실류 : 사과, 배, 감귤, 포도, 단감, 자두, 복숭아, 양벚, 넥타린
- 채소류 : 수삼, 양배추, 마늘쫑, 무, 수박, 당근, 상추, 근대, 깎마늘, 들깻잎, 쪽갓, 감자, 알로에, 꽃양배추, 브로콜리, 미나리, 토마토, 피망, 파프리카, 참외, 배추, 고구마, 마늘, 샐러리, 파슬리, 양파, 생강, 부추, 딸기, 콜리플라워, 멜론, 버섯, 순무

수출불가 품목

- 복숭아, 감(단감), 딸기, 멜론은 수출허용을 요청하여 상대국이 PRA 절차를 진행 중임

※ 상기 품목 외는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

6. EU·러시아

수출 EU

수출가능 품목

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미), 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 옥수수
- 과실류 : 사과, 배, 감, 단감, 포도, 참다래, 밤, 감귤, 복숭아, 자두, 살구
- 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지, 고구마
- 종자류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 가지, 파, 양파, 상추, 토마토
- 버섯류 : 송이, 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이, 양송이, 만가닥
- 절화류 : 튤립, 글라디올러스, 백합, 장미, 카네이션, 난초, 국화
- 화훼류 기타 : 선인장(접목선인장), 심비디움, 난초, 백합, 글라디올러스, 철쭉속, 장미, 카네이션, 국화, 튤립

수출불가 품목

- 감자

※ 상기 품목 외는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

조건부 수출품목 및 요건

○ 재배매체는 식물의 생명력유지를 위해 식물에 부착된 재배매체는 다음사항을 공식 증명하는 조건으로 허용

- 1) 재식시점 : 흙 또는 유기물이 없거나, 적절한 시험 또는 열처리, 훈증 등을 통해 유해해충 및 선충에 감염되지 않음, 유해병해충에 감염되지 않았음을 보증하기 위해 적절한 열처리나 훈증을 하였음.
- 2) 재식이후 : 재배매체는 유해병해충에 감염되지 않도록 적절한 조치를 했음을 보증하거나, 출발에 앞서 2주일 내에 수송 중 생명을 유지 하는데 필요한 최소량을 제외한 나머지 매체를 제거하였으며, 사용된 재배매체는 1)의 요건에 부합되게 사용하였다는 증명

○ 감귤 : 다음사항을 수출식물검역증명서에 부기해야함.

〈부록IVA I, 16.2. : 감귤궤양병 관련〉

- (a) 과실이 감귤궤양병(감귤에 병원성 있는 모든 계통) 무발생으로 인정된 국가에서 생산되었거나,
- (b) 과실이 감귤궤양병(감귤에 병원성 있는 모든 계통) 무발생으로 인정된 지역에서 생산되었거나,
- (c) 감귤궤양병 병징이 최근 생육기간동안 생산포장이나 이웃포장에서 관찰되지 않았고, 생산포장에서 수확된 모든 과실은 감귤궤양병의 병징이 보이지 않으며, 과실은 Sodium Orthophenylphenate와 같은 것으로 처리하였으며, 과실은 등록된 선과장에서 포장되었음.

〈부록IVA I, 16.3. : *Cercospora angolensis* 관련〉

- (a) 과실이 *Cercospora angolensis* 무발생으로 인정된 국가에서 생산되었거나,
- (b) 과실이 *Cercospora angolensis* 무발생으로 인정된 지역에서 생산되었거나,
- (c) *Cercospora angolensis* 병징이 최근 생육기간동안 생산포장이나 이웃포장에서 관찰되지 않았고, 생산포장에서 수확된 모든 과실에서 *Cercospora angolensis* 병징이 보이지 않았음.

〈부록ⅣA I, 16.4. : *Guignardia citricarpa* 관련〉

- (a) 과실이 *Guignardia citricarpa*(감귤에 병원성 있는 모든 계통) 무발생으로 인정된 국가에서 생산되었거나,
- (b) 과실이 *Guignardia citricarpa*(감귤에 병원성 있는 모든 계통) 무발생으로 인정된 지역에서 생산되었거나,
- (c) *Guignardia citricarpa* 병징이 최근 생육기간동안 생산포장이나 이웃포장에서 관찰되지 않았고, 생산포장에서 수확된 모든 과실은 *Guignardia citricarpa*(감귤에 병원성 있는 모든 계통)의 병징이 보이지 않았음.
- (d) 과실은 *Guignardia citricarpa*(감귤에 병원성 있는 모든 계통)에 대해 적절한 방제조치를 하는 생산포장에서 생산되었고, 생산포장에서 수확된 모든 과실에서 *Guignardia citricarpa*(감귤에 병원성 있는 모든 계통)의 병징을 볼 수 없었음.

〈부록ⅣA I, 16.5. : 과실파리 관련〉

- (a) 과실이 Tephritidae(과실파리과) 무 발생되는 것으로 알려진 지역에서 생산되었거나,
- (b) Tephritidae의 증상이 최근 생육이 시작된 이후 생산포장이나 이웃포장에서 관찰되지 않았고, 최소한 공식적인 검사가 수확되기 3개월 전부터 매달 수행되었고, 생산 장소에서 수확한 모든 과실에서 Tephritidae의 증상이 관찰되지 않았거나,
- (c) 과실은 대표표본에 대한 적절한 공식적인 조사에서 모든 발육단계에서 Tephritidae가 발생되지 않고 있음을 보여주었거나,
- (d) 과실은 적절한 소독처리를 받았음.

○ 복숭아·자두·살구 : 다음사항을 수출식물검역증명서에 부기해야함.

- (a) 과일은 *Monilinia fructicola*가 무 발생되는 것으로 알려진 국가에서 생산되었거나
- (b) 과실이 *Monilinia fructicola*가 무 발생되는 것으로 인정하는 지역에서 생산되었거나

- (c) 과실이 *Monilinia fructicola*가 없다는 것을 확인하기 위해 수확 전 또는 수출검사 전에 적절한 검사와 소독처리를 하였음.

○ 토마토종자 : 다음사항을 수출식물검역증명서에 부기해야함.

〈부록 IVA I,48. : *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis*, *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria*와 Potato spindle tuber viroid 관련〉

- (a) 종자는 *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis*, *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria*와 Potato spindle tuber viroid가 발생되지 않은 지역에서 생산되었거나
- (b) *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis*, *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria*와 Potato spindle tuber viroid에 의한 병징이 생육을 완성하는 동안 생산지역의 식물에서 관찰되지 않았거나
- (c) 종자는 최소한 *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis*, *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria*와 Potato spindle tuber viroid에 대해 대표 표본을 이용 적절한 방법으로 공식적인 검사를 받아야 하며 이 검사에서 유해병원체에 감염되지 않았음을 확인하였음.

〈EU-Decision 2004/200 /EG, 부록 : Pepino mosaic virus 관련〉

- 1a) 종자는 Pepino mosaic virus가 발생되지 않은 지역에서 생산되었거나
- 1b) Pepino mosaic virus의 병징이 최종생육 한 세대 동안 생산지역의 식물에서 관찰되지 않았거나
- 1c) 종자는 Pepino mosaic virus에 대한 대표표본을 이용 적절한 방법으로 공식적인 시험을 받아야 하며 이 시험에서 Pepino mosaic virus에 감염되지 않았음이 확인되었음.

○ 장미절화 : 다음사항을 수출식물검역증명서에 부기해야함.

〈부록IVA I, 45.2. : 담배가루이 관련〉

- (a) 절화는 담배가루이(비유럽개체군)가 발생되지 않은 국가에서 생산되었거나
- (b) 수출 직전에 공식적으로 검사하여 담배가루이(비유럽개체군)가 발생되지 않았음을 확인함.

○ 카네이션절화 : 다음사항을 수출식물검역증명서에 부기해야함.

〈부록IVA I,32.2. : 채소잎굴파리(*Liriomyza sativae*)와 *Amauromyza maculosa* 관련〉

- (a) 절화는 채소잎굴파리(*Liriomyza sativae*)와 *Amauromyza maculosa*가 발생되지 않은 국가에서 생산되었거나
- (b) 절화 수출 직전에 공식적 검사하여 채소잎굴파리(*Liriomyza sativae*)와 *Amauromyza maculosa*가 발생되지 않음을 확인함.

〈부록IVA I,27.2. : *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, 또는 *Spodoptera litura*관련〉

- (a) *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, 또는 *Spodoptera litura* (담배거세미나방)의 증상이 최근 생육기간동안 생산지역에서 관찰할 수 없었거나,
- (b) 식물은 *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, 또는 *Spodoptera litura*(담배거세미나방)으로부터 식물을 보호하기 위해 적절한 소독처리가 되었음.

○ 난초절화 : 다음사항을 수출식물검역증명서에 부기해야함.

〈부록IVA I,36.2. : 오이총채벌레(*Thrips palmi*) 관련〉

- (a) 절화는 오이총채벌레(*Thrips palmi*)가 발생되지 않은 국가에서 생산되었거나
- (b) 수출 바로 전에 공식적으로 검사하였고 오이총채벌레가 발생되지 않음을 확인함.

○ 국화절화 : 다음사항을 수출식물검역증명서에 부기해야함.

〈부록IVA I,32.2. : 채소잎굴파리(*Liriomyza sativae*)와 *Amauromyza maculosa* 관련〉

- (a) 절화는 채소잎굴파리(*Liriomyza sativae*)와 *Amauromyza maculosa*가 발생되지 않은 국가에서 생산되었거나
- (b) 절화 수출 직전에 공식적 검사하여 채소잎굴파리(*Liriomyza sativae*)와 *Amauromyza maculosa*가 발생되지 않음을 확인함.

〈부록IVA I ,27.2. : *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, 또는 *Spodoptera litura*관련〉

- (a) *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, 또는 *Spodoptera litura* (담배거세미나방)의 증상이 최근 생육기간동안 생산지역에서 관찰할 수 없었거나,
- (b) 식물은 *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, 또는 *Spodoptera litura*(담배거세미나방)으로부터 식물을 보호하기 위해 적절한 소독처리가 되었음.

○ 분재류 : 한국산 분재 대 EU 수출 검역요령(농림축산검역본부고시)에 따라 관리 후 수출

(a) PC 부기사항

- 해당화물의 컨테이너 번호 및 봉인번호
- 양묘장 명 및 등록번호
- 선적 2주전에 처리한 약제명
- “This consignment meets the conditions laid down in Decision 2002/499/EC”

※ 분재의 종류, 수량, 표찰번호 등을 수출검사 신청자에게 교부

○ 침엽수 목재류(목재포장재 포함)

(a) 수피가 제거되어야 함.

(b) *Monochamus* spp.에 의하여 야기되는 grub holes가 없을 것(동 목적을 위하여 구멍의 직경이 3mm이상인 것으로 한정함.)

(c) 제조시점에 수분함량이 20%이하이어야 함.

○ 장미묘목 : 잎, 꽃, 과실이 없는 휴면식물로 다음사항을 수출식물검역 증명서에 부기해야 함.

※ 잎, 꽃, 과실이 있는 재식용 식물은 수입금지식물에 해당됨

〈부록IVA I ,33. : 재식되었거나 재식하려는 식물로 노지에 자란 뿌리가 있는 경우〉

(a) *Clavibacter michiganensis* ssp. *sependoniscus* (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., *Globodera pallida* (Stone) Behrens, *Globodera rostochiensis*

(Wollenweber) Behrens, *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) percival이 발생되지 않은 장소에서 생산되었음.

○ 카네이션묘 : 다음사항을 수출식물검역증명서에 부기하여야 함.

〈부록IVA I,27.1. : *Heliiothis armigera*, *Spodoptera littoralis* 관련〉

- (a) 최근 생육기간동안 생산지에서 *Heliiothis armigera* Hubner이나 *Spodoptera littoralis* (Boisd.)의 증상을 관찰할 수 없었거나,
- (b) 식물이 *Heliiothis armigera* Hubner이나 *Spodoptera littoralis* (Boisd.)로부터 보호하기 위한 적절한 처리를 하였음.

〈부록IVA I,27.2. : *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, 또는 *Spodoptera litura* 관련〉

- (a) *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, 또는 *Spodoptera litura* (담배거세미나방)의 증상이 최근 생육기간동안 생산지역에서 관찰할 수 없었거나,
- (b) 식물은 *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, 또는 *Spodoptera litura*(담배거세미나방)으로부터 식물을 보호하기 위해 적절한 소독 처리가 되었음.

〈부록IVA I,29. : *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola*, *Pseudomonas caryophylli*, *Phialophora cinerescens* 관련〉

- (a) 식물은 2년 내에 1회 이상의 공식검사에서 *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr and Burkholder, *Phialophora cinerescens* (Wollenw.) Van Beyma가 발견되지 않은 모 식물로부터 채취하였음.
- (b) 앞에 열거한 유해병원체의 증상이 식물에서 발견되지 않았음.

○ 국화묘 : 다음사항을 수출식물검역증명서에 부기하여야 함.

〈부록IVA I,27.1. : *Heliiothis armigera*, *Spodoptera littoralis* 관련〉

- (a) 최근 생육기간동안 생산지에서 *Heliiothis armigera* Hubner이나 *Spodoptera littoralis* (Boisd.)의 증상을 관찰할 수 없었거나,
- (b) 식물이 *Heliiothis armigera* Hubner이나 *Spodoptera littoralis* (Boisd.)로부터 보호하기 위한 적절한 처리를 하였음.

〈부록ⅣA I,27.2. : *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, 또는 *Spodoptera litura*관련〉

- (a) *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, 또는 *Spodoptera litura* (담배거세미나방)의 증상이 최근 생육기간동안 생산지역에서 관찰할 수 없었거나,
- (b) 식물은 *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, 또는 *Spodoptera litura*(담배거세미나방)으로부터 식물을 보호하기 위해 적절한 소독처리가 되었음.

〈부록ⅣA I,28. : *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, 또는 *Spodoptera litura*관련〉

- (a) 바이러스테스트에서 *Chrysanthemum stunt viroid*가 없는 식물에서 채취한 3세대이내의 묘이거나 개화시점에 10%의 샘플검사에서 *Chrysanthemum stunt viroid*가 발견되지 않은 식물에서 직접 채취한 묘임.
- (b) 선적하기 3개월 전부터 매달 1회 이상의 검사에서 *Puccinia horiana* Hennings의 병징이 관찰되지 않았으며, 수출전 3개월동안 인접지역에서 *Puccinia horiana* Hennings의 병징이 관찰되지 않은 곳에서 생산되었거나,
 - *Puccinia horiana* Hennings에 대한 적절한 소독처리를 하였음.
- (c) 뿌리가 없는 삽수는 삽수와 삽수를 채취한 식물에서 *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock and Davis) v. Arx 증상이 관찰되지 않았으며, 뿌리가 있는 삽수는 삽수와 양묘장에서 *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock and Davis) v. Arx 증상이 관찰되지 않았음.

○ 튜립묘 : 다음사항을 수출식물검역증명서에 부기하여야 함.

〈부록ⅣA I,30. : *Ditylenchus dipsaci* 관련〉

- (a) 최근의 1세대 동안 *Ditylenchus dipsaci* (Kuhn) Filipjev의 증상이 관찰되지 않았음.

출 러시아

수출가능 품목

- 곡 류 : 쌀(백미, 현미), 보리, 밀, 수수, 옥수수
- 과실류 : 감, 단감, 포도, 감귤, 참다래, 밤, 사과, 배, 복숭아, 자두, 살구
- 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지, 감자, 고구마
- 종자류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 토마토, 가지, 파, 양파, 상추
- 버섯류 : 송이, 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이, 양송이, 만가닥
- 절화류 : 장미, 카네이션, 심비디움, 팔레놉시스(호접란), 난초, 국화, 튜립, 글라디올러스, 백합
- 화훼류 기타 : 튜립, 글라디올러스, 백합

※ 버섯 및 화훼류 기타품목은 재배매체에 심겨진 상태로는 수출불가

수출불가 품목

- 곡 류 : 콩, 팥, 녹두
- 화훼류 기타 : 철쭉속, 선인장(접목선인장 포함), 장미, 난초, 카네이션, 심비디움, 국화

※ 상기 품목 외는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

□ 과실류 수입요건

① 사과

- 복숭아순나방이 발생하는 지역산 과실이 남쪽 항구로 4월1일부터 9월30일 사이에 수입될 경우 : 입항지 또는 도착지에서 훈증소독
- 복숭아심식나방이 발생하는 지역산 과실이 남쪽 항구로 4월1일부터 9월30일 사이에 수입될 경우 : 입항지 또는 도착지에서 훈증소독
- 사과 과실판리가 발생하는 지역산 과실이 남쪽 항구로 4월1일부터 9월30일 사이에 수입될 경우 : 입항지 또는 도착지에서 훈증소독

② 배

- 복숭아순나방이 발생하는 지역산 과실이 남쪽 항구로 4월1일부터 9월30일 사이에 수입될 경우 : 입항지 또는 도착지에서 훈증소독
- 복숭아심식나방이 발생하는 지역산 과실이 남쪽 항구로 4월1일부터 9월30일 사이에 수입될 경우 : 입항지 또는 도착지에서 훈증소독
- *Numonia pyrivorella*이 발생하는 지역산 과실이 남쪽 항구로 4월1일부터 9월30일 사이에 수입될 경우 : 입항지 또는 도착지에서 훈증소독

③ 복숭아, 자두, 살구

- 복숭아순나방이 발생하는 지역산 과실이 남쪽 항구로 4월1일부터 9월30일 사이에 수입될 경우 : 입항지 또는 도착지에서 훈증소독
- 복숭아심식나방이 발생하는 지역산 과실이 남쪽 항구로 4월1일부터 9월30일 사이에 수입될 경우 : 입항지 또는 도착지에서 훈증소독

솔 터 키

수출가능 품목

- 곡 류 : 벼를 제외한 모든 품목
- 과실류 : Prunus 속, 감귤류를 제외한 모든 품목
- 채소류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 파프리카, 피망, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 딸기, 토마토, 가지, 고구마
- 종자류 : 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호박, 수박, 참외, 멜론, 토마토, 가지, 과, 양과, 상추
- 버섯류 : 송이, 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이, 양송이, 만가닥
- 절화류 : 장미, 카네이션, 심비디움, 팔레놉시스(호접란), 난초, 국화, 튜립, 글라디올러스, 백합
- 화훼류 기타 : 튜립, 글라디올러스, 백합

수출불가 품목

- 과실류 : 핵과류(*Prunus spp.*), 감귤류
- 벼, 감자피경, *Allium* 속 식물
- 화훼류 기타 : 철쭉속, 선인장(접목선인장 포함), 장미, 난초, 카네이션, 심비디움, 국화

※ 버섯 및 화훼류 기타품목은 재배매체에 심겨진 상태로는 수출불가

- 휴대식물 (곡류, 과일(신선, 건조), 채소 등)은 다음 조건일 경우를 제외하고는 수출식물 검역증명서를 첨부하여야 함 (Regulation of Agricultural Quarantine of Turkey Article 12(a), (b), (c), (d), (e), Annex 4, 식물류 수입특별요건 item 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 40, 64)
 - 여행 중 소비하기 위하여 3kg 이하의 신선 또는 건조 과일, 채소를 휴대하는 경우
 - 외국에 토지를 소유한 사람이 특별허가증을 가지고 식물류를 반입하는 경우
 - 재식용 식물 1kg 이하를 세관 또는 우체국을 통하여 반입하는 경우
 - 외국에서 터키로 들어오는 승객과 승무원 식용으로 식물을 반입하는 경우
 - 망명객, 이민자가 가지고 들어오는 식물류
 - 외국인 등에 의해 터키 정부, 자선 기관에 기증품으로 허락된 경우

7. 아프리카

50 남아프리카공화국

수출가능 품목

○ 과실류 : 사과, 배

※ 재배지검사와 수출검사를 받은 후 수출식물검역증명서에 부기사항 기록

○ 종자류 : 고추, 당근, 대파, 무, 부추, 브로콜리, 상추, 양배추, 양파, 시금치, 치커리, 토마토, 피망, 호박

※ 상기 품목 외는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

51 이집트

수출가능 품목

○ 과실류 : 단감, 배, 사과

○ 버섯류 : 새송이, 팽이

○ 절화류 : 심비디움, 온시디움, 팔레놉시스

○ 종자류 : 고추, 당근, 오이, 토마토

※ 상기 품목 외는 수출가능 여부가 공식 확인되지 않고 있으며, 수출실적 통계가 있는 품목도 없어 수출가능 여부는 품목별로 확인이 필요함

II

참고 자료

1. 대만의 신선농산물 수입요건

- 대만은 식물보호 및 검역법에 따라 금지병해충(57종)을 지정, 이들 병해충의 기주식물 전체를 수입금지하고 있음
 - 금지병해충 57종 : 병 31종, 해충 21종, 선충 3종, 파이토플라즈마 2종
- 대만측이 수입허용하는 식물의 경우에도 수출국이 품목별로 병해충(35종) 무감염을 증명하여야 함
 - 수출식물검역증명서에 해당 병해충 무감염 사실 부기
 - 한국에서 수출하는 신선 농산물의 경우에도 품목에 따라, 9종의 병해충(*Phthorimaea operculella*, *Frankliniella occidentalis* 등) 무감염 증명(수출검역증명서에 무감염 부기)해야 함
- 대만 도착지검사서에서 대만측 검역대상 병해충 검출 시에는 소독 처리 등 검역처분되거나 적용가능한 방법이 없을 경우 폐기 또는 반송 처분됨
 - 대만측이 규제하는 검역병해충은 총 1,425종임
 - 해충 309, 응애 32, 병(세균·진균·바이러스) 602, 파이토플라즈마 93, 선충54, 잡초 265, 기생식물 13, 연체동물12, 기타 45
- 신선식물 및 식물성 산물, 피트모스(peat moss) 및 피트(peat)는 수출식물검역증명서를 제출하여야 함
 - 수출검역증명서 미첨부시 폐기 또는 반송 처분됨
- 백합, 글라디올러스 및 다알리아 구근의 수입은 “백합, 글라디올러스 및 다알리아의 수입검역요건”을 따름
- 다음의 증식용 식물은 대만 식물검역기관이 지정한 장소에서 격리재배를 실시함(종자 및 과실 제외)

구 분	대상 식물
최소 2년간 격리재배	<i>Saccharum sinense</i> , <i>Saccharum officinarum</i> (사탕수수속)
	<i>Camellia sinensis</i> (동백나무)
	<i>Ananas</i> spp. (파인애플 등의 아나나스속)
	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp.(금귤), and <i>Poncirus</i> spp.(탱자)
	<i>Musa</i> spp. (바나나 등 파초속 식물)
최소 1년간 격리재배	<i>Carica</i> spp. (파파야)
	<i>Euphoria longana</i> (용안)
	<i>Fragaria</i> spp. (딸기)
	<i>Litchi chinensis</i> (여지)
	<i>Malus</i> spp. (사과)
	<i>Magnifera indica</i> (망고)
	<i>Morus</i> spp. (뽕나무류)
	<i>Passiflora</i> spp. (패션프룻)
	<i>Prunus</i> spp. (살구, 자두, 매실, 복숭아 등)
	<i>Psidium guajava</i> (구아바)
	<i>Pyrus</i> spp.(배, 접수는 “배접수 수입검역절차”에 따름)
	<i>Rosa</i> spp.(장미, 절화 제외)
	<i>Vitis</i> spp. (포도)

조직배양 식물은 “조직배양식물의 수입검역요건을 따름”

수입화물의 목재포장재는 “대만으로 수입되는 목재포장재의 수입검역요건을 따름”

2. 대만의 수입금지식물에 대한 병해충위험분석 절차

- 대만측이 수입금지하는 식물의 대만수출을 위해서는 수출허용요청 및 병해충위험분석(PRA) 자료를 제공하여야 함
 - 병해충 조사자료 및 예찰기록(조사기간은 ‘병해충무발생지역 인정 절차’에 따라야 함)
 - 생산관리 정보(생산지역, 수확량, 수확시기, 수확 후 관리 등)
 - 병해충목록, 병해충방제방법, 사용농약 목록 등
 - 수출검역 절차 및 수출식물검역증명서 발급 절차

- 대만측은 수출국이 제시한 자료에 대한 병해충위험평가를 실시하고 수출국 현지조사를 실시함
 - 현지조사 비용은 수출국이 전액 부담

- 대만측 현지조사 결과 병해충무발생지역이 인정되면 양국간에 합의한 검역요건에 따라 대만수출이 허가됨
 - 사과·배·복숭아 생과실의 경우 한·대만 양국이 검역요건에 합의하여 대만수출이 가능해짐('06. 2월)

- 수입금지식물의 수입허용외에도 다음의 경우 PRA 실시
 - 국가별로 대만에 처음으로 수입되는 신선 식물
 - 수입식물에서 대만의 농업생산안전 및 환경에 위해가 될 수 있는 병해충이 검출되는 경우
 - 식물위생에 위협을 줄 수 있는 병해충의 새로운 전달경로가 발견된 경우
 - 최근 5년 동안 수입되지 않은 식물류 등

3. 한국산 신선농산물의 대만 수출검역요건

- 국내산 신선농산물 대부분은 대만수출이 가능하나, 대만측 금지병해충의 기주식물은 수출이 불가능하거나 조건부로 수출이 가능함
 - 복숭아심식나방의 기주식물 중 사과·배·복숭아 생과실은 양국간 약정에 따라 조건부 수출이 가능함(농림축산검역본부 고시 “한국산 사과·배·복숭아 생과실 수출검역요건” 참고)
 - 단, 매실·자두·살구·대추 생과실 등은 수출 불가능
 - 유리알락하늘소의 기주식물인 단풍나무 등은 꽃·과실·종자, 직경 3cm 이하의 새싹·어린가지 및 가장 큰 줄기의 직경이 3cm 이하인 묘목의 경우에만 수출 가능함
- 대만수출이 가능한 식물의 경우에도 대만측이 우려하는 병해충에 감염되지 않았음을 증명하여야 함
 - 국내에 분포하는 다음의 병해충은 수출식물검역증명서에 “수출검사 결과 해당 병해충에 감염되지 않았음”을 부기하여야 함
 - 감자뽕나방, 화살깍지벌레, 꽃노랑총채벌레, 마늘줄기선충, 감자썩이선충, 감자역병, 뿌리응애, 가지검은마름병 등 8종
 - ※ 수출품목에 따라 1종 이상의 대만측 검역병해충이 없음을 부기하여야 하므로 품목별 부기사항을 반드시 확인하여야 함
 - 대만 도착지검사 결과 대만측 검역병해충 검출 시 또는 수출식물 검역증명서에 해당 식물에 따라 다음의 부기사항 등이 기재되어 있지 않은 경우 해당화물은 소독, 폐기 또는 반송 조치됨
 - The plants or plant parts have been thoroughly inspected and found free from OOO(해당 병해충의 학명).
 - The plants or plant parts have undergone an appropriate quarantine treatment prior to shipment.

붙임1 | 한국산 농산물 관련 대만의 금지병해충 및 금지식물

No.	금지병해충	대 상 식 물	비 고
1	○Rice hoja blanca tenuivirus [Rice hoja Blanca virus (tenuivirus)] ○Rice dwarf phytoreovirus [Rice dwarf virus (phytoreovirus)] ○Rice stem nematode (<i>Ditylenchus angustus</i> Butler)	<i>Brachiaria</i> spp. <i>Echinochloa</i> spp.(돌피속) <i>Panicum</i> spp.(기장속) <i>Paspalum</i> spp.(참피속) <i>Oryza</i> spp.(벼속) <i>Leersia hexandra</i> <i>Sacciolepis interrupta</i> <i>Rottboellia</i> spp. <i>Tricum aestivum</i> (밀)	대상식물의 전체 또는 일부분 (종자제외)
2	○Satsuma dwarf virus (Sadwavirus)	<i>Citrus</i> spp.(귤속) <i>Fortunella</i> spp.(금귤속) <i>Poncirus</i> spp.(탱자나무속)	꽃, 과일, 종자를 제외한 신선식물 전체
3	○유리알락하늘소 (<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky); Asian longhorned beetle)	<i>Acer</i> spp.(단풍나무속) <i>Aesculus</i> spp.(칠엽수속) <i>Alnus</i> spp.(오리나무속) <i>Betula</i> spp.(자작나무속) <i>Citrus</i> spp.(감귤속) <i>Elaeagnus angustifolia</i> <i>Fraxinus</i> spp.(물푸레나무속) <i>Hibiscus</i> spp.(무궁화속) <i>Liriodendron tulipifera</i> (튜올립) <i>Malus</i> spp.(사과나무속) <i>Melia</i> spp.(멸구슬나무속) <i>Morus</i> spp.(뽕나무속) <i>Paulownia fortunei</i> <i>Platanus</i> spp.(플라타누스속) <i>Populus</i> spp.(사시나무속) <i>Prunus</i> spp.(벚나무속) <i>Pyrus</i> spp.(배나무속) <i>Robinia</i> spp.(아까시나무속) <i>Rosa</i> spp.(장미속) <i>Salix</i> spp.(버드나무속) <i>Sophora</i> spp.(고삼속) <i>Ulmus</i> spp.(느릅나무속)	대상식물의 꽃, 과일, 종자, 직경 3cm 이하의 새싹·어린가지 및 가장 큰 줄기의 직경이 3cm 이하의 묘목을 제외한 전체

No.	금지병해충	대 상 식 물	비 고
4	복숭아심식나방(<i>Carposina sasakii</i> Matsumura = <i>C. niponensis</i> Walsingham; Peach fruit moth)	<i>Aronia arbutifolia</i>	대생식물의 생과실
		<i>Chaenomeles japonica</i> (플명자)	
		<i>Chaenomeles speciosa</i>	
		<i>Cornus mas</i>	
		<i>Crataegus</i> spp.(산사나무속)	
		<i>Cydonia oblonga</i>	
		<i>Malus</i> spp.(사과나무속)	
		<i>Phoenix dactylifera</i>	
		<i>Prunus americana</i>	
		<i>Prunus armeniaca</i> (살구)	
		<i>Prunus domestica</i>	
		<i>Prunus dulcis</i> = <i>P. amygdalus</i> (아몬드)	
		<i>Prunus mume</i> (매실)	
		<i>Prunus persica</i> (복숭아)	
		<i>Prunus salicina</i> (자두)	
		<i>Pyrus</i> spp.(배나무속)	
		<i>Rosa</i> spp.(장미속)	
<i>Sorbus aucuparia</i>			
<i>Sorbus commixta</i> (마가목)			
<i>Ziziphus jujuba</i> (대추)			

※ 사과·배·복숭아 생과실은 다음요건(농림축산검역본부고시)에 따라 대만수출 가능

- 1) 배는 수출농가 등록, 봉지씌우기 재배, 복숭아심식나방 방제 및 방제 사항기록, 선과장 등록, 수출검사
- 2) 사과·복숭아는 수출농가 등록, 6~10월까지 월 2회 복숭아심식나방 예찰 및 방제, 예찰 및 방제사항 기록, 재배지 검사, 선과장 등록, 대만검역관의 수출과수원 및 선과장 현지조사, 수출검사 등
- 3) 수출식물검역증명서에 “The Fruits have been thoroughly inspected and found free of peach fruit moth and other quarantine pests designated by BAPHIQ. Code No. of Packing House:00-00, Date of Inspection: month, day, year” 부기

※ 살구, 매실, 자두, 대추 생과실은 대만 수출 불가능

붙임2 | 병해충 무감염증명 대상식물(수출식물검역증명서에 무감염 부기)

① 대상병해충 : 감자뽕나방(*Phthorimaea operculella* (Zeller); Potato tuber moth)

대 상 식 물	품 목 예 시
다음 생식물(生植物)의 줄기, 잎, 싹, 피경 및 생과실	
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i>	사탕무
Solanaceae(가지과)	고추, 파프리카, 피망, 가지, 감자, 담배, 토마토 등

② 대상병해충 : 화살깎지벌레(*Unaspis yanonensis* (Kuwana); Arrow head scale)

대 상 식 물	품 목 예 시
다음 생식물(生植物)의 전체 또는 일부분 (종자 제외) - 꽃, 과실에 해당	
<i>Citrus</i> spp.(귤속)	귤, 유자, 레몬
<i>Fortunella</i> spp.(금귤속)	금귤 등
<i>Poncirus</i> spp.(탱자나무속)	탱자 등

③ 대상병해충 : 꽃노랑총채벌레(*Frankliniella occidentalis* (Pergande); Western flower thrips)

대 상 식 물	품 목 예 시
종자 및 지하부를 제외한 다음 생식물(生植物)의 전체 또는 일부분	
<i>Aesculus</i> spp.(칠엽수속)	칠엽수, 서양칠엽수(마로니에)
<i>Allium</i> spp.(부추속)	마늘, 달래, 부추, 파, 양파
<i>Alnus</i> spp.(오리나무속)	오리나무, 물오리나무, 사방오리나무
<i>Amaryllis</i> spp.= <i>Hippeastrum</i> spp.	아마틸리스
<i>Alstroemeria</i> spp.(알스트로메리아속)	알스트로메리아
<i>Althaea</i> spp.	접시꽃
<i>Amaranthus</i> spp.(비름속)	줄맨드라미, 털비름, 가시비름, 색비름, 비름, 청비름, 개비름, 눈비름
<i>Anagallis arvensis</i>	뚜껍별꽃
<i>Anthurium</i> spp.(안스리움속)	안스리움

- 계 속(꽃노랑총채벌레) -

대상 식물	품 목 예 시
<i>Antirrhinum majus</i>	금어초
<i>Asclepias</i> spp.	
<i>Asparagus officinalis</i>	아스파라거스
<i>Begonia</i> spp.(베고니아속)	베고니아
<i>Berzelia</i> spp.	
<i>Bougainvillea spectabilis</i>	
<i>Bouvardia</i> spp.	
Brassicaceae(십자화과)	<i>Brassica</i> spp.(배추, 양배추), <i>Rhaphanus</i> spp.(무), <i>Wasabia</i> spp.(고추냉이), 냉이
<i>Brunia laevis</i>	
<i>Calceolaria</i> spp.(칼세올라리아속)	
<i>Calluna vulgaris</i> = <i>Erica vulgaris</i>	
<i>Calotropis gigantea</i>	
<i>Carya illinoensis</i>	
<i>Celastrus</i> spp.	노박덩쿨
<i>Celosia</i> spp.(맨드라미속)	맨드라미
<i>Cerastium glomeratum</i>	유럽점나도나물
<i>Chamelaucium</i> spp.	
Chenopodiaceae(명아주과/비름과)	
<i>Citrus</i> spp.(귤속)	귤, 유자, 레몬
<i>Clematis</i> spp.	
<i>Codiaeum</i> spp.	
Compositae(국화과)	국화, 해바라기, 구절초, 민들레, 취, 해바라기, 머위, 쑥갓, 코스모스, 치커리, 쑥, 상추, 달리아, 데이지, 과꽃
Cucurbitaceae(박과)	호박, 오이, 수박, 참외, 멜론, 수세미, 여주
<i>Cyclamen</i> spp.(시클라멘속)	시클라멘
<i>Dianthus</i> spp.(패랭이꽃속)	카네이션, 패랭이꽃, 수염패랭이꽃, 갯패랭이꽃, 난장이패랭이꽃, 슬패랭이꽃
<i>Digitaria ciliaris</i>	
<i>Diospyros kaki</i>	감, 단감

- 계 속(꽃노랑총채벌레) -

대상 식물	품목 예시
<i>Echinochloa crus-galli</i>	피
<i>Echium plantagineum</i>	
<i>Eremurus</i> spp.	
<i>Eschscholzia californica</i>	금영화
<i>Euphorbia</i> spp.(대극속)	대극, 붉은대극, 포인세티아
<i>Eustoma</i> spp. = <i>Lisianthus</i> spp.	
<i>Ficus</i> spp.(무화과나무속)	무화과나무, 인도고무나무
<i>Freesia</i> spp.(프레에시아속)	프리시아
<i>Fuchsia</i> spp.(후크시아속)	후크시아
<i>Gentiana</i> spp.(용담속)	용담, 산용담
<i>Geranium</i> spp.(쥐손이풀속)	쥐손이풀
Gesneriaceae(돌담배과/제스네리아과)	
<i>Gladiolus</i> spp.(글라디올러스속)	글라디올러스
<i>Gossypium</i> spp.(목화속)	목화
<i>Gypsophila</i> spp.(대나물속)	대나물
<i>Heliotropium europaeum</i>	
<i>Hemerocallis</i> spp.(원추리속)	원추리
<i>Hibiscus</i> spp.(무궁화속)	닥풀, 황근, 무궁화, 부용
<i>Hordeum</i> spp.(보리속)	보리
<i>Hydrangea</i> spp.(수국속)	수국, 산수국, 등수국, 나무수국
<i>Hypericum</i> spp.(물레나물속)	물레나물, 고추나물
<i>Impatiens</i> spp.(봉선화속)	봉선화, 물봉선, 노랑물봉선화
<i>Ipomoea</i> spp.(고구마속)	고구마
<i>Iris</i> spp.(붓꽃속)	붓꽃(각시붓꽃, 금붓꽃, 난장이붓꽃 등), 꽃창포, 노랑꽃창포, 대청부채
<i>Jasminum sambac</i>	
<i>Kalanchoe</i> spp.(카랑코에속)	카랑코에
Labiatae(꿀풀과)	<i>Perilla</i> spp.(들깨), <i>Lavandula</i> spp.(라벤더) <i>Isodon</i> spp.(방아풀, 산박하)
<i>Lantana</i> spp.	
<i>Laurus</i> spp.(월계수속)	월계수

- 계 속(꽃노랑총채벌레) -

대 상 식 물	품 목 예 시
Leguminosae(콩과)	콩, 강낭콩, 완두, 팥, 동부, 녹두, 땅콩
<i>Leptospermum</i> spp.	
<i>Leucospermum</i> spp.	
<i>Lilium</i> spp.(나리속)	백합, 나리
<i>Limonium</i> spp.	갯질경
<i>Linnaea borealis</i>	린네풀
<i>Malva</i> spp.(아욱속)	아욱
<i>Mangifera indica</i>	망고
<i>Mollugo verticillata</i>	큰석류풀
<i>Oenothera</i> spp.(달맞이꽃속)	달맞이꽃, 애기달맞이꽃, 큰달맞이꽃
Orchidaceae(난초과)	난초, 심비디움, 호접란, 천마
<i>Ornithogalum</i> spp.	
<i>Oxalis</i> spp.(괘이밥속)	괘이밥, 애기괘이밥, 큰괘이밥
<i>Paeonia</i> spp.	
<i>Papaver rhoeas</i>	개양귀비
<i>Pelargonium</i> spp.	
<i>Persea</i> spp.	
<i>Pistacia vera</i>	피스타치오
<i>Polianthes</i> spp.	
<i>Portulaca grandiflora</i>	채송화
<i>Primula</i> spp.(앵초속)	앵초, 돌앵초, 좀설앵초, 설앵초, 큰앵초
<i>Protea</i> spp.	
<i>Punica granatum</i>	석류
<i>Quercus</i> spp.(참나무속)	상수리나무, 갈참나무, 굴참나무, 졸참나무, 물참나무, 떡갈나무, 신갈나무, 가시나무
<i>Radermachera</i> spp.	
<i>Ranunculus</i> spp.	라넨쿨러스속
<i>Rhododendron</i> spp.(진달래속)	진달래, (산)철쭉, 참꽃나무, 만병초
<i>Rhus</i> spp.(옻나무속)	붉나무, 옻나무
<i>Ruscus</i> spp.	

- 계 속(꽃노랑총채벌레) -

대상 식물	품 목 예 시
Rosaceae(장미과)	<i>Crataegus</i> spp.(산사), <i>Fragaria</i> spp.(딸기), <i>Malus</i> spp.(사과), <i>Prunus</i> spp.(벚나무, 복숭아, 자두, 살구, 매실, 아몬드), <i>Pyrus</i> spp.(배), <i>Rosa</i> spp.(장미), <i>Rubus</i> spp.(산딸기)
<i>Salix</i> spp.(버드나무속)	버들
<i>Sandersonia aurantiaca</i>	
<i>Schlumbergera</i> spp.	
<i>Secale cereale</i>	호밀
<i>Serissa foetida</i>	
<i>Setaria viridis</i>	강아지풀
<i>Shepherdia canadensis</i>	
Solanaceae(가지과)	고추, 피프리카, 피망, 가지, 감자, 담배, 토마토
<i>Stellaria</i> spp.(별꽃속)	벼룩나물
<i>Syzygium jambos</i> = <i>Eugenia jambos</i>	로즈애플
<i>Thryptomene</i> spp.	
<i>Tibouchina</i> spp.	
<i>Trachelium</i> spp.	
<i>Tribulus terrestris</i>	남가새
<i>Triticum aestivum</i>	밀
<i>Tropaeolum majus</i>	한련
Umbelliferae(산형과)	당근, 사상자, 미나리, 고수, 방풍, 참나물, 천궁, 당귀, 강활
<i>Vaccinium</i> spp.(산앵두나무속)	모새나무, 월귤, 청금나무, 들쭉나무, 산앵도나무
<i>Verbena</i> spp.(마편초속)	마편초
<i>Veronica</i> spp.(꼬리풀속)	두메투구꽃, 방패꽃, 문모초, 개불알풀
<i>Viburnum</i> spp.(가막살나무속)	아왜나무, 분꽃나무, 가막살나무, 덜꿩 나무, 배암나무, 백당나무,
<i>Viola tricolor</i>	야생팬지
<i>Vitis</i> spp.(포도나무속)	포도나무, 머루
<i>Yucca</i> spp.(유카속)	실유카
<i>Zantedeschia</i> spp.	
<i>Zea mays</i>	옥수수

④ 대상병해충 : 마늘줄기선충(*Ditylenchus dipsaci* (Kuhn) Filipjev; Stem nematode)

대 상 식 물	품 목 예 시
- 딸기 생과실	딸기
- 다음의 식물을 제외한 모든 생식물(生植物)의 뿌리, 줄기, 잎, 꽃	
Aizoaceae(<i>Mollugo</i> spp. 제외)	석류풀과(번행초과)
Araceae(천남성과)	천남성, 반하, 토란, 곤약, 창포, 석창포
Balsaminaceae(봉선화과)	봉선화, 노랑물봉선화, 물봉선
Bombacaceae(뽕박스과)	
Bryophyta(선태식물문)	이끼
Cactaceae(선인장과)	선인장
Cornaceae(층층나무과) - <i>Aucuba</i> spp.(식나무속 제외)	산딸나무, 층층나무, 말채나무, 산수유, 폴산딸나무
Crassulaceae	돌나물과(뽕의비름과)
Edible fungus[식용균류; Basidiomycota (담자균문) 및 자낭균문(Ascomycota)]	버섯(팽이, 표고, 목이, 송이, 느타리 등)
Elaeocarpaceae(팽이밥목의 담팔수과)	
Ericaceae(진달래과)	진달래, 철쭉, 등대꽃, 홍월귤, 산매자나무, 월귤, 정금나무, 들쭉나무, 산앵도나무
Euphorbiaceae(대극과) - <i>Manihot</i> spp. 제외	대극, 포인세티아
Fagaceae(참나무과)	참나무
Gymnospermae(나자식물)	개비자나무과, 금송과, 나한송과, 남양삼나무과, 소나무과, 주목과, 측백나무과, 소철과, 플로리다소철과, 은행나무
Lauraceae(녹나무과)	생강나무, 비목나무, 녹나무, 월계수, 후박나무
Moraceae(뽕나무과)	뽕나무, 꾸지뽕나무, 닥나무, 무화과나무, 인도고무나무, 뽕모시풀
Nymphaeaceae(수련과)	연꽃, 수련
Oleaceae(물푸레나무과) - <i>Syringa</i> spp.(수수꽃다리속 제외)	개나리, 광나무, 들메나무, 만리화, 목서, 물푸레나무, 미선나무, 영춘화, 이팝나무, 쥐똥나무, 향선나무
Orchidaceae(난초과)	주머니꽃, 난(초), 천마, 석곡, 심비디움, 덴드로비움, 팔레놉시스(호접란)

- 계 속(마늘줄기선충) -

대 상 식 물	품 목 예 시
Palmaceae(야자나무과/종려나무과)	
Pandanaceae(판다누스과)	
Plantaginaceae(질경이과) - <i>Plantago</i> spp.(질경이속) 제외	
Potamogetonaceae(가래과) - <i>Potamogeton</i> spp. 제외	
Pteridophyte - <i>Equisetum</i> spp.(속새속) 제외	
<i>Pyrus</i> spp.(배나무속)	배나무
Rubiaceae(꼭두서니과) - <i>Galium</i> spp. 제외	
Saxifragaceae(범의귀과) - <i>Hydrangea</i> spp. 제외	
Scrophulariaceae(현삼과) - <i>Veronica</i> spp. 제외	
Sterculiaceae	벽오동과
Urticaceae(췌기풀과: <i>Urtica</i> spp. 제외)	
Violaceae(제비꽃과: <i>Viola</i> spp. 제외)	
Vitaceae[포도나무과: <i>Vitis vinifera</i> (포도) 제외]	
※ 위에 열거된 식물들은 마늘줄기선충이 없음을 부기하지 않음.	
다음의 종자(식용 및 사료로 사용되는 것은 제외)는 마늘줄기선충이 없음을 부기해야 함	
<i>Allium</i> spp.(부추속)	마늘, 달래, 부추, 파, 양파
<i>Beta vulgaris</i>	사탕무
<i>Cucumis melo</i>	멜론
<i>Daucus carota</i>	당근
<i>Dipsacus fullonum</i>	산토끼꽃
<i>Medicago sativa</i>	자주개자리(알팔과)
<i>Phaseolus coccineus</i>	적화강낭콩
<i>Phaseolus vulgaris</i>	덩굴강낭콩
<i>Phlox drummondii</i>	드람불꽃
<i>Pisum sativum</i>	완두(식용 및 사료용은 제외)

- 계 속(마늘줄기선충) -

대 상 식 물	품 목 예 시
<i>Secale cereale</i>	호밀
<i>Spinacea oleracea = Spinacia oleracea</i>	시금치
<i>Trifolium hybridum</i>	설토끼풀
<i>Trifolium pratense</i>	붉은토끼풀
<i>Trifolium repens</i>	토끼풀
<i>Vicia faba</i>	잠두(식용 및 사료용은 제외)

⑤ 대상병해충 : 감자썩이선충(*Ditylenchus destructor* Thorne; Potato rot nematode)

대 상 식 물	품 목 예 시
다음 생식물의 지하부 및 부정근	
<i>Allium</i> spp.(부추속)	마늘, 달래, 부추, 파, 양파
<i>Amaranthus caudatus</i>	줄맨드라미
<i>Angelica sinensis</i>	
<i>Anthemis arvensis</i>	
<i>Apium graveolens</i>	샐러리악
<i>Arachis</i> spp.(꼬투리 및 종자 포함)	땅콩
<i>Artemisia vulgaris</i>	
<i>Barbarea vulgaris</i>	
<i>Begonia</i> spp.	
<i>Bellis perennis</i>	데이지
<i>Bertoroa incana</i> (십자화과의 일종)	
<i>Beta vulgaris</i>	사탕무
<i>Brassica oleracea</i>	야생양배추
<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> = <i>Brassica chinensis</i>	배추
<i>Camassia</i> spp.	
<i>Camellia sinensis</i>	차나무
<i>Canna</i> spp.(홍초속)	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	냉이
<i>Capsicum annuum</i>	고추, 피망, 파프리카
<i>Chenopodium album</i>	흰명아주

- 계 속(감자썩이선충) -

대 상 식 물	품 목 예 시
<i>Chionodoxa</i> spp.	
<i>Chloris virgata</i>	
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	
<i>Chrysanthemum morifolium</i>	국화
<i>Cicer arietinum</i>	
<i>Cimicifuga racemosa</i>	
<i>Cirsium arvense</i>	캐나다엉겅퀴
<i>Citrullus lanatus</i>	수박
<i>Citrus sinensis</i>	당귤나무
<i>Colchicum</i> spp.	
<i>Crocus vernus</i>	
<i>Cucumis sativus</i>	오이
<i>Cucurbita moschata</i>	호박
<i>Cucurbita pepo</i>	
<i>Cyperus rotundus</i>	향부자
<i>Dahlia</i> spp.(다알리아속)	
<i>Datura stramonium</i>	독말풀
<i>Daucus carota</i>	당근
<i>Dianthus</i> spp.(괘랭이꽃속)	왕바랭이
<i>Eleusine indica</i>	
<i>Elymus repens</i> = <i>Agropyron repens</i>	
<i>Erythronium denscanis</i>	
<i>Festuca pratensis</i>	
<i>Fragaria</i> spp.(딸기속)	
<i>Fumaria officinalis</i>	서양현호색
<i>Gladiolus</i> spp.(글라디올러스속)	
<i>Glycine max</i>	콩
<i>Helianthus annuus</i>	해바라기
<i>Hordeum vulgare</i>	보리
<i>Humulus lupulus</i>	호프
<i>Hyacinthus</i> spp.(히아신스속)	

- 계 속(감자썩이선충) -

대 상 식 물	품 목 예 시
<i>Ipomoea batatas</i>	고구마
<i>Iris</i> spp.(붓꽃속)	
<i>Lathyrus hirsutus</i>	
<i>Lathyrus latifolius</i>	
<i>Liatris spicata</i>	
<i>Linaria vulgaris</i>	좁은잎해란초
<i>Lycopersicon esculentum</i>	토마토
<i>Lycopsis arvensis</i>	
<i>Matricaria inodora</i> = <i>M. perforata</i>	
<i>Medicago sativa</i>	알팔파
<i>Melilotus officinalis</i>	
<i>Mentha arvensis</i>	
<i>Narcissus</i> spp.(수선화속)	
<i>Nectaroscordum</i> spp.	
<i>Nicotiana tabacum</i>	담배
<i>Panax ginseng</i>	인삼
<i>Pastinaca sativa</i>	파스닙
<i>Phaseolus vulgaris</i>	덩굴강낭콩
<i>Plantago major</i>	
<i>Portulaca</i> spp.	
<i>Potentilla anserina</i>	
<i>Raphanus sativus</i>	무
<i>Rheum rhaponticum</i>	무장군풀
<i>Rumex</i> spp.(소리쟁이속)	
<i>Saccharum officinarum</i>	(사탕수수)
<i>Sisyrinchium angustifolium</i>	등심붓꽃
<i>Solanum</i> spp.(가지속)	
<i>Solidago graminifolia</i> = <i>S. anceolata</i> = <i>Euthamia graminifolia</i>	
<i>Sonchus</i> spp.	
<i>Stachys palustris</i>	

- 계 속(감자썩이선충) -

대 상 식 물	품 목 예 시
<i>Stenotaphrum secundatum</i>	
<i>Syringa vulgaris</i>	라일락
<i>Tagetes minuta</i>	청하향초
<i>Taraxacum officinale=Leontoden taraxacum</i>	서양민들레
<i>Tigridia</i> spp.	
<i>Trifolium</i> spp.(토끼풀속)	
<i>Tripleurospermum maritimum</i>	
<i>Triticum aestivum</i>	밀
<i>Tropaeolum polyphyllum</i>	
<i>Tulipa</i> spp.(튤립속)	
<i>Tussilago farfara</i>	
<i>Vicia sativa</i>	
<i>Vigna unguiculata= V.sinensis</i>	동부
<i>Xanthium strumarium</i>	도꼬마리
<i>Zea mays</i>	옥수수

⑥ 대상병해충 : 감자역병 A² 교배형(*Phytophthora infestans* A² Mating Type; Potato late blight A² Mating Type)

- 수출식물검역증명서에 “The plants or plant parts have been thoroughly inspected and found free from *Phytophthora infestans* A² Mating type and originate from areas free from *Phytophthora infestans* A² Mating type.” 부기
- 수출식물검역증명서에 위의 부기사항이 기재되어 있지 않거나, 대만 도착지검사 결과 상기 병해충 검출 시 해당 화물은 폐기 또는 반송

대 상 식 물	품 목 예 시
다음 생식물의 줄기, 잎, 싹, 껍질 및 과실	
<i>Lycopersicum esculentum</i>	토마토
<i>Solanum</i> spp.(가지속)	감자, 가지

⑦ 대상병해충 : 뿌리응애(*Rhizoglyphus echinopus* Fumouze and Robin; Bulb mite)

대 상 식 물	품 목 예 시
다음 생식물의 전체 또는 일부분(종자 제외)	
<i>Allium</i> spp.(부추속)	마늘, 달래, 부추, 파, 양파
<i>Arctium lappa</i>	우엉
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>	양배추
<i>Buxus microphylla</i> var. <i>intermedia</i>	
<i>Capsicum</i> spp.(고추속)	고추, 파프리카, 피망
<i>Curcuma longa</i> = <i>C. domestica</i>	
<i>Dahlia</i> spp.(다알리아속)	
<i>Daucus carota</i> var. <i>sativa</i>	당근
<i>Eucharis grandiflora</i>	
<i>Freesia</i> spp.(프레에시아속)	프리지아
<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i>	용담
<i>Gladiolus</i> spp.(글라디올러스속)	글라디올러스
<i>Gloriosa</i> spp.	
<i>Glycine max</i>	콩
<i>Hemerocallis hybrida</i>	
<i>Hippeastrum</i> spp.	
<i>Hyacinthus</i> spp.(히야신스속)	히아신스
<i>Ipomoea batatas</i>	고구마
<i>Iris</i> spp.(아이리스속)	아이리스
<i>Lachenalia pendula</i>	
<i>Lilium</i> spp.(백합속)	백합, 나리
<i>Narcissus</i> spp.(수선화속)	수선화
<i>Paeonia suffruticosa</i>	모란
<i>Panax</i> spp.(인삼속)	인삼
<i>Pinellia ternata</i>	반하
<i>Pleurotus sajor-caju</i> 및 <i>P. ostreatus</i>	여름느타리, 느타리
<i>Raphanus sativus</i>	무
<i>Secale cereale</i>	호밀
<i>Sinningia</i> spp.	
<i>Solanum</i> spp.(가지속)	감자, 가지
<i>Tulipa</i> spp.(튤립속)	튤립
<i>Verbena officinalis</i>	마편초
<i>Vicia faba</i>	잠두

⑧ 대상병해충 : 가지검은마름병(*Erwinia pyrifoliae*; Fire blight)

- 수출식물검역증명서에 “The plants or plant parts have been thoroughly inspected and found free from *Erwinia pyrifoliae*.”
- 수출식물검역증명서에 위의 부기사항이 기재되어 있지 않거나, 대만 도착지검사 결과 상기 병해충 검출 시 해당 화물은 폐기 또는 반송

대 상 식 물	품 목 예 시
다음 식물의 전체 또는 일부(과실, 종자 제외)	
<i>Malus domestica</i> var. <i>idared</i>	
<i>Pyrus</i> spp.(배나무속)	배나무 묘목, 접수·삼수

⑨ 대상병해충 : 과실썩음병(*Acidovorax avenae* subsp. *citrulli*; Fire blotch)

대 상 식 물	구 분	검역 요건
○ <i>Benincasa hispida</i> (동아) ○ <i>Citrullus lanatus</i> (수박) ○ <i>Cucumis melo</i> (참외, 멜론) ○ <i>Cucumis sativus</i> (오이) ○ <i>Cucurbita moschata</i> (호박) ○ <i>Cucurbita pepo</i> (쭈키니호박)	번식용이 아닌 식물	•과실썩음병 무감염증명 부기 “The plants have been thoroughly inspected and found free from <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> ”
	번식용 식물 및 종자	•재배중 검사 및 과실썩음병 무감염증명 부기 “The plants have been thoroughly inspected during growing season and found free from <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> ”

붙임3 | 대만의 금지병해충(57종)

1. **Rice hoja blanca virus (Tenuivirus)**
2. **Rice dwarf virus (Phytoreovirus)**
3. **Rice stem nematode (*Ditylenchus angustus* Butler)**
4. West Indian sweet potato weevil (*Euscepes postfasciatus* Fairmaire)
5. Burrowing nematode (*Radopholus similis* (Cobb) Thorne; *R. citrophilus* Huettel, Dickson & Kaplan)
6. Citrus psorosis virus (Ophiovirus)
7. African greening of citrus (*Candidatus Liberibacter africanus* Garnier *et al.*)
8. Stem pitting strains of Citrus tristeza virus (Closterovirus)
9. Citrus blight
10. Stubborn disease of citrus (*Spiroplasma citri*)
11. Citrus cachexia viroid
12. Vein enation disease
13. Impietratura disease (virus)
14. Leaf curl disease (virus)
15. **Satsuma dwarf virus (Sadwavirus)**
16. Cristacortis viroid
17. Ringspot disease
18. Citrus drywilt (*Phoma tracheiphila* Petri)
19. Fiji disease virus (Fijivirus)
20. Sugarcane bacilliform virus (Badnavirus)
21. Sugarcane streak virus (Mastrevirus)
22. Sugarcane grassy shoot phytoplasma
23. Sugarcane Gumming disease (*Xanthomonas axonopodis* pv. *vasculorum* (Cobb) Vauterin *et al.* and *Xanthomonas vasicola* pv. *vasculorum* (Cobb) Vauterin *et al.*) (Formerly *Xanthomonas campestris* pv. *vasculorum* (Cobb) Dye)
24. Lethal yellowing phytoplasma
25. Coconut tinangaja viroid (Cocadviroid)
26. Coconut cadang-cadang viroid (Cocadviroid)
27. Roxana disease (virus)
28. Moko disease (*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* Race 2) (Formerly *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith Race 2)

29. Panama disease, Banana fusarial wilt (*Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* (E.F. Smith) Snyder & Hans. Race 2 & Race 3)
30. Mediterranean fruit fly (*Ceratitidis capitata* (Wiedemann))
31. Queensland fruit fly (*Bactrocera tryoni* (Froggatt))
32. Potato wart (*Synchytrium endobioticum* (Schilf) Per.)
33. Golden nematode (*Globodera rostochiensis* Wr.)
34. Tobacco blue mold (*Peronospora tabacina* Adam.)
35. Mango seed weevil (*Sternochetus mangiferae* (Fabricius))
36. Chinese citrus fly (*Bactrocera minax* (Enderlein))
37. Peach fruit fly (*Bactrocera zonata* (Saunders))
38. Cucurbit fly (*Dacus ciliatus* Loew)
39. Guava fruit fly (*Bactrocera correcta* (Bezzi))
40. Carambola fruit fly (*Bactrocera carambolae* Drew & Hancock)
41. Papaya fruit fly (*Bactrocera papayae* Drew & Hancock)
42. *Bactrocera philippinensis* Drew & Hancock
43. *Bactrocera caryeae* (Kapoor)
44. *Bactrocera kandiensis* Drew & Hancock
45. *Bactrocera pyrifoliae* Drew & Hancock
46. Banana bract mosaic virus (Potyvirus)
47. Banana streak virus (Badnavirus)
- 48. Asian longhorned beetle (*Anoplophora glabripennis* (Motschulsky))**
49. Mango weevil (*Sternochetus frigidus* (Fabricius) = *Cryptorrhynchus gravis* (Fabricius))
- 50. Peach fruit moth (*Carposina sasakii* Matsumura = *C. niponensis* Walsingham)**
51. *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld
52. Fire blight (*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*)
53. Mexican fruit fly (*Anastrepha ludens* (Loew))
54. West Indian fruit fly (*Anastrepha obliqua* Macquart = *A. mombinpraeoptans* Sein)
55. South American fruit fly (*Anastrepha fraterculus* (Wiedemann))
56. Black fruit fly (*Anastrepha serpentina* Wiedemann)
57. *Xylella fastidiosa*

붙임4 | 대만의 검역병해충(1,426종)

해충 310, 응애 32, 병(세균·진균·바이러스) 602, 파이토플라즈마 93, 선충54, 잡초 265, 기생식물 13, 연체동물12, 기타 45

가. 해충(310종)

<i>Acalolepta cervina</i>	<i>Bactrocera frauenfeldi</i>	<i>Choristoneura occidentalis</i>
<i>Acanthoscelides obtectus</i>	<i>Bactrocera jarvisi</i>	<i>Choristoneura rosaceana</i>
<i>Acanthoscelides pallidipennis</i>	<i>Bactrocera kirki</i>	<i>Chrysomphalus diversicolor</i>
<i>Acleris gloverana</i>	<i>Bactrocera latifons</i>	<i>Chrysomphalus pinnulifera</i>
<i>Acleris variana</i>	<i>Bactrocera melanota</i>	<i>Cilaeopeplus swezeyi</i>
<i>Acrogonia terminalis</i>	<i>Bactrocera musae</i>	<i>Coccus</i> spp.
<i>Acrolepiopsis assectella</i>	<i>Bactrocera neohumeralis</i>	<i>Conoderus eveillardii</i>
<i>Acropolitis rudisana</i>	<i>Bactrocera occipitalis</i>	<i>Conoderus rufangulus</i>
<i>Adelges tsugae</i>	<i>Bactrocera oleae</i>	<i>Conopia hector</i>
<i>Adoxophyes orana</i>	<i>Bactrocera passiflorae</i>	<i>Conotrachelus aguacatae</i>
<i>Aeolesthes sarta</i>	<i>Bactrocera psidii</i>	<i>Contarinia nasturtii</i>
<i>Aethina tumida</i>	<i>Bactrocera trivialis</i>	<i>Contarinia sorghicola</i>
<i>Affirmaspis socotrana</i>	<i>Bactrocera tuberculata</i>	<i>Coptotermes curvignathus</i>
<i>Agrilus mali</i>	<i>Bactrocera umbrosa</i>	<i>Copturus aguacatae</i>
<i>Amorbia emigratella</i>	<i>Bactrocera xanthodes</i>	<i>Cryptophlebia leucotreta</i>
<i>Anastrepha grandis</i>	<i>Bemisia cordylinidis</i>	<i>Cryptorhynchus lapathi</i>
<i>Anastrepha striata</i>	<i>Blitopertha orientalis</i>	<i>Curculio davidi</i>
<i>Anastrepha suspensa</i>	<i>Brachycerus</i> spp.	<i>Curculio elephas</i>
<i>Anchastus swezeyi</i>	<i>Brachydactyla discoidea</i>	<i>Curculio nucum</i>
<i>Anomala sulcatula</i>	<i>Bruchophagus roddi</i>	<i>Cydia latiferreana</i>
<i>Anthonomus bisignifer</i>	<i>Bruchus pisorum</i>	<i>Cydia splendana</i>
<i>Anthonomus eugenii</i>	<i>Bruchus rufimanus</i>	<i>Dacus bivittatus</i>
<i>Anthonomus grandis</i>	<i>Bulbifer homeorhynchus</i>	<i>Dacus vertebratus</i>
<i>Aonidiella lauretorum</i>	<i>Cacoecimorpha pronubana</i>	<i>Dasineura mali</i>
<i>Aonidiella tinerfinensis</i>	<i>Cacopsylla chinensis</i>	<i>Dendroctonus adjunctus</i>
<i>Apis mellifera capensis</i>	<i>Cacyreus marshalli</i>	<i>Dendroctonus ponderosae</i>
<i>Apis mellifera scuttellata</i>	<i>Callipogon relictus</i>	<i>Dendroctonus rufipennis</i>
<i>Archips micaceanus</i>	<i>Callosobruchus analis</i>	<i>Dendrolimus sibiricus</i>
<i>Argyrotaenia ljugiana</i>	<i>Callosobruchus phaseoli</i>	<i>Delia antique</i>
<i>Artitropa comus</i>	<i>Camponotus floridanus</i>	<i>Delia platura</i>
<i>Aspidiotus spinosus</i>	<i>Camponotus pennsylvanicus</i>	<i>Diabrotica barberi</i>
<i>Asterolecanium</i> spp.	<i>Capua tortrix</i>	<i>Diabrotica speciosa</i>
<i>Bactrocera albistrigata</i>	<i>Cataenococcus hispidus</i>	<i>Diabrotica undecimpunctata</i>
<i>Bactrocera aquilonis</i>	<i>Catamacta lotinana</i>	<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>
<i>Bactrocera cucumis</i>	<i>Ceratitis</i> spp.	<i>Diaprepes abbreviatus</i>
<i>Bactrocera decipiens</i>	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	<i>Diaspidiotus gigas</i>
<i>Bactrocera diversa</i>	<i>Choristoneura conflictana</i>	<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i>
<i>Bactrocera fascialis</i>	<i>Choristoneura fumiferana</i>	<i>Diaspidiotus pyri</i>

<p><i>Diatraea saccharalis</i> <i>Dilobopterus costalimai</i> <i>Draeculacephala minerva</i> <i>Dreyfusia piceae</i> <i>Drosophila suzuki</i> <i>Dryocoetes confusus</i> <i>Dryocosmus kuriphilus</i> <i>Dysmicoccus nesophilus</i> <i>Dyspessa ulula</i> <i>Earias vittella</i> <i>Echinothrips americanus</i> <i>Elytroteinus subtruncatus</i> <i>Epiphyas postvittana</i> <i>Epitrix cucumeris</i> <i>Epitrix tuberis</i> <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Eublemma rufimixta</i> <i>Eucalymnatus tessellatus</i> <i>Euproctis chrysorrhoea</i> <i>Eurytoma laricis</i> <i>Exosoma lusitanica</i> <i>Frankliniella</i> spp. <i>Furcaspis oceanica</i> <i>Gnathotrichus sulcatus</i> <i>Gonipterus gibberus</i> <i>Graphocephala atropunctata</i> <i>Grapholita funebrana</i> <i>Grapholita inopinata</i> <i>Grapholita molesta</i> <i>Grapholita packardi</i> <i>Grapholita prunivora</i> <i>Heilipus lauri</i> <i>Helicoverpa zea</i> <i>Hemiberlesia cyanophylli</i> <i>Hemiberlesia palmae</i> <i>Hemimene juliana</i> <i>Hesperophanes campestris</i> <i>Heterobostrychus aequalis</i> <i>Heteronychus arator</i> <i>Holotrichia mindanaona</i> <i>Homalodisca coagulata</i></p>	<p><i>Howardia biclavis</i> <i>Hylastes ater</i> <i>Hylurgopinus rufipes</i> <i>Hyphantria cunea</i> <i>Hypothenemus hampei</i> <i>Insulaspis orsoni</i> <i>Ips calligraphus</i> <i>Ips confusus</i> <i>Ips grandicollis</i> <i>Ips lecontei</i> <i>Ips pini</i> <i>Ips plastographus</i> <i>Ips typographus</i> <i>Ischnaspis longirostris</i> <i>Kandyosilis cochleata</i> <i>Kytorhinus immixtus</i> <i>Laspeyresia</i> spp. <i>Lepidosaphes salicina</i> <i>Lepidosaphes tokionis</i> <i>Leptocybe invasa</i> <i>Leucoptera malifoliella</i> <i>Limenius californicus</i> <i>Listroderes subcinctus</i> <i>Listronotus bonariensis</i> <i>Lobesia botrana</i> <i>Lopholeucaspis cockerelli</i> <i>Linepithema humile</i> <i>Lymantria dispar</i> <i>Lymantria monacha</i> <i>Malacosoma americanum</i> <i>Malacosoma disstria</i> <i>Margarodes prieskaensis</i> <i>Margarodes vredendalensis</i> <i>Matsucoccus matsumurae</i> <i>Mayetiola destructor</i> <i>Megalometis chilensis</i> <i>Melanaspis corticosa</i> <i>Melanaspis elaeagni</i> <i>Melanaspis nigropunctata</i> <i>Melanotus communis</i> <i>Metamasius</i> spp.</p>	<p><i>Monochamus</i> spp. <i>Mudaria luteileprosa</i> <i>Mycetaspis personata</i> <i>Mycetaspis sphaerioides</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Nasutitermes corniger</i> <i>Naupactus xanthographus</i> <i>Nemorimyza maculosa</i> <i>Neomaskellia bergii</i> <i>Neoselenaspidus silvaticus</i> <i>Nipaecoccus nipae</i> <i>Nysius vinitor</i> <i>Oncometopia fascialis</i> <i>Operophtera brumata</i> <i>Opogona sacchari</i> <i>Opuntiaspis carinata</i> <i>Orgyia antiqua</i> <i>Orgyia pseudotsugata</i> <i>Orthezia insignis</i> <i>Oryctes monoceros</i> <i>Ostrinia nubilalis</i> <i>Otiorhynchus ligustici</i> <i>Oulema melanopus</i> <i>Oviticoccus agavium</i> <i>Pammene fasciana</i> <i>Paranthrene tabaniformis</i> <i>Parthenolecanium corni</i> <i>Paraputo hispidus</i> <i>Pectinophora scutigera</i> <i>Perileucoptera coffeella</i> <i>Phalaenoides glycinae</i> <i>Phenacaspis tangana</i> <i>Phenacoccus manihoti</i> <i>Phyllophaga</i> spp. <i>Pinnaspis dracaeanae</i> <i>Pinnaspis strachani</i> <i>Pissodes nemorensis</i> <i>Pissodes strobi</i> <i>Pissodes terminalis</i> <i>Pogonomyrmex occidentalis</i> <i>Prays endocarpa</i> <i>Premnotrypes latithorax</i></p>
---	--	--

- 계 속(해충) -

<p><i>Premnotrypes suturicallus</i> <i>Premnotrypes vorax</i> <i>Proeulia</i> spp. <i>Promecotheca cumingii</i> <i>Prostephanus truncatus</i> <i>Proterhinus vestitus</i> <i>Pseudischnaspis bowreyi</i> <i>Pseudococcus</i> spp. <i>Pterandrus</i> spp. <i>Ptilodactyla exotica</i> <i>Pulvinaria urbicola</i> <i>Rhagoletis cerasi</i> <i>Rhagoletis cingulata</i> <i>Rhagoletis fausta</i> <i>Rhagoletis indifferens</i> <i>Rhagoletis mendax</i> <i>Rhizoecus amorphophalli</i> <i>Rhizoecus floridanus</i> <i>Rhizoecus simplex</i> <i>Rhodogastria carneola</i> <i>Rhynchophorus palmarum</i> <i>Rondotia menciiana</i> <i>Sahlbergella singularis</i></p>	<p><i>Sardia pluto</i> <i>Scirtothrips aurantii</i> <i>Scirtothrips citri</i> <i>Scolytus morawitzi</i> <i>Scolytus multistriatus</i> <i>Scolytus scolytus</i> <i>Scyphophorus acupunctatus</i> <i>Selenaspidus antsingyi</i> <i>Selenaspidus littoralis</i> <i>Sesamia cretica</i> <i>Sirex noctilio</i> <i>Sitophilus granarius</i> <i>Sminthurus viridis</i> <i>Solenopsis invicta</i> <i>Solenopsis richteri</i> <i>Solenopsis richteri</i> × <i>Solenopsis</i> <i>Solenopsis xyloni</i> <i>Sphaeraspis vitis</i> <i>Spilonota lechriaspis</i> <i>Spilonota pyrusicola</i> <i>Spodoptera eridania</i> <i>Spodoptera frugiperda</i> <i>Spodoptera littoralis</i> <i>Stenoma catenifer</i></p>	<p><i>Taeniothrips samdensis</i> <i>Tecia solanivora</i> <i>Tessaratomya papillosa</i> <i>Tetropium castaneum</i> <i>Tetropium fuscum</i> <i>Tetropium gracilicorne</i> <i>Thrips</i> spp. <i>Tomicus piniperda</i> <i>Toxotrypana curvicauda</i> <i>Trioza erytreae</i> <i>Trogoderma granarium</i> <i>Unaspis citri</i> <i>Viteus vitifoliae</i> <i>Voraspiis tangana</i> <i>Wasmannia auropunctata</i> <i>Xyleborus affinis</i> <i>Xyleborus ferrugineus</i> <i>Xyleborus rugatus</i> <i>Xylopsocus capucinus</i> <i>Xylotrechus altaicus</i> <i>Xyphon (fomety Camoccephala) fulgida</i> <i>Yponomeuta malinellus</i> <i>Zabrotes subfasciatus</i></p>
--	---	---

나. 응애(32종)

<p><i>Acarapis woodi</i> <i>Aculops fuchsiae</i> <i>Aculus schlechtendali</i> <i>Brevipalpus chilensis</i> <i>Bryobia eharai</i> <i>Bryobia rubrioculus</i> <i>Cochlodispus operosus</i> <i>Eotetranychus carpini</i> <i>Eotetranychus pruni</i> <i>Epitrimerus pyri</i> <i>Eriophyes gossypii</i></p>	<p><i>Mononychellus tanajoa</i> <i>Oligonychus gossypii</i> <i>Oligonychus grypus</i> <i>Oligonychus indicus</i> <i>Oligonychus peruvianus</i> <i>Oligonychus punicae</i> <i>Oligonychus sacchari</i> <i>Oligonychus yotrheresi</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Petrobia latens</i> <i>Phyllocoptes apratus</i></p>	<p><i>Phytoseius hongkongensis</i> <i>Schizotetranychus andreopogoni</i> <i>Schizotetranychus asparagi</i> <i>Tetranychus canadensis</i> <i>Tetranychus marianae</i> <i>Tetranychus mcdanieli</i> <i>Tetranychus mexicanus</i> <i>Tetranychus turkestanii</i> <i>Tropilaelaps clareae</i> <i>Varroa sinhai</i></p>
--	---	---

다. 세균(56종)

<p><i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>avenae</i> <i>Agrobacterium larrymoorei</i> <i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Agrobacterium vitis</i> <i>Burkholderia andropogonis</i> <i>Burkholderia caryophylli</i> <i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Indidiosus</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> subsp. <i>flaccumfaciens</i> <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> subsp. <i>poinsettiae</i> <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>atroseptica</i> <i>Erwinia chrysanthemi</i> <i>Erwinia herbicola</i> pv. <i>gypsophilae</i> <i>Erwinia pyrifoliae</i> <i>Erwinia rhapontici</i> <i>Erwinia salicis</i> <i>Leifsonia(Clavibacter) xyli</i> subsp. <i>xyli</i> <i>Liberobacter asiaticum</i> <i>Pantoea stewartii</i> <i>Potato leaflet stunt bacterium</i> <i>Pseudomonas corrugata</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidae</i> <i>Pseudomonas lignicola</i> <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>eriobotryae</i></p>	<p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morprunorum</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>papulans</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>psi</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i> <i>Pseudomonas viridiflava</i> <i>Ralstonia solanacearum</i> Race3 <i>Xanthomonas acernea</i> <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>poinsettiicola</i> <i>Xanthomias axonopodis</i> pv. <i>vignicola</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vitians</i> <i>Xanthomonas cucurbitae</i> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>armoraciae</i> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>musacearum</i> <i>Xanthomonas fragariae</i> <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>perlargonii</i> <i>Xanthomonas hyacinthi</i> <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> <i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i> <i>Xanthomonas theicola</i> <i>Xanthomonas populi</i></p>
---	---

라. 진균(79종)

<p><i>Alternaria gaisen</i> <i>Anisogramma anomala</i> <i>Apiosporina morbosa</i> <i>Atropellis piniphila</i> <i>Botryosphaeria laricina</i> <i>Calonectria ilicicola</i> <i>Ceratocystis fagacearum</i> <i>Ceratocystis fimbriata</i> <i>Chrysomyxa abietis</i> <i>Chrysomyxa ledi</i> <i>Ciborinia camelliae</i> <i>Cronartium coleosporioides</i> <i>Cronartium flaccidum</i></p>	<p><i>Cronartium quercuum</i> f. sp. <i>fusiforme</i> <i>Cronartium himalayense</i> <i>Cronartium kamtschaticum</i> <i>Cronartium quercuum</i> <i>Cryphonectria parasitica</i> <i>Cytospora</i> sp. <i>Diaporthe mali</i> <i>Diaporthe phaseolorum</i> <i>Diaporthe tanakae</i> <i>Diaporthe vaccinii</i> <i>Didymella ligulicola</i> <i>Elsinoe australis</i> <i>Endocronartium harknessii</i></p>	<p><i>Entyloma holwayi</i> H. & P. Sydow <i>Eutypa lata</i> <i>Fusarium subglutinans</i> <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Gaeumannomyces graminis</i> <i>Gibberella circinata</i> <i>Gremmeniella abietina</i> <i>Gymnosporangium asiaticum</i> <i>Gymnosporangium clavipes</i> <i>Gymnosporangium fuscum</i> <i>Gymnosporangium globosum</i> <i>Gymnosporangium yamadae</i> <i>Lachnellula willkommii</i></p>
--	---	---

- 계 속(진균) -

<i>Leptosphaeria maculans</i>	<i>Phoma exigua</i> var. <i>foveata</i>	<i>Thecaphora solani</i>
<i>Leptosphaeria nodorum</i>	<i>Phoma tracheiphila</i>	<i>Tilletia barclayana</i>
<i>Macrophomina phaseolina</i>	<i>Phomopsis viticola</i>	<i>Tilletia indica</i>
<i>Melampsora farlowii</i>	<i>Phomopsis vitimegaspora</i>	<i>Trachysphaera fructigena</i>
<i>Monilinia fructigena</i>	<i>Phomopsis vitimegasora</i>	<i>Uredo dioscoreae-alatae</i>
<i>Nectria galligena</i>	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>	<i>Uredo gladioli-buettneri</i>
<i>Nectria mauritiicola</i>	<i>Phytophthora fragariae</i>	<i>Urocystis agropyri</i>
<i>Nectriella pironii</i>	<i>Puccinia gladioli</i>	<i>Urocystis tritici</i>
<i>Ophiostoma novo-ulmi</i>	<i>Puccinia mccleanii</i>	<i>Ustilago scitaminea</i>
<i>Ophiostoma ulmi</i>	<i>Puccinia pittieriana</i>	<i>Verticillium alboatrum</i>
<i>Ophiostoma wageneri</i>	<i>Rigidoporus lignosus</i>	<i>Verticillium dahliae</i>
<i>Peronosclerospora maydis</i>	<i>Sclerotium cepivorum</i>	
<i>Peronosclerospora sacchari</i>	<i>Septoria lycopersici</i>	
<i>Phoma andigena</i>	<i>Stenocarpella maydis</i>	

마. 바이러스, 바이로이드(464종) : 매개체(vector)도 수입금지

Abutilon mosaic virus (AbMV) (Geminiviridae, Begomovirus)
Ageratum yellow vein virus (AYVV) (Geminiviridae, Begomovirus)
African cassava mosaic virus (ACMV) (Geminiviridae, Begomovirus)
Agropyron mosaic virus (AgMV) (Potyviridae, Bymovirus)
Alfalfa cryptic virus 1 (ACV-1) (Partitiviridae, alphacryptovirus)
Alfalfa enation virus
Alfalfa mosaic virus (AIMV) (Bromoviridae, alfamovirus)
Alsike clover vein mosaic virus
Alstroemeria mosaic virus (AIMV) (Potyviridae, potyvirus)
Amaranthus leaf mottle virus (AmLMV) (Potyviridae, potyvirus)
American plum line pattern virus (APLPV) (Bromoviridae, Ilarvirus)
Andean potato latent virus (APLV) (Tymovirus)
Andean potato mottle virus (APMoV) (Comoviridae, Comovirus)
Anthoxanthum latent blanching virus (ALBV) (Hordeivirus)
Anthriscus yellows virus (AYV) (Sequiviridae, waikavirus)
Apple chat fruit disease
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) (Trichovirus, Flexiviridae)
Apple dimple fruit viroid (ADFVD) (Apscaviroid, Pospiviroidae)
Apple mosaic virus (ApMV) (Bromoviridae, Ilarvirus)
Apple scar skin viroid (ASSVd) (Pospiviroidae, Apscaviroid)
Apple stem grooving virus (ASGV) (Capillovirus, Flexiviridae)
Apple stem pitting virus (ASPV) (Foveavirus, Flexiviridae)
Arabis mosaic virus (ArMV) (Comoviridae, Nepovirus)
Araujia mosaic virus (ArjMV) (Potyviridae, potyvirus)
Arracacha Virus A (AVA) (Comoviridae, Nepovirus)
Arracacha Virus B (AVB) (Comoviridae, Nepovirus)
Arracacha Virus Y (AVY) (Potyviridae, potyvirus)

- 계 속(바이러스, 바이로이드) -

Artichoke Italian latent virus (AILV) (Comoviridae, nepovirus)
Artichoke latent virus (ArLV) (Potyviridae, potyvirus)
Artichoke mottled crinkle virus (AMCV) (Tombusviridae, Tombusvirus)
Artichoke yellow ringspot virus (AYRSV) (Comoviridae, Nepovirus)
Asparagus virus 1 (AV-1) (Potyviridae, potyvirus)
Asparagus virus 2 (AV-2) (Bromoviridae, ilarvirus)
Asparagus virus 3 (AV-3) (Potexvirus)
Banana bunchy top virus (BBTV) (Nanovirus)
Barley mild mosaic virus (BaMMV) (Potyviridae, bymovirus)
Barley mosaic virus (BBV)
Barley yellow dwarf virus-GPV (BYDV-GPV) (Luteovirus)
Barley yellow mosaic virus (BaYMV) (Potyviridae, Bymovirus)
Barley yellow striate mosaic virus (BYSMV) (Rhabdoviridae, Cytorhabdovirus)
Bean calico mosaic virus (BCaMV) (Geminiviridae, Begomovirus)
Bean common mosaic virus (Potyviridae, potyvirus)
Bean golden mosaic virus (BGMV) (Geminiviridae, Begomovirus)
Bean leaf roll virus (BLRV) (Luteoviridae, luteovirus)
Bean mild mosaic virus (BMMV) (Tombusviridae, carmovirus)
Bean pod mottle virus (BPMV) (Comoviridae, comovirus)
Bean rugose mosaic virus (BRMV) (Comoviridae, comovirus)
Bean southern mosaic virus (SBMV) (sobemovirus)
Bean yellow vein banding virus (BYVBV) (Umbravirus)
Beet distortion mosaic virus
Beet mild yellowing virus (BMYV) (Luteoviridae, luteovirus)
Beet mosaic virus (BtMV) (Potyviridae, potyvirus)
Beet soil-borne virus (BSBV) (Pomovirus)
Beet western yellows virus (BWYV) (Luteoviridae, luteovirus)
Beet yellows virus (BYV) (Closteroviridae, closterovirus)
Beet yellow stunt virus (BYSV) (Closteroviridae, closterovirus)
Beet curly top virus (BCTV) (Geminiviridae, Curtomovirus)
Beet leaf curl virus (BLCV) (Rhabdoviridae)
Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) (Benyvirus)
Belladonna mottle virus (BeMV) (Tymovirus)
Bermuda grass etched-line virus (BELV) (Marafivirus)
Bhendi yellow vein mosaic virus (BYVMV) (Geminiviridae, Begomovirus)
Bidens mosaic virus (BiMV) (Potyviridae, potyvirus)
Bidens mottle virus (BiMoV) (Potyviridae, potyvirus)
Black raspberry latent ilarvirus
Black raspberry necrosis virus (BRNV)
Blackcurrant reversion associated virus (BRAV) (Comoviridae, Nepovirus)
Blueberry leaf mottle virus (BLMoV) (Comoviridae, Nepovirus)
Blueberry necrotic shock virus (BIShV) (ilarvirus)
Blueberry red ringspot virus (BRRV) (Caulimoviridae, caulimovirus)
Blueberry scorch virus (BBScV) (carlavirus)
Blueberry shoestring virus (BSSV) (sobemovirus)

- 계 속(바이러스, 바이로이드) -

Broad bean B virus
Broad bean necrosis virus (BBNV) (Pomovirus)
Broad bean severe chlorosis virus (Closteroviridae, closterovirus)
Broad bean stain virus(BBSV) (Comoviridae, comovirus)
Broad bean true mosaic virus (BBTMV) (Comoviridae, comovirus)
Broad bean wilt virusd (BBWV) (Comoviridae, fabavirus)
Broad bean yellow ringspot virus
Broad bean yellow vein virus (Rhabdoviridae, cytorhabdovirus)
Broccoli necrotic yellows virus (BNYV) (Rhabdoviridae, cytorhabdovirus)
Brome mosaic virus (BMV) (Bromoviridae, bromovirus)
Brome streak mosaic virus (BrStMV) (Potyviridae, Tritimovirus)
Burdock mosaic virus
Burdock mottle virus
Burdock yellows virus (BuYV) (Closteroviridae, closterovirus)
Cacao necrosis virus (CNV) (Comoviridae, nepovirus)
Cacao swollen shoot virus (CSSV) (Caulimoviridae, badnavirus)
Cacao yellow mosaic virus (CYMV) (Tymovirus)
Cactus virus (CV-2) (Carlavirus)
Canna yellow mottle VIRUS (CaYMV) (Caulimoviridae, badnavirus)
Caper latent virus (CapLV) (Carlavirus)
Cardamine chlorotic fleck virus (CCFV) (Tombusviridae, carmovirus)
Cardamom mosaic virus (CdMV) (Potyviridae, potyvirus)
Carnation cryptic virus 1(CCV-1) (Partitiviridae, alphacryptovirus)
Carnation etched ring virus (CERV) (Cualimoviridae, caulimovirus)
Carnation Italian ringspot virus (CIRV) (Tombusviridae, tombusvirus)
Carnation latent virus (CLV) (Carlavirus)
Carnation mottle virus (CarMV) (Carmovirus)
Carnation necrotic fleck virus (CNFV) (Clostreoviridae, closterovirus)
Carnation ringspot virus (CRSV) (Tombusviridae, dianthovirus)
Carnation vein mottle virus (CVMoV) (Potyviridae, potyvirus)
Carrot latent virus (CtLV) (Rhabdoviridae, nucleorhabdovirus)
Carrot mottle mimic virus (CmoMV) (Umbravirus)
Carrot mottle virus (CMoV) (Umbravirus)
Carrot red leaf virus (CtRLV) (Luteoviridae, luteovirus)
Carrot temperate virus 1 (CteV-1) (Partitiviridae, alphacryptovirus)
Carrot temperate virus 2 (CteV-2) (Partitiviridae, betacryptovirus)
Carrot temperate virus 3 (CteV-3) (Partitiviridae, alphacryptovirus)
Carrot temperate virus 4 (CteV-4) (Partitiviridae, alphacryptovirus)
Carrot thin leaf virus (CTLV) (Potyviridae, potyvirus)
Cowpea chlorotic mottle virus (CCMV) (Bromoviridae, Bromovirus)
Cowpea golden mosaic virus (CPGMV) (Geminiviridae, Begomovirus)
Cowpea green vein-banding virus (CGVBV) (Potyviridae, Potyvirus)
Cowpea mosaic virus (CPMV) (Comoviridae, Comovirus)
Cowpea rugose mosaic virus (CPRMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Cowpea severe mosaic virus (CPSMV) (Comoviridae, Comovirus)

- 계 속(바이러스, 바이로이드) -

Cowpea stunt virus (Luteovirus)
Cassava African mosaic virus (ACMV) (Geminiviridae, bigeminivirus)
Cassava green mottle virus (CaGMV) (Comoviridae, nepovirus)
Cassava Indian mosaic virus (ICMV) (Geminiviridae, bigeminivirus)
Cassava Ivorian bacilliform virus (CsIBV) (Ourmiavirus)
Cassava virus X (CsVX) (Potexvirus)
Cassia mosaic virus
Cassia ringspot virus
Cassia yellow blotch virus(CYBV)(Bromoviridae, bromovirus)
Cassia yellow spot virus(CasYSV)(Potyviridae, potyvirus)
Cauliflower mosaic virus(CaMV)(Caulimoviridae, potyvirus)
Celery mosaic virus(CeMV)(Potyviridae, potivirus)
Cereal northern mosaic virus(NCMV)(cytorhabdovirus)
Cassava brown streak virus(CsBSV)(Potyviridae, Ipomovirus)
Cassava common mosaic virus(CsCMV)(Potexvirus)
Cereal chlorotic mosaic virus(CCMoV)(Rhabdoviridae)
Cherry green ring mottle virus(CGRMV)(Foveavirus)
Cherry leaf roll virus(CLRV)(Comoviridae, Nepovirus)
Cherry mottle leaf virus(CMLV)(Trichovirus)
Cherry rasp leaf virus(CRLV)(Comoviridae, Nepovirus)
Cherry virus A(CVA)(Capillovirus)
Chickpea bushy dwarf virus(CpBDV)(Potyviridae, potyvirus)
Chickpea distortion mosaic virus(Potyviridae, potyvirus)
Chicory virus(ChvX)(potexvirus)
Chicory yellow mottle virus(ChyMV)(Comoviridae, nepovirus)
Chino del tomate virus(CdTV)(Geminiviridae, bigeminivirus)
Chloris striate mosaic virus (CSMV) (Geminiviridae, monogeminivirus)
Chrysanthemum virus B (CVB) (Carlavirus)
Citrus blight disease
Citrus leprosis virus (CiLV) (Rhabdoviridae)
Citrus yellow mosaic virus (CiYMV) (Caulimoviridae, Badnavirus)
Citrus leaf rugose virus (CiLRV) (Rhabdoviridae, ilarvirus)
Citrus ringspot virus
Citrus sudden death-associated virus ICSD-associated virus) (Marafivirus, Tymoviridae)
Citrus variegation virus (CVV) (Bromoviridae, ilarvirus)
Clitoria yellow vein virus (CYVV) (Tymovirus)
Clover mild mosaic virus
Clover wound tumor virus (WTV) (Phytoreovirus)
Clover yellow mosaic virus (CIYMV) (potexvirus)
Clover yellows virus (CYV) (Closteroviridae, closterovirus)
Clover yellow vein virus (CIYVV) (Potyviridae, potyvirus)
Cocksfoot mottle virus (CoMV) (Sobemovirus)
Coconut foliar decay virus (CFDV) (Nanavirus)
Commelina diffusa virus (Potyviridae, potyvirus)

- 계 속(바이러스, 바이로이드) -

Commelina mosaic virus (ComMV) (Potyviridae, potyvirus)
Commelina virus X (ComVX) (potexvirus)
Commelina yellow mottle virus (ComYMV) (Caulimoviridae, badnavirus)
Cocksfoot mild mosaic virus (CoMV) (Sobemovirus)
Cocoa mottle leaf virus
Cocoa necrosis virus (CoNV) (Comoviridae, Nepovirus)
Cocoa swollen shoot virus (CSSV) (Caulimoviridae, Badnavirus)
Cocoa yellow mosaic virus
Colombian datura virus (CDV) (Potyviridae, Potyvirus)
Coriander feathery red vein virus (CFRVV) (Rhabdoviridae, nucleorhabdovirus)
Cotton leaf curl virus (CLCuV) (Geminiviridae, Begomovirus)
Cotton leaf crumple virus (CLCrV) (Geminiviridae, bigeminivirus)
Cowpea mild mottle virus (CPMMV) (Carlavirus)
Crimson clover latent virus (CCLV) (Comoviridae, nepovirus)
Crinum mosaic virus (CriMV) (Potyviridae, potyvirus)
Croton yellow vein mosaic virus (CYVMV) (Geminiviridae, bigeminivirus)
Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) (Tobamovirus)
Cucumber leaf spot virus (CLSV) (Tombusviridae, carmovirus)
Cucumber necrosis virus (CuNV) (Tombusviridae, tombusvirus)
Cucumber soil-borne virus (CuSBV) (Tombusviridae, carmovirus)
Cucumber vein yellowing virus (CVYV)
Cucurbit chlorotic yellow virus (CCYC) (Closteroviridae, Crinivirus)
Cycas necrotic stunt virus (CNSV) (Comoviridae, nepovirus)
Cymbidium ringspot virus (CymRSV) (Tombusviridae, tombusvirus)
Cynodon chlorotic streak virus
Cynosurus mottle virus (CnMoV) (Sobemovirus)
Dahlia mosaic virus (DMV) (Caulimoviridae, caulimovirus)
Dandelion latent virus (DaLV) (Carlavirus)
Dandelion yellow mosaic virus (DaYMV) (Sequiviridae, sequivirus)
Daphne virus X (DVX) (Potexvirus)
Daphne virus Y (DVY) (Potyviridae, potyvirus)
Datura Colombian virus (CDV) (Potyviridae, potyvirus)
Datura distortion mosaic virus (DDMV) (Potyviridae, potyvirus)
Datura necrosis virus (DNV) (Potyviridae, potyvirus)
Datura shoestring virus (DSTV) (Potyviridae, potyvirus)
Datura yellow vein virus (DYVV) (Rhabdoviridae, nucleorhabdovirus)
Datura distortion virus
Datura enation mosaic virus
Dendrobium mosaic virus (DeMV) (Potyviridae, potyvirus)
Desmodium mosaic virus (DesMV) (Potyviridae, potyvirus)
Desmodium yellow mottle virus (DYMV) (Tymovirus)
Digitaria streak virus (DSV) (Geminiviridae, monogeminivirus)
Digitaria striate mosaic (DiSMV) (Geminiviridae, monogeminivirus)
Dioscorea alata virus (Potyviridae, potyvirus)

- 계 속(바이러스, 바이로이드) -

Dioscorea bacilliform virus (DBV) (Caulimoviridae, badnavirus)
Dioscorea green banding mosaic virus (Potyviridae, potyvirus)
Dodonaea yellows-associated virus
Dolichos yellow mosaic virus (DoMYV) (Geminiviridae, bigeminivirus)
Dulcamara mottle virus (DuMV) (Tymovirus)
Eggplant green mosaic virus (EGMV) (Potyviridae, potyvirus)
Eggplant mottled dwarf virus (EMDV) (Rhabdoviridae, nucleorhabdovirus)
Elderberry virus (EV) (Carlavirus 1)
Epirus cherry virus (EpCV) (Ourmiavirus)
Erysimum latent virus (ErLV) (Tymovirus)
Echinochloa ragged stunt virus (ERSV) (Reoviridae, Oryzavirus)
Elm mottle virus (EMoV) (Bromoviridae, Ilarvirus)
European wheat striate mosaic virus (EWSMV) (Tenuivirus)
Euphorbia mosaic virus (EuMV) (Geminiviridae, bigeminivirus)
Euphorbia ringspot virus (EuRV) (Potyviridae, potyvirus)
Faba bean necrotic yellows virus (FBNYV) (Nanovirus)
Festuca leaf streak virus (FLSV) (Rhabdoviridae, cytorhabdovirus)
Fig virus S (FVS) (Carlavirus)
Figwort mosaic virus (FMV) (Caulimoviridae, caulimovirus)
Foxtail mosaic virus (FoMV) (Potexvirus)
Frangipani mosaic virus (FrMV) (Tobamovirus)
French bean mosaic virus
Freesia leaf necrosis virus (FLNV) (Varicosavirus)
Freesia mosaic virus (FreMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Galinsoga mosaic virus (GaMV) (Tombusviridae, carmovirus)
Glycine mosaic virus (GMV) (Comoviridae, Comovirus)
Grapevine Algerian latent virus (GALV) (Tombusviridae, Tombusvirus)
Grapevine asteroid mosaic virus
Grapevine berry inner necrosis virus (GINV) (Trichovirus)
Grapevine Bulgarian latent virus (GBLV) (Comoviridae, Nepovirus)
Grapevine chrome mosaic virus (GCMV) (Comoviridae, Nepovirus)
Grapevine stem pitting associated closterovirus (Closteroviridae, Closterovirus)
Grapevine Tunisian ringspot virus (GTRSV) (Comoviridae, Nepovirus)
Grapevine fanleaf virus (GFLV) (Comoviridae, nepovirus)
Grapevine fleck virus (GFKV)
Grapevine stunt virus
Grapevine vein necrosis virus
Grapevine virus B (GVB) (Vitivirus, Flexiviridae)
Groundnut chlorotic leaf streak virus
Groundnut chlorotic spotting virus
Groundnut rosette assistor virus (GRAV) (Luteoviridae, Enamovirus)
Groundnut rosette virus (GRV) (Umbravirus)
Groundnut eyespot virus (GEV) (Potyviridae, Potyvirus)
Guar symptomless virus (GSLV) (Potyviridae, Potyvirus)
Guar top necrosis virus

- 계 속(바이러스, 바이로이드) -

Guinea grass mosaic virus (GGMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Helenium virus S (HVS) (Carlavirus)
Helenium virus Y (HVY) (Potyviridae, Potyvirus)
Henbane mosaic virus (HBMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Heracleum latent virus (HLV) (Vitivirus)
Hibiscus latent ringspot virus (HLRSV) (Comoviridae, nepovirus)
Hibiscus chlorotic ringspot virus (HCRSV) (Tombusviridae, Carmovirus)
Hippeastrum mosaic virus
Honeysuckle latent virus (LnLV) (Carlavirus)
Hop American latent (AHLV) (Carlavirus)
Hop latent virus (HpLV) (Carlavirus)
Hop mosaic virus (HpMV) (Carlavirus)
Hop trefoil cryptic virus 1 (HTCV-1) (Partitiviridae, alphacryptovirus)
Hop trefoil cryptic virus 2 (HTCV-2) (Partitiviridae, betacryptovirus)
Hop trefoil cryptic virus 3 (HTCV-3) (Partitiviridae, alphacryptovirus)
Hop stunt viriod (HpSVD) (Hostuviroid, Pospiviroidae)
Hordeum mosaic virus (HoMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Humulus japonicus virus (HJV) (Bromoviridae, ilarvirus)
Hyacinth mosaic virus (HyaMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Hydrangea mosaic virus (HdMV) (Bromoviridae, ilarvirus)
Hydrangea ringspot virus (HRSV) (Potexvirus)
Horsegram yellow mosaic virus (HgYMV) (Geminiviridae, Begomovirus)
Iris fulva mosaic virus (IFMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Iris Japanese necrotic ring virus
Iris mild mosaic virus (IMMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Iris severe mosaic virus (ISMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Impatiens necrotic spot virus (INSV) (Bunyaviridae, Tospovirus)
Indian peanut clump virus (IPCV) (Pecluvirus)
Indonesian soybean dwarf virus (ISDV) (Luteoviridae, Enamovirus)
Iranian maize mosaic virus
Jatropha mosaic virus (JMV) (Geminiviridae, bigeminivirus)
Johnsongrass mosaic (JGMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Kalanchoe isometric virus
Kalanchoe latent virus (KLV) (Carlavirus)
Kalanchoe top-spotting virus (KTSV) (Caulimoviridae, badnavirus)
Kennedy yellow mosaic virus (KYMV) (Tymovirus)
Kennedy virus Y (KVY) (Potyviridae, Potyvirus)
Kyuri green mottle mosaic virus (KGMMV) (Tobamovirus)
Konjac mosaic virus (KoMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Kober stem grooving
Lamium mild mottle virus (LMMV) (Comoviridae, fabavirus)
Lato River virus (LRV) (Tombusviridae, tombusvirus)
Leek yellow stripe virus (LYSV) (Potyviridae, potyvirus)
Lettuce big-vein virus (LBVV) (Varicosavirus)
Lettuce mosaic virus (LMV) (Potyviridae, potyvirus)
Lettuce necrotic yellows virus (LNYV) (Rhabdoviridae, cytorhabdovirus)

- 계 속(바이러스, 바이로이드) -

Lettuce speckles mottle virus (LSMV) (Umbravirus)
Lilac chlorotic leafspot virus (LCLV) (Capillovirus)
Lilac mottle virus (LiMV) (Carlavirus)
Lilac ring mottle virus (LRMV) (Bromoviridae, ilarvirus)
Lily mottle virus (LMoV) (Potyviridae, potyvirus)
Lily virus X (LVX) (Potexvirus)
Lettuce infectious yellows virus (LIYV) (Closteroviridae, Crinivirus)
Limabean golden mosaic virus (LGMV) (Geminiviridae, Begomovirus)
Little cherry virus (LChV) (Closteroviridae, Closterovirus)
LN33 stem grooving
Lucerne Australian symptomless virus (LASV) (Comoviridae, Nepovirus)
Lucerne vein yellowing virus
Lucerne transient streak virus (LTSV) (Sobemovirus)
Lychnis ringspot virus (LRSV) (Hordeivirus)
Maclura mosaic virus (MacMV) (Potyviridae, macluravirus)
Maize chlorotic dwarf virus (MCDV) (Sequiviridae, waikavirus)
Maize chlorotic mottle virus (MCMV) (Tombusviridae, machlomovirus)
Maize dwarf mosaic virus (MDMV) (Potyviridae, potyvirus)
Maize line virus
Maize mosaic virus (MMV) (Rhabdoviridae, nucleorhabdovirus)
Maize rayado fino virus (MRFV) (Marafivirus)
Maize white line mosaic virus (MWLMV)
Maize mottle/chlorotic stunt virus
Maize rough dwarf virus (MRDV) (Reoviridae, Fijivirus)
Maize streak virus (MSV) (Geminiviridae, Mastrevirus)
Malvastrum mottle virus
Malva vein clearing virus (MVCV) (Potyviridae, potyvirus)
Marigold mottle virus (MaMoV) (Potyviridae, potyvirus)
Melandrium yellow fleck virus (MYFV) (Bromoviridae, bromovirus)
Melon leaf curl virus(MLCV) (Geminiviridae, bigeminivirus)
Melon necrotic spot virus (MNSV) (Tombusviridae, carmovirus)
Melon Ourmia virus (OuMV) (Ourmiavirus)
Melon rugose mosaic virus (MRMV) (Tymovirus)
Milk vetch dwarf virus (MDV) (Nanovirus)
Mimosa mosaic virus
Mirabilis mosaic virus (MiMV) (Caulimovirus)
Miscanthus streak virus (MiSV) (Geminiviridae, monogeminivirus)
Mulberry latent virus (MLV) (Carlavirus)
Mulberry ringspot virus (MRSV) (Comoviridae, nepovirus)
Mung bean yellow mosaic virus (MYMV) (Geminiviridae, bigeminivirus)
Muskmelon vein necrosis virus (MuVNV) (Carlavirus)
Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV) (Comoviridae, nepovirus)
Narcissus latent virus (NLV) (Potyviridae, macluravirus)
Narcissus mosaic virus (NMV) (Potexvirus)
Narcissus yellow stripe virus (Potyviridae, potyvirus)
Natsudaikai dwarf virus (NDV) (Sadwavirus)
Neckar River virus (NRV) (Tombusviridae, tombusvirus)

- 계 속(바이러스, 바이로이드) -

Nerine latent virus (NeLV) (Carlavirus)
Nerine virus (NV) (Potyviridae, potyvirus)
Nerine virus X(NVX) (Potexvirus)
Northern cereal mosaic virus (NCMV) (Rhabdoviridae, Cytorhabdovirus)
Oak ringspot virus
Oat blue dwarf virus (OBDV) (Marafivirus)
Oat golden stripe virus (OGSV) (Furovirus)
Oat mosaic virus (OMV) (Potyviridae, bymovirus)
Oat necrotic mottle virus (ONMV) (Potyviridae, rymovirus)
Oat red streak mosaic virus
Oat sterile dwarf virus (OSDV) (Reoviridae, Fijivirus)
Okra leaf-curl virus(OLCV) (Geminivirus, bigeminivirus)
Okra mosaic virus (OkMV) (Tymovirus)
Olive latent ringspot virus (OLRSV) (Comoviridae, nepovirus)
Ononis yellow mosaic virus (OYMV) (Tymovirus)
Opuntia Sammons' virus (SOV) (Tobamovirus)
Ornithogalum mosaic virus
Pangola stunt virus (PaSV) (Reoviridae, Fijivirus)
Panicum streak virus (PanSV) (Geminiviridae, monogeminivirus)
Papaya leaf curl virus (PaLCuV) (Begomovirus, Geminiviridae)
Papaya meleira virus (PMeV)
Papaya mosaic virus (PapMV) (Potexvirus, Flexiviridae)
Paprika mild mottle virus (PaMMV) (Tobamovirus)
Parietaria mottle virus (PmoV) (Bromoviridae, ilarvirus)
Parsnip leafcurl virus
Parsnip mosaic virus (ParMV)
Parsnip yellow fleck virus (PYFV) (Sequiviridae, sequivirus)
Paspalum striate mosaic virus (PSMV) (Geminiviridae, monogeminivirus)
Passiflora latent virus (PLV)(Carlavirus)
Passiflora South African virus (Potyviridae, potyvirus)
Passiflora ringspot virus (PFRSV) (Potyviridae, potyvirus)
Passionfruit woodiness virus (PWV) (Potyviridae, potyvirus)
Passionfruit yellow mosaic virus (PaYMV)(Tymovirus)
Patchouli mosaic virus (Potyviridae, potyvirus)
Pea early browning virus (PEBV) (Tobravirus)
Pea enation mosaic virus-1 (PEMV-1) (Luteovirus)
Pea enation mosaic virus-2 (PEMV-2) (Umbravirus)
Pea mild mosaic virus (PmiMV) (Comoviridae, comovirus)
Pea mosaic virus (Potyviridae, potyvirus)
Peanut chlorotic streak virus (PCSV) (Caulimoviridae, caulimovirus)
Peanut green mosaic virus (Potyviridae, potyvirus)
Peanut stunt virus (PSV) (Bromoviridae, cucumovirus)
Peanut yellow spot virus (PeYMV) (Tospovirus)
Peach American mosaic virus
Peach mosaic virus (PMV) (Trichovirus)

- 계 속(바이러스, 바이로이드) -

Peach rosette mosaic virus (PRMV) (Comoviridae, Nepovirus)
Peanut clump virus (PCV) (Pecluvirus)
Pear blister canker viroid (PBCVd) (Pospiviroidae, Apscaviriod)
Pear necrotic spot virus
Pepino mosaic virus (PepMV) (Flexiviridae, Potexvirus)
Pineapple bacilliform virus (PBV) (Badnavirus, Caulimoviridae)
Pineapple mealybug wilt-associated virus-1 (PMWaV-1) (Ampelovirus, Closteroviridae)
Pineapple mealybug wilt-associated virus-2 (PMWaV-2) (Ampelovirus, Closteroviridae)
Plantago asiatica mosaic virus
Plum American line pattern virus (APLPV) (Harvirus, Bromoviridae)
Plum bark split virus
Plum pox virus (PPV) (Potyviridae, Potyvirus)
Plum rusty blotch
Potato black ringspot virus (PBRSV) (Comoviridae, Nepovirus)
Potato deforming mosaic virus
Potato mop-top virus (PMTV) (Pomovirus)
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) (Pospiviroidae, Pospiviroid)
Potato virus T (PVT) (Trichovirus)
Potato virus U (PVU) (Comoviridae, Nepovirus)
Potato virus V (PVV) (Potyviridae, Potyvirus)
Potato yellow dwarf virus (PYDV) (Rhabdoviridae, Nucleorhabdovirus)
Potato yellow vein virus (PYVV) (Closteroviridae, Crinivirus)
Potato yellowing virus
Prune dwarf virus (PDV) (Bromoviridae, Ilarvirus)
Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) (Bromoviridae, Ilarvirus)
Raspberry leaf curl virus
Raspberry ringspot virus (RpRSV) (Comoviridae, Nepovirus)
Red clover mottle virus (RCMV) (Comoviridae, Comovirus)
Rice gall dwarf virus (RGDV) (Reoviridae, Phytoreovirus)
Rice tungro bacilliform virus (RTBV) (Caulimoviridae, Rice tungro bacilliform-like virus)
Rice tungro spherical virus (RTSV) (Sequiviridae, Waikavirus)
Rice yellow mottle virus (RYMV) (Sobemovirus)
Rupestris stem pitting-associated virus (Foveavirus, Flexiviridae)
Squash leaf curl virus (SLCV) (Geminiviridae, Begomovirus)
Squash mosaic virus (SqMV) (Comoviridae, Comovirus)
Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) (Sadwavirus)
Strawberry veinbanding virus (SVBV) (Caulimoviridae, Caulimovirus)
Sugarcane yellow leaf virus (ScYLV) (Polerovirus, Luteoviridae)
Tomato black ring virus (TBRV) (Comoviridae, Nepovirus)
Tobacco rattle virus (TRV) (Tobravirus)
Tobacco ringspot virus (TRSV) (Comoviridae, Nepovirus)
Tobacco mosaic virus (TMV) (Tobamovirus)
Tobacco necrosis virus
Tobacco streak virus (TSV) (Ilarvirus, Bromoviridae)

- 제 속(바이러스, 바이로이드) -

Tomato bushy stunt virus (TBSV) (Tombusvirus, Tombusviridae)
Tomato mottle virus (ToMoV) (Geminiviridae, Begomovirus)
Tomato ringspot virus (ToRSV) (Comoviridae, Nepovirus)
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) (Geminiviridae, Begomovirus)
Tulare apple mosaic virus (TAMV) (Ilarvirus, Bromoviridae)
Tulip breaking virus
Ullucus virus C (UVC)(Comoviridae, comovirus)
Ullucus mild mottle virus (UMMV) (Tobamovirus)
Ullucus mosaic virus (UMV) (Potyviridae, potyvirus)
Urd bean leaf crinkle virus
Vallota mosaic virus (ValMV) (Potyviridae, potyvirus)
Vanilla mosaic virus (VanMV) (Potyviridae, potyvirus)
Vanilla necrosis virus (Potyviridae, potyvirus)
Velvet tobacco mottle virus (VTMoV) (Sobemovirus)
Viola mottle virus (VMV) (Potexvirus)
Voandzeia distortion mosaic virus (Potyviridae, potyvirus)
Voandzeia necrotic mosaic virus (VNMV) (Tymovirus)
Watercress yellow spot virus (WYSV)
Watermelon chlorotic stunt virus (WmCSV) (Geminiviridae, bigeminivirus)
Watermelon curly mottle virus (WmCMV) (Geminiviridae, bigeminivirus)
Watermelon mosaic virus 2 (WMV-2) (Potyviridae, potyvirus)
Wheat American striate mosaic virus (WASMV) (Rhabdovirus, nucleorhabdovirus)
Wheat yellow leaf virus (WYLV) (Closteroviridae, Closterovirus)
Wheat dwarf virus (WDV) (Geminiviridae, monogeminivirus)
Wheat soil-borne mosaic virus (SBWMV) (Furovirus)
Wheat streak mosaic virus (WSMV) (Potyviridae, rymovirus)
Wheat spindle streak mosaic virus (WSSMV) (Potyviridae, bymovirus)
Wheat yellow mosaic virus (WYMV) (Potyviridae, bymovirus)
White clover mosaic virus(WCLMV) (Potexvirus)
Wild cucumber mosaic virus (WCMV) (Tymovirus)
Wild potato mosaic (WPMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Wineberry latent virus (WLV)
Wisteria vein mosaic virus (WVMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Yam mosaic virus (YMV) (Potyviridae, Potyvirus)
Zucchini yellow fleck virus (ZYFV) (Potyviridae, Potyvirus)

※ 위 바이러스의 매개체 또한 규제 대상 임

바. 파이토플라즈마(Phytoplasma, 93종)

Alder yellows AIY	Elm witches'-broom ULW
Almond witches broom phytoplasma	Lilac witches'-broom LiWB
American aster yellows AAY	Loofah witches'-broom LfWB
Annual blue grass white leaf ABGWL	Maize bushy stunt MBS
Apple proliferation AT, AP-A	Marguerite yellows MY
Apple proliferation phytoplasma AP	Maryland aster yellows AY1
Ash yellows AshY	Mexican periwinkle virescence MPV
Aster yellows AY	Michigan aster yellows MIAY
Australian grapevine yellows AUSGY	Milkweed yellows MWY (MW1)
Bermudagrass white leaf BGWL	Mitsuba witches'-broom JHW
Black alder witches'-broom BAWB	Mulberry dwarf MD
Blueberry stunt BBS1 BBS3	New Jersey aster yellows NJAY
Bois noir BN	Oklahoma aster yellows OKAY1
Canadian peach X phytoplasma CX	Onion yellows OAY (OA)
Candidatus Liberibacter americanus Lam	Passion fruit proliferation phytoplasma
Candidatus Phytoplasma asteris	Peach rosette phytoplasma
Candidatus Phytoplasma australiense	Peach yellow leaf roll PYLR
Candidatus Phytoplasma caricae	Pear decline PD
Celery yellows CelY	Pecan bunch PB
Cherry lethal yellows CLY	Periwinkle little leaf CN1
Chrysanthemum yellows CY	Periwinkle virescence VR, BLTVA
Clover phyllody CPh	Phormium yellow leaf PYL
Clover proliferation CP	Plum leptonecrosis PLN
Clover yellow edge CYE	Potato yellows
Coconut lethal yellows LY, LY3	Primula yellows PY
Dwarf aster yellows DAY	Ranunculus phyllody RPh
Eastern aster yellows NAY	Rice yellow dwarf RYD
Elm yellows	Rubus stunt RS
Eucalyptus little leaf	Spiraea stunt SP1
European aster yellows EAY	Stolbur STOL
European stone fruit yellows phytoplasma	Strawberry green petal
European stone fruit yellows PPER	Sugarcane grassy shoot SCGS
Faba bean phyllody FBP	Sugarcane white leaf phytoplasma
Flavescence doree	Sunhemp witches'-broom SUNHP
Garland chrysanthemum WB GCW	Sweet potato little leaf SPLL
Gentian witches'-broom GW	Sweet potato witches'-broom SPWB
Gladiolus yellows GLY	Tanzanian coconut lethal decline LDT
Goldenrod yellows GRY (GR1)	Tomato big bud
Grapevine yellows	Tomato yellows TY
Grey dogwood witches'-broom GD1	Tsuwabuki witches'-broom TW
Hydrangea phyllody HyPH1	Vaccinium witches'-broom VAC
Hydrangea virescence	Walnut witches'-broom WWB
Ipomoea witches'-broom IOB	Western aster yellows SAY, TLAY
Jujube witches'-broom JWB	Witches'-broom of lime WBDL
Leafhopper-borne BVK	X-disease
Eggplant dwarf ED	Yucatan coconut lethal decline LDY

사. 선충류(54종)

<i>Anguina tritici</i>	<i>Heterodera goettingiana</i>	<i>Paratrichodorus porosus</i>
<i>Aphelenchoides aradhidis</i>	<i>Heterodera sacchari</i>	<i>Pratylenchus convallariae</i>
<i>Aphelenchoides bicaudatus</i>	<i>Heterodera schachtii</i>	<i>Pratylenchus goodeyi</i>
<i>Aphelenchoides fragariae</i>	<i>Heterodera zeae</i>	<i>Pratylenchus indicus</i>
<i>Aphelenchoides goodeyi</i>	<i>Hirschmanniella gracilis</i>	<i>Pratylenchus laticauda</i>
<i>Aphelenchoides rizemabosi</i>	<i>Hirschmanniella imamuri</i>	<i>Pratylenchus penetrans</i>
<i>Aphelenchoides suipingensis</i>	<i>Hirschmanniella magna</i>	<i>Pratylenchus pratensis</i>
<i>Belonolaimus gracilis</i>	<i>Hirschmanniella miticausa</i>	<i>Pratylenchus vulnus</i>
<i>Belonolaimus longicaudatus</i>	<i>Hirschmanniella spinicaudata</i>	<i>Pratylenchus zeae</i>
<i>Bursaphelenchus muconatus</i>	<i>Hoploaimus</i> spp.	<i>Radopholus citri</i>
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	<i>Longidorus elongatus</i>	<i>Rhadinaphelenchus cocophilus</i>
<i>Ditylenchus triformis</i>	<i>Longidorus jiangsuensis</i>	<i>Scutellonema bradyi</i>
<i>Dolichodorus heterocephalus</i>	<i>Meloidogyne fugianensis</i>	<i>Trichodorus</i> spp.
<i>Globodera pallida</i>	<i>Meloidogyne kongi</i>	<i>Xiphinema bricolense</i>
<i>Globodera tabacum</i>	<i>Meloidogyne lini</i>	<i>Xiphinema californicum</i>
<i>Hemicycliophora arenaria</i>	<i>Nacobbus aberrans</i>	<i>Xiphinema diversicaudatum</i>
<i>Hemicycliophora nudata</i>	<i>Paralongidorus</i> spp.	<i>Xiphinema humaniense</i>
<i>Heterodera glycines</i>	<i>Paratrichodorus minor</i>	<i>Xiphinema index</i>

아. 잡초(222종)

<i>Abelmoschus ficulneus</i> (L.) Wight & Arn.	<i>Anthocephalus chinensis</i> Walp.
<i>Acacia podalyrifolia</i>	<i>Ardisia elliptica</i> Thunb.
<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.	<i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav.
<i>Achnatherum calamagrostis</i> P.Beauv.	<i>Aster subulatus</i> Michx.
<i>Ageratum mexicanum</i> = <i>A.houstonianum</i>	<i>Atriplex hortensis</i>
<i>Agropyron repens</i> (L.) Beauv. (syn. <i>Triticum repens</i> L.)	<i>Avena sterilis</i> L.
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	<i>Bidensferulifolia</i> = <i>B.aurea</i>
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	<i>Bidens pilosa</i> L.
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart) Griseb.	<i>Bidens triplinervia</i>
<i>Amaranthus blitum</i> L.	<i>Boerhavia erecta</i> L.
<i>Amaranthus dubius</i> Mart.	<i>Bowiea volubilis</i> Harv.ex Hook.f.
<i>Amaranthus gracilis</i> Desf.	<i>Brachiaria eruciformis</i> (J. E. Sm.) Griseb.
<i>Amaranthus graecizans</i> L.	<i>Brachiaia mutica</i> (Forssk) Stapf
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	<i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc.
<i>Amaranthus patulus</i> Bertoloni	<i>Brachiaria sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	<i>Brassica kaber</i> (DC.) L.C.Wheeler var.
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	<i>pinnatifida</i> (Stokes), L.C.Wheeler (syn.
<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	<i>Sinapis arvensis</i> L., <i>Brassica arvensis</i> ,
<i>Ambrosia trifida</i> L.	<i>Brassica kaber</i>)
<i>Ammi majus</i> L.	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch
<i>Ammi visnaga</i>	<i>Bromus secalinus</i> L.
<i>Anthemis cotula</i> L.	<i>Bromus tectorum</i> L.
<i>Andropogon virginicus</i> L.	<i>Cabomba caroliniano</i> Gray

<p> <i>Calamogrostis epigejos</i> (L.) Roth <i>Camelina sativa</i> <i>Campanula cochleariifolia</i> <i>Cannabis sativa</i> <i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. (<i>Lepidium draba</i> L.) <i>Cadiospermum grandiflorum</i> Sw. <i>Carduus nutans</i> L. <i>Carduus pycnocephalus</i> L. <i>Ceanothus americanus</i> L. <i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol. <i>Cecropia peltata</i> L. <i>Centaurea repens</i> L. <i>Centaurea solstitialis</i> L. <i>Centrosema pubescens</i> <i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Schrad. <i>Cerastium arvense</i> L. <i>Chasmanthium latifolium</i> (Michx.) Yates <i>Chasmanthium laxum</i> (L.) Yates <i>Chemopodium album</i> <i>Chenopodium murale</i> L. <i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. <i>Chondrilla juncea</i> L. <i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King&H.Rob. <i>Chrysophullum oliviforme</i> L. <i>Chrysopogon gryllus</i> Trin. <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. <i>Cirsium lanceolatum</i> Hill <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Tenore <i>Cleome monophylla</i> L. <i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don <i>Conium maculatum</i> L. <i>Convolvulus arvensis</i> L. <i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken <i>Cordia macrostachya</i> Roem & Schlucht. <i>Cortaderia selloana</i> (J.A.&J.H. Schultes) Aschers. & Graebn. <i>Crotalaria brevidens</i> <i>Crotalaria deserticola</i> <i>Crotalaria laburnifolia</i> <i>Crotalaria laburnoides</i> <i>Crotalaria lanceolata</i> <i>Crotalaria pallid</i> <i>Crotalaria pistearpa</i> <i>Cryptostegia grandiflora</i> R. Br. <i>Cuscuta campestris</i> Yuncker </p>	<p> <i>Cuscuta monogyna</i> Vahl. <i>Cynodon plectostachyum</i> (Schum.) Pilger. <i>Cynoglossum amabile</i> Stapf & Drummond <i>Cyperus esculentus</i> L. <i>Datura stramonium</i> L. var. <i>chalybaea</i> Koch <i>Dichrostachys cinera</i> (L.) Wight & Arn. <i>Digitaria velutina</i> (Forsk.) Beauv. <i>Digitaria scalarum</i> (Schweinf.) Chiov <i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honckeny <i>Echinochloa pyramidalis</i> (Lam) Hitchc. & A. Chase <i>Echinochloa crus-pavonis</i> (H.B.K.) Schult <i>Echium plantagineum</i> L. <i>Eichhornia vrasripes</i> (Mart) Solms <i>Eleocharis palustris</i> (L.) R. Br. (syn. <i>E. filiculmis</i> Schur.) <i>Elodea canadensis</i> Michx. <i>Emex spinosa</i> (L.) Campdera <i>Equisetum arvense</i> L. <i>Equisetum palustre</i> L. <i>Erigeron karvinskianus</i>=<i>E. mucronatus</i> <i>Eriocaulon cinereum</i> <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L. ex W. Ait. <i>Eucalyptus globule</i> Labill. <i>Euonymus europaeus</i> L. <i>Euphorbia helioscopia</i> L. <i>Euphorbia myrsinites</i> <i>Euphorbia prunifolia</i> Jacq. (syn. <i>E. geniculata</i> Orteg). <i>Fureraea foetida</i> <i>Gaillardia pulchella</i> <i>Galeopsis tetrahit</i> L. <i>Galium aparine</i> L. <i>Geranium molle</i> L. <i>Gladiolus segetum</i> Ker-Gawl. <i>Gynandropsis gynandra</i> (L.) Briq. <i>Hardenbergia comptoniana</i> (Andrews) Benth. <i>Heliotropium europaeum</i> L. <i>Heteropanax fragrans</i> (Roch) Seem <i>Homeria collina</i> <i>Homeria flacid</i> <i>Homeria miniata</i> <i>Homeria ochroleuca</i> <i>Hordeum murinum</i> L. <i>Hypochoeris radicata</i> L. <i>Indigofera amblyantha</i> Craib <i>Ipomoea oenothera</i> </p>
---	---

- 계 속(잡초) -

<p> <i>Jatropha gossypifolia</i> L. var. <i>elegans</i> (Pohl) Muell.-Arg. Muell.-Arg. <i>Juncus bufonius</i> L. <i>Jussiaea repens</i> L. <i>Jussiaea suffruticosa</i> L. <i>Kallstroemia maxima</i> Gray. <i>Lactuca serriola</i> L. <i>Lagarosiphon</i> spp. <i>Lantana camara</i> L. <i>Lagurus ovatus</i> L. <i>Lathyrus aphaca</i> L. <i>Lemna minor</i> L. <i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) Ait.f. <i>Leontodon autumnalis</i> L. <i>Lepidium draba</i> L. <i>Leptospermum seoparium</i> <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de wit <i>Lithospermum arvense</i> L. <i>Lolium temulentum</i> L. <i>Luzulo sylvatica</i> (Huds.) Gaudin <i>Malva parviflora</i> L. <i>Marsilea quadrifolia</i> L. <i>Medicago hispida</i> Gaertn. <i>Melastoma malabathricum</i> L. <i>Medicago hispida</i> Gaertn. <i>Melastoma malabathricum</i> L. <i>Mercurialis annua</i> L. <i>Mertensia virginica</i> (L.) Pers. ex Link <i>Miconia calvescens</i> DC. <i>Mikania micrantha</i> Kunth <i>Mikania scandens</i> (L.) Wild. <i>Mimosa diplotricha</i> C. Wright ex Sauvalle <i>Mimosa pigra</i> L. <i>Miscanthus giganteus</i> kunth <i>Monochoria hastata</i> (L.) Solms <i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC. var. <i>pruriens</i> Cowitch <i>Murdannia nudiflora</i> (L.) Brenan <i>Muscari botryoides</i> <i>Myrica faya</i> Ait. <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc. <i>Myriophyllum brasiliense</i> Camb. <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth <i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. <i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn. </p>	<p> <i>Orlaya grandiflora</i> Hoffm <i>Oryza barthii</i> A. Chev. (syn. <i>O. breviligulata</i> A. Chev. et Roehr.) <i>Oryza officinalis</i> Wall. Ex Watt. <i>Oryza punctata</i> Kotschy ex Steud. <i>Panicum fasciculatum</i> Sw. <i>Panicum maximum</i> Jacq <i>Parthenium hysterophorus</i> L. <i>Passiflora mollissima</i> (H. B. K.) Bailey <i>Passiflora rubra</i> Lam. <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng) Taub. <i>Pennisetum ciliare</i> (L.) Link <i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex Chiov. <i>Pennisetum macrourum</i> Trin. <i>Pennisetum pedicellatum</i> Trin. <i>Pennisetum polystachion</i> (L.) Schult. <i>Pennisetum purpureum</i> Schumach <i>Pennisetum setaceum</i> (Forsk) Chiov. <i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen. <i>Phalaris minor</i> Retz. <i>Phalaris paradoxa</i> L. <i>Pinus pinaster</i> = <i>P. maritima</i> = <i>P. mesogoneensis</i> <i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq) G. Don <i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. <i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabera <i>Poa cita</i> R. Edgar <i>Pontederia rotundifolia</i> L. f. <i>Portulaca oleracea</i> <i>Potamogeton natans</i> L. <i>Quercus gambelii</i> Nutt <i>Radermachera hainamensis</i> Merrill <i>Ranunculus arvensis</i> L. <i>Ranunculus repens</i> L. <i>Raphanus raphanistrum</i> L. (<i>Raphanus arvensis</i> Wallr., <i>Raphanus sylvestris</i> Aschers) <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. <i>Reseda lutea</i> L. <i>Rhodanthe chlorocephala</i> (Turcz) Paul G. Wilson <i>Ribes cereum</i> = <i>R. viscidulum</i> <i>Richardia brasiliensis</i> Gomez <i>Rides roezlii</i> <i>Eosa canina</i> <i>Rubus argutus</i> Link <i>Rubus leucodermis</i> </p>
--	--

- 계 속(잡초) -

<i>Rubus moluccanus</i> L. <i>Rubus parviflorus</i> <i>Rumex pulcher</i> L. <i>Sagittaria sagittifolia</i> L. <i>Sagittaria subulata</i> (L.) Buch. <i>Salsola kali</i> L. <i>Sanvitalia procumhens</i> Lam. <i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees <i>Scirpus grossus</i> L. f. <i>Scirpus maritimus</i> L. <i>Scirpus mucronatus</i> L. <i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth. <i>Sida spinosa</i> L. <i>Silene gallica</i> L. <i>Sinapis arvensis</i> L. <i>Sisymbrium luteum</i> = <i>Hesperis iutea</i> <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. <i>Solanum mauritianum</i> Scopoli <i>Solanum sisymbriifolium</i> = <i>S.sisymbriifolium</i> <i>Solidago canadensis</i> L. <i>Solidago speciosa</i> Nutt. <i>Sophora secundiflora</i> Lag. ex DC. <i>Sorghastrum nutans</i> (L.) Nash <i>Spergula arvensis</i> L. <i>Sporobolus heterolepis</i> (Gray) Gray	<i>Stachytarpheta urticaefolia</i> (Salisb.) Sims <i>Stipa tenacissima</i> L.= <i>Nassella tenuissima</i> (Trin) Barkworth <i>Striga asiatica</i> (L.) O. Ktze. <i>Swainsona formosa</i> (G.don) J.Thompson <i>Tagetes minuta</i> L. <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand-Mazz <i>Taraxacum officinale</i> G.H. Weber ex Wiggers <i>Tecoma stans</i> <i>Thlaspi arvense</i> L. <i>Tibouchina urvilleana</i> (DC) Cogn. <i>Trichachne insulatis</i> (L.) Ness <i>Trisacum dactyloides</i> <i>Typha latifolia</i> L. <i>Ulex europaeus</i> L. <i>Urochloa panicoides</i> Beauv. <i>Urtica dioica</i> L. <i>Urtica urens</i> L. <i>Vallisneria spiralis</i> L. <i>Verbascum blattaria</i> L. <i>Verbascum bombyciferum</i> Heuff. <i>Verbascum olympicum</i> Boiss. <i>Vicia angustifolia</i> L. <i>Xanthium spinosum</i> L. <i>Yucca glauca</i>
--	---

자. 기생성식물(12종)

<i>Aeginetia indica</i> <i>Arceuthobium</i> spp. <i>Arceuthobium americanum</i> <i>Arceuthobium pusillum</i>	<i>Conopholis striga</i> <i>Cuscuta major</i> <i>Cuscuta japonica</i> <i>Cuscuta indicora</i>	<i>Cuscuta planiflora</i> <i>Cuscuta campestris</i> <i>Orobanche</i> spp. <i>Phoradendron</i> spp.
---	--	---

차. 연체동물류(12종)

<i>Achatina achatina</i> <i>Achatina fulica</i> <i>Archachatina degneri</i> <i>Archachatina purpurea</i>	<i>Archachatina ventricosa</i> <i>Bradybaena similaaris</i> <i>Cepaea nemoralis</i> <i>Eobania vermiculata</i>	<i>Helix aspersa</i> <i>Otala lactea</i> <i>Succinea costaricana</i> <i>Theba pisana</i>
---	---	---

카. 병 인자(45종)

<p>African soybean dwarf agent Apple flat limb agent Apple green crinkle agent Apple ringspot agent Apple rosette agent Apple rough bark agent Apple star crack agent Apricot ring pox agent Cherry necrotic rusty mottle agent (CNRMV) Cherry pink fruit agent Cherry rough fruit agent Cherry rusty mottle (European) agent Cherry shourt stem agent Cherry twisted leaf agent Cotton anthocyanosis agent Cotton small leaf agent Euonymus mosaic agents Grapevine Bratislava mosaic agent Grapevine chasselas latent agent Grapevine enation agent Grapevine little leaf agent Grapevine vein mosaic agent Grapevine vein necrosis agent</p>	<p>Hibiscus leaf curl agent Horsechestnut variegation agent Horsechestnut yellow mosaic agent Jasmine variegation agents Ligustrum mosaic agents Maple mosaic agent Maple variegation agent Mountain ash ringspot mosaic agent Mountain ash variegation agent Mulberry mosaic agent Okra mosaic agents Okra yellow leaf curl agent Peach wart agent Pear bud drop agent Pear rough bark agent Pear stony pit agent Quince sooty ringspot agent Quince stunt agent Quince yellow blotch agent Rose wilt agent Sampaguita yellow ringspot mosaic agent Spur cherry agent</p>
---	---

참고 2 주요 종자류에 대한 수출 상대국의 검역요건

1 고추종자

수입국	무감염증명 대상 병해충	일 반 명(기주)
이 란	Pepper mild mottle virus	모자이크병(고추)
	Colletotrichum capsici	
	Tomato black ring virus	
말레이시아	Tomato streak virus	-
	Tomato ring spot virus	등근반점병(백합)
	Arabis mosaic virus	-
방글라데시	Chilli mosaic virus	-
	Anthranenose(Colletotrichum dematium)	탄저병(고추)
인 도	Pepper mild mosaic virus	모자이크병(고추)
	Pepper mild mottle virus	
	Peronospora hyoscyami sp. tabacina	-
	Tomato ring spot virus	등근반점병(백합)
	Tomato black ring virus	-
	Bacterial scab(Xanthomonas vesicatoria) 관련 : Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	세균성점무늬병(고추)
	* SPL CON a) Free from quarantine weeds seed b) Crop inspection and certification for free from pepperviruses viz. mild mosaic and mild mottle, Tomato ring spot virus and Tomato black ring virus	
예 멘	Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis	퀘양병(고추)
	Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	세균성점무늬병(고추)
	Potato spindle tuber viroid	갈죽병(감자)
	Phytophthora capsici	역병 (가지,고추,수박 등)
	Fusarium oxysporium f.sp.lycopersici Race III	시들음병(토마토)
	Colletotrichum cocodes	탄저병(가지,고추 등)
	Tomato bushy stunt virus	-

2 토마토종자

수입국	무감염증명 대상 병해충	일 반 명(기주)
프랑스	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	세균성점무늬병(고추)
	Pepino mosaic virus	-
	Clavibacter michiganensis sub sp. michiganensis	퀘양병(고추)
	Potato spindle tuber viroid	갈죽병(감자)
이태리	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	세균성점무늬병(고추)
	Pepino mosaic virus	-
	Clavibacter michiganensis sub sp. michiganensis	퀘양병(고추)
	Potato spindle tuber viroid	갈죽병(감자)
	Corynebacterium michiganense	
체코	Clavibacter michiganensis sub sp. michiganensis	퀘양병(고추)
	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	세균성점무늬병(고추)
	Potato spindle tuber viroid	갈죽병(감자)
	Pepino mosaic virus	-
방글라데시	Tomato canker caused by Deplodine lycopersici	-
	Bacterial canker caused by Corynebacterium michiganensis 관련 : Corynebacterium michiganensis subsp. michiganensis Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis	퀘양병(고추)
	Tomato bunchy top or potato spindle tuber viroid	갈죽병(감자)
남아공	Fusarium oxysporium f.sp.lycopersici Race III	시들음병(토마토)
	Potato spindle tuber viroid	갈죽병(감자)
	Tomato black ring virus	-
	Tomato ring spot virus	둥근반점병(백합)
이란	Didymella lycopersici	퀘양병(고추)
	Tomato black ring virus	-
	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	세균성점무늬병(고추)
	Arabis mosaic virus	-
모리셔스	Pseudomonas syringe pv. tomato	-
	Xanthomonas vesicatoria 관련 : Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	세균성점무늬병(고추)
	Clavibacter michiganensis sub sp. michiganensis	퀘양병(고추)
	Potato spindle tuber viroid	갈죽병(감자)
	Tomato bushy stunt virus	-
	Pepino mosaic virus	-
	Tomato ring spot virus	둥근반점병(백합)
	Tomato black ring virus	-

수입국	무감염증명 대상 병해충	일 반 명(기주)
인 도	a) Bacterial canker(<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>)	퀘양병(고추)
	b) Bacterial leaf spot(<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>)	-
	c) Bacterial pustule(<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>punctulens</i>)	-
	d) Potato spindle tuber viroid	갈쪽병(감자)
	e) <i>Peronospora hyoscyami</i> pv. <i>tubacina</i>	-
	f) <i>Phoma andigena</i>	-
	g) <i>Verticillium albo-atrum</i>	반쪽시들음병(감자,참깨,토마토,국화)
	i) Pepino mosaic virus	-
	j) Tomato aspermy virus	모자이크병(국화)
	k) Tomato black ring virus	-
	l) Tomato bushy stunt virus	-
	m) Tomato ring spot virus	등근반점병(백합)
	* SPL CON a) Free from quarantine weeds seed b) Crop inspection and certification for free from i) to m)	
	예 멘	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Vesicatoria</i>		세균성점무늬병(고추)
Potato spindle tuber viroid		갈쪽병(감자)
<i>Phytophthora capsici</i>		역병(가지,고추,수박 등)
<i>Fusarium oxysporium</i> f.sp. <i>lycopersici</i> Race III		시들음병(토마토)
<i>Colletotrichum cocodes</i>		탄저병(가지,고추 등)
Tomato bushy stunt virus		-

3 수박종자

수입국	무감염증명 대상 병해충	일 반 명(기주)
인 도	a) Bacterial fruit blotch(<i>Acidovorax avenae</i> sub sp. <i>citrulli</i>)	과실썩음병(수박)
	b) Angular leaf spot(<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>)	세균성점무늬병 (오이,호박)
	c) Soft rot(<i>Xanthomonas melonis</i>)	-
	d) Watermelon viruses viz. chlorotic stunt, curly mottle, cucumber mosaic virus 2 관련 : Water mosaic virus	모자이크병 (박,수박,오이,참외,호박)
	e) <i>Verticillium albo-atrum</i>	반쪽시들음병 (감자,참깨,토마토,국화)
	f) Squash mosaic virus	모자이크병(호박)
	* SPL CON	-
	a) Free from quarantine weeds seed	-
	b) Crop inspection and certification for free from Watermelon viruses viz. chlorotic stunt, curly mottle, mosaic virus, <i>Verticillium albo-atrum</i> , Squash mosaic virus	
이 란	<i>Alternaria cucumerina</i>	
	<i>Didymella bryoniae</i>	덩굴마름병 (수박,오이,참외,호박)
예 멘	Squash mosaic virus	모자이크병(호박)
	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lacrymans</i>	세균성점무늬병 (오이,호박)
	<i>Colletotrichum lagenarium</i> (= <i>Colletotrichum orbiculare</i>)	탄저병 (오이,수박,참외,호박)
모리셔스	<i>Acidovorax avenae</i> sub sp. <i>citrulli</i>	과실썩음병(수박)
	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lacrymans</i>	세균성점무늬병 (오이,호박)
	Squash mosaic virus	모자이크병(호박)
	<i>Xanthomonas melonis</i>	-
대 만	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev. <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> . ※ 재배지검역 사항 부기(“The plants or seeds have been thoroughly inspected during growing season and found free from~)	꽃노랑총채벌레 마늘줄기선충 과실썩음병

4] 오이종자

수입국	무감염증명 대상 병해충	일 반 명(기주)
인 도	Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum(Fusarial wilts)	덩굴썩김병(오이)
	Phomopsis sclerotoides(Black spot)	-
	Septoria cucurbitarum(Septoria leaf spot)	-
	Verticillium albo-atrum	반쪽시들음병 (감자,참깨,토마토,국화)
	Squash mosaic virus	모자이크병(호박)
	* SPL CON a) Free from quarantine weeds seed b) Crop inspection and certification for free from Cucumber seed-bone virus and squash mosaic virus	-
이 란	Cucumber leaf spot virus	
	Arabis mosaic virus	
	Didymella bryoniae	덩굴마름병 (수박,오이,참외,호박)
방글라데시	Black stem rot caused by <i>Mycosphaerella melonis</i> 관련 : <i>didymella bryoniae</i>	덩굴마름병 (수박,오이,참외,호박)
	Cucumber mosaic virus	-
대 만	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev. <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> . ※ 재배지검역 사항 부기(“The plants or seeds have been thoroughly inspected during growing season and found free from~)	꽃노랑총채벌레 마늘줄기선충 과실썩음병

수 호박종자

수입국	무감염증명 대상 병해충	일 반 명(기주)
인 도	Arabis mosaic virus(hop barebine)	
	Zucchini yellow mosaic virus	
	* SPL CON a) Free from quarantine weeds seed	
모리셔스	Pseudomonas syringe pv. lacrymans	세균성점무늬병(오이,호박)
	Squash mosaic virus	모자이크병(호박)
	Acidovorax avenae sub sp. citrulli	과실썩음병(수박)
이 란	Arabis mosaic nepo virus	-
이스라엘	acidovorax avenea 관련 : Acidovorox avenae subsp. citrulli	과실썩음병(호박)
예 멘	Squash mosaic comovirus	-
	Pseudomonas syringe pv. lacrymans	세균성점무늬병(오이,호박)
	Colletotrichum lagenarium(=Colletotrichum orbiculare)	탄저병(오이,수박,참외,호박)
대 만	Frankliniella occidentalis (Pergande) Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev. Acidovorax avenae subsp. citrulli. ※ 재배지검역 사항 부기("The plants or seeds have been thoroughly inspected during growing season and found free from~)	꽃노랑총채벌레 마늘줄기선충 과실썩음병

6 당근종자

수입국	무감염증명 대상 병해충	일 반 명(기주)
인 도	Bacterial blight(Xanthomonas hortorum pv. carotae)	-
	Carrot viruses(mottle dwarf, red leaf and yellow leaf)	-
	* SPL CON a) Free from quarantine weeds seed b) Crop inspection and certification for free from carrot viruses	
모리셔스	Xanthomonas hortorum pv. carotae	-
	Alternaria dauci	검은잎마름병(당근)
	Carrot Viruses(mottle, red leaf and yellow leaf)	--
칠 레	Xanthomonas campestris pv. carotae	--

7 배추·양배추·청경채·꽃양배추종자

수입국	무감염증명 대상 병해충	일 반 명(기주)
인 도	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (bacterial leaf spot)	세균성검은무늬병(무,배추)
	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (Black rot)	검은썩음병(무,배추,양배추)
	<i>Leptosphaeria maculans</i> (black leg)	검은뿌리썩음병(양배추)
	<i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato)	세균성검은무늬병(토마토) 세균성부패병(양배추) 세균성썩음병(상추),무름병 (당근,고추) 세균성갈색줄무늬병(배추)
	* SPL CON a) Free from quarantine weeds seed b) Crop inspection and certification for free from Cucumber seed-bone virus and squash mosaic virus	
모리셔스	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (배추, 양배추)	검은썩음병(무,배추,양배추)
	<i>Leptosphaeria maculans</i> (양배추)	검은뿌리썩음병(양배추)
	<i>Pseudomonas viridiflava</i> (양배추, 청경채)	세균성검은무늬병(토마토) 세균성부패병(양배추) 세균성썩음병(상추),무름병 (당근,고추) 세균성갈색줄무늬병(배추)
	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i>	세균성검은무늬병(무,배추)
예 멘	<i>Alternaria brassicae</i>	검은무늬병((무,양배추,배추)
	<i>Alternaria brassicicola</i>	검은무늬병((무,양배추,배추)
	<i>Phoma lingam</i>	뿌리썩음병(배추,양배추)
	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>	검은썩음병(무,배추,양배추)
인도네시아	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (배추)	세균성검은무늬병(무,배추)
	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringe</i> (배추)	세균성갈색점무늬병(콩,팥 등)
	Turnip mosaic potyvirus(=Turnip mosaic poty virus)(배추)	모자이크병(갓, 무, 배추 등)

8 양파종자

수입국	무감염증명 대상 병해충	일 반 명(기주)
이 란	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	
대 만	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev.	마늘줄기선충

순 무종자

수입국	무감염증명 대상 병해충	일 반 명(기주)
인 도	<i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato)	세균성검은무늬병(토마토) 세균성부패병(양배추) 세균성썩음병(상추),무름병 (당근,고추) 세균성갈색줄무늬병(배추)
	<i>Pleosporum herbarum</i>	
	Radish mosaic virus	
	* SPL CON a) Free from quarantine weeds seed	
모리셔스	<i>Alternaria japonica</i>	검은무늬병(유채,무,배추)
	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>	검은썩음병(무,배추,양배추)
	<i>Pseudomonas viridiflava</i>	세균성검은무늬병(토마토) 세균성부패병(양배추) 세균성썩음병(상추),무름병 (당근,고추) 세균성갈색줄무늬병(배추)
스리랑카	Lettuce mosaic virus	모자이크병(상추)
예 멘	<i>Alternaria brassicae</i>	검은무늬병((무,양배추,배추)
	<i>Alternaria brassicicola</i>	검은무늬병((무,양배추,배추)
	<i>Phoma lingam</i>	뿌리썩음병(배추,양배추)
	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>	검은썩음병(무,배추,양배추)

10 메론종자

수입국	무감염증명 대상 병해충	일 반 명(기주)
이 란	Melon necrotic spot virus	
	<i>Didymella bryoniae</i>	덩굴마름병(수박,오이,참외, 호박)
대 만	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev. <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> . ※ 재배지검역 사항 부기(“The plants or seeds have been thoroughly inspected during growing season and found free from~)	꽃노랑총채벌레 마늘줄기선충 과실썩음병

참고 3 2014년 신선 농산물 수출단지 지정 현황

(단위 : M/T)

품 목	국 가	단지수	참여 농가	재배 면적(ha)	'14년 수출		'13년 수출		대 비 (B/A)
					건 수	수 량(B)	건 수	수 량(A)	
배	미 국	13	1,164	1,394	706	9,689	629	8,551	113
	대 만	79	2,720	3,292	619	9,267	619	9,130	102
	캐나다	6	91	115	25	317	19	255	124
	호 주	4	59	53	10	105	6	55	191
	멕시코	1	1	2	1	6			신규
	소 계	103	4,035	4,856	1,361	19,384	1,273	17,991	108
사 과	대 만	23	1,063	800	71	1,050	110	1,454	72
	미 국	2	32	36	2	23	4	1	2,300
	소 계	25	1,095	836	73	1,073	114	1,455	74
포 도	미 국	5	109	48.4	28	225	21	153	147
	캐나다	1	19	7	1	5	2	16	31
	호 주	2	19	7	6	25	0	0	신규
	뉴질랜드	2	42	21	7	36	3	21	171
	소 계	10	189	83.4	42	291	26	190	153
감 귤	미 국	10	-	-	37	628	39	529	119
	영 국	10	175	127	26	507	57	1,136	45
	필리핀	3	49	129	1	18	2	16	113
	소 계	23	224	256	64	1,153	98	1,681	69
단 감	미 국	4	-	-	-	-	6	1	N/A
	소 계	4	-	-	-	-	6	1	N/A
파프 리카	미 국	1	2	2	0	0	0	0	N/A
	호 주	4	34	52	1	0	4	2	N/A
	소 계	5	36	54	1	0	4	2	N/A
총 계		170	5,579	6,085.4	1,541	21,901	1,521	21,320	103

대만 수출 배 검역절차

대만 수출 사과 · 복숭아 검역절차

미국 수출 포도 검역절차

미국 수출 감 검역절차

캐나다수출 배 검역절차

미국수출 온주밀감 검역절차

EU(영국) 수출감귤 검역절차

참고 6 농림축산검역본부 조직도(식물검역관련)

□ 농림축산검역본부 조직

- 3개부(동물질병관리·식물검역·동식물위생연구부), 22개과, 6개 지역본부, 22개 사무소
- 식물검역부 조직(4개과) 및 과별 주요 역할

□ 농림축산검역본부 지역본부 명칭, 연락처 및 관할구역

① 지역본부

명 칭	위 치 (대표전화)	관할구역
인천공항지역본부	인천광역시 인천국제공항 (민원실: 032-740-2074)	인천국제공항 및 영종동·운서동·용유동
영남지역본부	부산광역시 (민원실: 051-600-5805)	부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 경상북도, 경상남도
중부지역본부	인천광역시 (민원실: 032-722-8265)	인천광역시(인천국제공항 및 영종동·운서동·용유동 제외), 경기도(고양시·구리시·김포시·남양주시·동두천시·부천시·성남시·양주시·의정부시·파주시·포천시·하남시·가평군·양평군 및 연천군은 제외), 세종특별자치시, 대전광역시, 충청북도, 충청남도
서울지역본부	서울특별시 (식물검역과: 02-2650-0644)	서울특별시, 경기도 고양시·구리시·김포시·남양주시·동두천시·부천시·성남시·양주시·의정부시·파주시·포천시·하남시·가평군·양평군 및 연천군, 강원도
호남지역본부	전라북도 군산시 (식물검역과: 063-460-9450)	광주광역시, 전라북도, 전라남도
제주지원	제주특별자치도 제주시 (민원실: 064-728-5400)	제주특별자치도

② 사무소

명 칭		위 치 (대표전화)	관할구역
영남 지역 본부	김해공항사무소	부산광역시 (051-634-3447)	부산광역시 강서구 가락동·강동동·대저1동 및 대저2동, 경상남도 김해시(생림면 및 도요리 제외)
	부산신항사무소	부산광역시 (051-627-4519)	부산광역시 강서구 녹산동·명지동 및 천가동, 경상남도 창원시 진해구 응동2동
	신선대사무소	부산광역시 (051-971-0480)	부산광역시 남구 용호동 및 용당동, 수영구· 해운대구 및 기장군
	대구사무소	대구광역시 (053-981-2838)	대구광역시, 경상북도 중 경산시·영천시· 포항시·고령군·군위군·성주군·영덕군· 영양군·울릉군·울진군·청도군·청송군
	구미사무소	경상북도 구미시 (054-478-8271)	경상북도 중 구미시·김천시·상주시·문경시· 안동시·영주시·의성군·예천군·봉화군· 영양군·칠곡군
	울산사무소	울산광역시 (052-269-0289)	울산광역시(울주군 삼남면 및 삼동면은 제외), 경상북도 경주시
	창원사무소	경상남도 창원시 (055-246-5049)	경상남도 중 거제시·사천시·진주시·통영시· 창원시(진해구 응동2동은 제외)·거창군· 고성군·남해군·산청군·의령군·창녕군· 하동군·함안군·함양군 및 합천군
	김해사무소	경상남도 김해시 생림면 도요리	경상남도 김해시 생림면 도요리
	양산사무소	경상남도 양산시 (055-388-3748)	경상남도 중 양산시·밀양시 및 울산광역시 중 삼남면·삼동면

명 칭		위 치 (대표전화)	관할구역
중부 지역 본부	의왕사무소	경기도 의왕시 (031-462-0581)	경기도 중 과천시·광명시·광주시·군포시· 시흥시·수원시·안산시·안성시·안양시·용인시· 이천시·의왕시 및 여주군
	평택사무소	경기도 평택시 (031-8053-7701)	경기도 중 오산시·평택시 및 화성시, 충청남도 서산시 대산읍 및 당진군
	청주사무소	충청북도 청주시 (043-273-0586)	충청북도
	천안사무소	충청남도 천안시 (041-558-1777)	세종특별자치시, 대전광역시, 충청남도(당진군 및 서산시 대산읍은 제외)
서울 지역 본부	김포공항사무소	서울시김포공항 (032-740-2090)	서울특별시 강서구 김포국제공항, 경기도 고양시 및 김포시
	속초사무소	강원도 속초시 (02-2662-6835)	강원도 강릉시·속초시·고성군·양구군· 양양군·인제군·평창군 및 횡성군
	동해사무소	강원도 동해시 (033-635-3842)	강원도 동해시·삼척시·태백시·영월군 및 정선군
호남 지역 본부	광주사무소	광주광역시 (062-975-6070)	광주광역시, 전라남도 나주시·강진군·곡성군· 담양군·영광군·완도군·장성군·장흥군· 해남군 및 화순군
	무안공항사무소	전라남도 무안군 무안국제공항 (061-452-6796)	전라남도 중 목포시·무안군·신안군·영암군· 함평군 및 진도군
	전주사무소	전라북도 전주시 (063-247-9961)	전라북도 남원시·전주시·무주군·순창군· 완주군·임실군·장수군 및 진안군
	광양사무소	전라남도 광양시 (061-793-8132)	전라남도 중 광양시·순천시·여수시·고흥군· 구례군 및 보성군
제주 지역 본부	제주특별자치도 제주국제공항 (064-746-2460)	제주특별자치도 중 제주국제공항	