

가 포도

□ 한국산 품종 및 재배시기

- 캠벨(미국), 거봉(동남아), M.B.A(Muscat Bailey A, 머루포도) 등
 - 주요 재배품종은 캠벨로 미국 내 재미교포들이 선호하여 대미 수출 포도 품종으로 인기가 높은 품종

<포도 품종별 재배면적(ha, %)>

구분	캠벨	거봉	MBA	새단	델라웨어	기타	전체
1997	18,884 (66.8)	4,089 (14.5)	599 (2.1)	3,338 (11.8)	97 (0.3)	1,283 (4.5)	28,290 (100.0)
2002	19,343 (74.4)	3,362 (12.9)	1,298 (5.0)	1,276 (4.9)	97 (0.4)	631 (2.4)	26,007 (100.0)
2007	13,768 (73.0)	2,282 (12.1)	1,671 (8.9)	452 (2.4)	100 (0.5)	575 (3.0)	18,843 (100.0)
증감률 (‘07/’02)	△28.8	△32.1	128.7	△64.6	3.1	△8.9	△27.5

* 출처: 포도산업 문제점 및 대응전략(한국포도회)

- 완숙 전에 수확하는 캠벨의 숙기는 8월 하순경으로 비교적 빠른 편이며, 거봉은 9월 중순, MBA는 9월 상순

<수출 포도 품종 및 특성>

품종	숙기	특성
 캠벨	9월 초	□ 1892년 미국에서 수입된 후 현재 국내에서 가장 많이 재배되는 품종 □ 교잡종, 내한성이 강하고 결실성이 좋음
 거봉	9월 중	□ 포도알이 크고 과즙이 많은 품종 □ 중부지방에서 9월 중순경 수확
 MBA	9월 상	□ 베일리에 머스캣햄버그를 교배해 육성한 품종 □ 만생종으로 단맛이 강하고 머스캣 향이 남

나 사과

□ 한국산 품종 및 재배시기

- 주요 재배 품종은 만생종인 후지로 국내 사과 재배면적의 약 70% 이상을 차지하며 기타 품종으로는 쓰가루, 홍로, 양광 등이 재배됨

<숙기별 사과 품종>

구분	주력 품종	보조품종	검토품종	숙기
조생종	선홍	산사, 쓰가루	서광, 칼라 착색계	8하, 9상
중생종	홍로, 감홍, 양광	홍옥, 추광, 홍월, 새나라	후지조숙계(고을후지, 히로사키, 료카 등)	9, 10 상
만생종	후지	화홍	후지 착색계(기쿠8후지, 로얄후지 등)	10 중하

* 출처: 농촌진흥청

<사과 품종별 재배면적>

	후지			후지 조숙계	쓰가루	홍로	양광	감홍	기타	전체
	계	일반	착색계							
2002	2,1379	-	-	-	3,059	2,065	607	231	3,663	31,004
2007	20,316	-	-	-	2,210	3,381	808	318	5,211	32,244
2012	19,221	13,020	6,201	2,433	1,613	4,285	733	521	1,927	30,734
2013	19,601	12,873	6,728	2,375	1,555	4,435	708	539	1,955	31,168
증감률	2.0	△1.1	8.5	△2.4	△3.6	3.5	△3.5	3.5	1.5	1.4

* 출처: 2013년 농업전망

<수출 사과 품종 및 특성>

품종	숙기	특성
 료까	9월 중하	□ 조중생종으로 후지보다 일찍 수확되며 다소 신맛이 나고 연붉은색을 띠는게 특징
 후지	10월 하	□ 만생종으로 감산이 적당히 조화되어 맛이 농후 □ 저장력이 강하고(약180일), 한국 주력 수출 품종