

■ 단감 꽃수 작년대비 증감률

단위: %

	전남	경북	경남	전국
증감률	2.1	-1.6	11.4	8.7

주: 농업관측정보센터 5월 29일 모니터 조사치.

■ 단감의 개화시기

	최초 개화일	만개일
2008년	5월 20일	5월 25일
2009년	5월 17일	5월 23일
비교	3일 빠름	2일 빠름

주: 농업관측정보센터 5월 29일 모니터 조사치.

■ 단감 지역별 개화상황

단위: %

	작년대비			평년대비		
	좋음	비슷	나쁨	좋음	비슷	나쁨
전남	35.0	63.1	28.8	63.3	15.4	21.3
경북	100.0	0.0	0.0	44.0	56.0	0.0
경남	90.7	9.3	0.0	94.6	5.4	0.0
전국	77.4	15.6	7.0	87.1	7.7	5.2

주: 농업관측정보센터 5월 29일 모니터 조사치.

단감 꽃수 작년보다 9% 증가

- 단감의 꽃수는 작년에 비해 9% 증가한 것으로 나타났다. 이는 봄철부터 개화직전까지 기상여건이 좋았기 때문이다.
- 지역별로 화이분화가 잘 이루어진 경남지역은 작년보다 11%, 전남지역은 2% 증가하였다. 그러나 경북지역은 서리와 저온피해의 영향으로 2% 감소한 것으로 나타났다.

개화시기 작년보다 2~3일 앞당겨져

- 단감의 개화 시기는 봄철 기상호조로 작년보다 2~3일 이른 것으로 조사되었다. 최초개화일은 5월 17일, 만개일은 5월 23일로 나타났다. 개화시기가 빨라져 생육일수가 늘어나고 과실 크기가 커질 가능성이 있다.

개화 양호한 편

- 개화 상황은 작년 및 평년보다 다소 좋은 것으로 나타났다. 지역별로 경남지역이 작년 및 평년보다 개화 상황이 좋고, 경북 및 전남지역은 작년 및 평년에 비해 좋거나 비슷한 것으로 나타났다.
- 단감의 생육상황은 전반적으로 양호하여 생산량은 작년보다 증가할 것으로 전망된다.
- 5월 고온현상으로 해충 피해가 우려되므로 해충 방제를 철저히 하여 향후 생육기간 동안 생산량이 감소하지 않도록 세심한 관리 및 주의가 필요하다.